

بكتروبان^٤ مرهم

ميويروسين

التركيب الكيفي والكمي

حاضر الميويروسين الحر ٢٪ وزن/وزن في قاعدة من جلايكول الهولييثيلين، بيضاء، شفافة، قابلة للذوبان في الماء للاستعمال الموضعي.

الشكل الصيدلاني

مرهم.

التفاصيل الكلينيكية

دواعي الاستعمال

بكتروبان دواء مضاد للبكتيريا للاستعمال موضعياً، نشط ضد الكائنات المسؤولة عن أغلبية حالات العدوى الجلدية، *Staphylococcus aureus* مثلاً، بما في ذلك السلالات المقاومة للميثوسيلين، وغيرها من كائنات *Staphylococci* و *Streptococci*. وهو نشط أيضاً ضد الكائنات السالبة الجرام مثل *Escherichia coli* و *Haemophilus influenzae*. مرهم بكتروبان يُستعمل لحالات العدوى الجلدية، كالحصص، والتهاب الجُريبات، والدمايل.

الجرعة والاعطاء

الكبار (بما في ذلك المسنون) والأطفال:

بكتروبان يجب وضعه على الموضع المصاب لغاية ثلاث مرات يومياً، لمدة أقصاها ١٠ أيام. يجوز تغطية الموضع بضمادة أو بغطاء مناسب.

الدواء يُستعمل موضعياً. لا يجوز مزجه مع مستحضرات أخرى نظراً لاحتمال تخفيف المفعول، مما يؤدي الى تخفيض النشاط المضاد للبكتيريا واحتمال عدم ثبات الميويروسين في المرهم.

نواهي الاستعمال

شدة الحساسية لبكتروبان أو مراهم أخرى تحتوي على جلايكول الهولييثيلين وأي من مكوناته.

تحذيرات واحتياطات

هذه التركيبة من بكتروبان ليست مناسبة للاستعمال حول العينين أو داخل الأنف (لدى حديثي الولادة أو الرضع). أو باستعمال انبوية سحب أو في موضع إدخال في أحد الأوعية المركزية. عند استعمال بكتروبان على الوجه، يجب مراعاة الحرص لتخاشي ملامسة العينين. جلايكول الهولييثيلين يمكن امتصاصه من الجروح المكشوفة والجلد المصاب بطفح، ويتم إفرازه بواسطة الكليتين. كشأن المراهم الأخرى المركبة من جلايكول الهولييثيلين، يجب استعمال بكتروبان بحذر في حالة وجود أي دليل على ضعف معتدل أو شديد في وظيفة الكلى.

التفاعلات العقاقيرية

لم يرد ذكر أي تفاعلات.

الحمل والإرضاع

لا تتوفر معطيات وافية بالنسبة للإنسان عن الاستعمال أثناء الحمل. إلا أن الدراسات التي أُجريت على حيوانات التجارب أظهرت أن الميويروسين ليس له تأثيرات ماسخة. لا تتوفر معطيات كافية عن الاستعمال أثناء الحمل لدى الإنسان والحيوان.

التأثير على القدرة على قيادة السيارات واستعمال الآلات

لم تلاحظ أي تأثيرات غير مستحبة في القدرة على قيادة السيارات واستعمال الآلات.

ردود الفعل غير المستحبة

ردود الفعل غير المستحبة مدرجة أدناه حسب فئة العضو الجهازى ومرار التردد. مرار التردد معروفة كما يلي: شائعة جداً (ما يزيد عن أو يساوي ١/١٠)، شائعة (ما يزيد عن أو ما يساوي ١/١٠٠٠، وما يقل عن ١/١٠٠)، غير شائعة (ما يزيد عن أو يساوي ١/١٠٠٠٠، وما يقل عن ١/١٠٠٠)، نادرة جداً (ما يقل عن ١/١٠٠٠٠٠)، نادرة جداً (ما يقل عن ١/١٠٠٠٠٠٠). بما في ذلك الحالات التي ورد ذكرها في تقارير منعزلة.

ردود الفعل غير المستحبة، الشائعة منها وغير الشائعة، تم تحديدها من معطيات مشتركة بشأن سلامة الدواء من اختبار الكلينيكي لغئة من المرضى بلغ عددهم ١٥٧٣ عولجاو في ظل دراسة كلينيكية. تم تحديد ردود فعل غير مستحبة نادرة جداً وذلك بصفة رئيسية من معطيات الخبرة بعد تسويق الدواء، ولذلك فإن ردود الفعل هذه تتعلق بمعدل ذكرها في التقارير بدلاً من معدل تكرارها الحقيقي.

اضطرابات الجهاز المناعي

نادرة جداً. ورد ذكر ردود فعل الأرجينية جهازية عند استعمال مرهم بكتروبان.

الاضطرابات الجلدية واضطرابات الأنسجة تحت الجلد

شائعة: حرقان في موضع الاستعمال.

غير شائعة: حكاك، حمامي، وخز وجفاف في موضع الاستعمال. ردود فعل حسية في الجلد للميويروسين أو قاعدة المرهم.

تجاوز الجرعة

لا ينطبق.

تفاصيل صيدلانية

قائمة الملطفات

جلايكول الهولييثيلين 400 USNF

جلايكول الهولييثيلين 3350 USNF

حالات عدم التوافق

لم يرد ذكر أي حالة.

احتياطات خاصة بالتخزين

لا يجوز حفظ الدواء بدرجة حرارة تزيد عن ٢٥°م.

تعليمات للاستعمال / التداول

يجب طرح أي مرهم يتبقى عند نهاية العلاج.

بكتروبان علامة تجارية تملكها مجموعة شركات جلاكسو سميكلابن

انتاج:

جلاكسو أوبريشنز، المملكة المتحدة ليمتد*

بارنارد كاسل، المملكة المتحدة

* شركة تنتمي الى مجموعة شركات جلاكسو سميكلابن

© مجموعة شركات جلاكسو سميكلابن ٢٠٠٧.

جميع الحقوق محفوظة.

رقم النص: GDS 12

تاريخ النص: ١٧ مارس ٢٠٠٥

إن هذا الدواء:

الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.

اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات

الصيدلاني الذي صرفها لك.

– فالطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وينفعه وضرره.

– لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.

– لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.

– لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال

مجلس وزراء الصحة العرب

واتحاد الصيدالة العرب

1000000055234