



فلوميكس® بنتا

لمعالجة نزلات البرد والإنفلونزا

الأشكال والعبوة

فلوميكس® بنتا: أقراص مغلفة بالفيلم: تحتوي كل عبوة على ٢٠ قرصاً.

فلوميكس® بنتا: أقراص مغلفة بالفيلم: تحتوي كل عبوة على ١٠ أقراص.

التركيب

فلوميكس® بنتا: يحتوي كل قرص مغلف بالفيلم على:

ماليات الكلورفينيرامين..... ٢ ملغ

فينيليفرين هايدروكلورايد..... ٥ ملغ

غايفينيسين..... ٢٠٠ ملغ.

أيبوبروفين..... ٢٠٠ ملغ.

السواغات: كروس كارميلوز الصوديوم، النشاء المعدل، ثاني أكسيد السيليكون الغروي، كروسوبفون، سيليلوز دقيق التبلور، صوديوم لوريل سلفات، إستيريات المغنيزيوم، بولي فينيل الكحول، بولي إيثيلين غليكول، طلق، ثاني أكسيد التيتانيوم، أصفر أكسيد الحديد، اللون الأصفر المعتمد بموجب القانون الفدرالي الأميركي للأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل (FD&C).

المفعول

الفئة العلاجية: مضاد للالتهاب ومضاد للروماتيزم (الرثة).

رمز نظام التصنيف الكيماوي العلاجي التشريحي (ATC): M01AE51.

إن الكلورفينيرامين هو حاصر قوي للمفعول لمستقبل هيستامين H1 وهو يتميز بقدرة حفيظة على تثبيط الجهاز العصبي المركزي فله بالتالي تأثير مسكن خفيف. إن التأثير المسكن الخفيف والمضاد للهيستامين القوي في أن معاً من شأنه أن يعالج الأعراض في الحالات المرضية التي تتطلب تحفيز عملية إفراز الهيستامين بشكل تام أو جزئي.

يتميز الفينيليفرين على النشاط المحاكي للودي المباشر وغير المباشر كما إنه يتميز بتأثير فعال مزيل للاحتقان في الجهاز التنفسي العلوي.

أما الغايفينيسين فهو يُستخدم لمعالجة السعال المنتج، أي السعال المصحوب بالإفرازات المتنوعة، نظراً إلى مفعوله المعروف الطارد للبلغم كما يُستخدم لمعالجة السعال الجاف المصاحب للإنفلونزا والإصابات الأخرى لأنه يؤثر على مستقبل السعال المحيطي عند مستوى مخاط البلعوم.

إن الأيبوبروفين هو النموذج الأساسي للأدوية المضادة للالتهاب غير الستيرويدية ويتميز بمفعوله المسكن للألم، وله أيضاً مفعول مضاد للالتهابات والحمى فيعالج الألم في الحنجرة، والصداع، والألم في أسفل الظهر والعضلات كما إنه يخفّض الحمى.

دواعي الاستعمال

يُستعمل فلوميكس® بنتا لأنه يُخفّف بشكل مؤقت الأعراض المتصلة بنزلات البرد والإنفلونزا، والحمى الخفيفة وغيرها من الأرجيات التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي وهذه الأعراض هي:

- سيلان الأنف
- العطاس
- الصداع
- الحكّة في الأنف والحلق
- الضغط في الجيوب الأنفية
- الألام والأوجاع الخفيفة
- الحكّة في العينين وفرط الدمع فيهما
- الاحتقان في الأنف
- الحمى

المقادير العلاجية وطريقة الاستعمال

- عند المرضى في عمر ١٢ سنة أو أكثر: قرص واحد كل ٤ إلى ٦ ساعات إذا استمرت الأعراض. يجب الامتناع عن تناول أكثر من ٦ أقراص في خلال ٢٤ ساعة ما لم يوصي الطبيب بعكس ذلك.
- يجب الامتناع عن إعطاء هذا الدواء للمرضى دون عمر ١٢ سنة.

موانع الاستعمال

- الإصابة بفرط تحسس معلوم لكل من مادتي الفينيليفرين، والأيبوبروفين، أو غيرها من المواد الفعالة أو غير الفعالة.
- يُمنع استخدام الفينيليفرين عند الإصابة بمرض القلب التاجي الحاد، بفرط ضغط الدم الحاد، بمرض قلبي وعائي، بفرط الدرقية كما يحظر استخدامه عند المرضى الذين يعالجون بمثبطات أكسيداز أحادي الأمين أو سبق تناولها في الأسبوعين السابقين لبدء العلاج بفلوميكس® بنتا.
- الإصابة بالنزف المعدي و/أو بالقرحات المعدية.

التأثيرات الجانبية

يمكن أن يسبب الفينيليفرين تسرع دقات القلب، خفقان القلب، الغثيان، الصداع وتبدلات في ضغط الدم.

يمكن أن يسبب الأيبوبروفين ألاماً في المعدة و/أو نزفاً فيها عند الإصابة بقرحة كما يمكن أن يسبب حرقة المعدة.

يمكن أن يكون للكلورفينيرامين تأثير مسكن كما من الممكن أن يسبب النعاس وأداءً ضعيفاً.

الإحتياطات

لفلوميكس® بنتا تأثير مسكن كما قد يسبب النعاس وأداءً ضعيفاً. على المرضى الامتناع عن قيادة المركبات أو تشغيل الآلات لحين التحقق من مدى تأثيرهم بالدواء. يُمنع احتساء المشروبات الروحية بالتزامن مع هذا الدواء.

وبالرغم من أن الفينيليفرين لا يؤثر في الواقع على ضغط الدم عند المرضى الذين لا يعانون من أي مشكلة ضغط غير أنه يجب توخي الحذر عند وصفه للمرضى الذين يتناولون الأدوية المضادة لفرط ضغط الدم. وفي هذه الحالة يجب وصف الجرعة الأدنى كما يجب تقييم حالة ضغط الدم عند هؤلاء المرضى بعد تناول جرعة واحدة وذلك قبل وصف هذا الدواء مجدداً أو قبل تناوله من دون إشراف الطبيب.

يجب توخي الحذر عند المرضى المصابين بقصور كلوي أو كبدي حاد وعند المرضى المسنين.

يجب توخي الحذر عند المرضى المصابين بمرض في الغدة الدرقية، بالزرق، بتضخم البروستات أو بأي مرض آخر يؤثر على تدفق البول.

التفاعلات الدوائية

يمكن أن تسبب مثبطات أكسيداز أحادي الأمين استئصال تأثير الفينيليفرين الجهازي.

يمكن أن يتداخل الفينيليفرين مع مفعول الأدوية المضادة لفرط ضغط الدم.

الجرعة المفرطة

يجب استشارة الطبيب فوراً (في المستشفى إذا أمكن) عند تناول جرعة مفرطة حتى ولو لم تظهر أي أعراض مبكرة ملموسة.

شروط حفظ الدواء

يجب حفظ الدواء في مكان لا تتعدى الحرارة فيه ٣٠ درجة مئوية.

يجب الامتناع عن وضع هذا الدواء في البراد وحفظه بعيداً عن الضوء.

يجب حفظ هذا الدواء في العبوة الأصلية بحالة سليمة.

تاريخ مراجعة هذه النشرة:

نيسان ٢٠١٩.

هذا دواء:

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك، وإستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- إتبع وصفة الطبيب بدقة، وإرشادات الإستعمال، وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- إن الطبيب والصيدلاني هما الخبيران في الأدوية، فواندها ومخاطرها.
- لا تقطع فترة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر نفس الوصفة دون إستشارة طبيبك.
- احفظ الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال.

مؤتمر وزراء الصحة العرب
 واتحاد الصيدالة العرب

بنّتا ش.م.ل.
ضبييه - لبنان

00000

