

Notice : information de l'utilisateur

Mimpara 30 mg comprimés pelliculés
Mimpara 60 mg comprimés pelliculés
Mimpara 90 mg comprimés pelliculés
Cinacalcet

Mimpara 30 mg comprimés pelliculés

Mimpara 60 mg comprimés pelliculés

Mimpara 90 mg comprimés pelliculés

Cinacalcet

Mimpara 30 mg comprimés pelliculés

Mimpara 60 mg comprimés pelliculés

Mimpara 90 mg comprimés pelliculés

Cinacalcet

Mimpara 30 mg comprimés pelliculés

Mimpara 60 mg comprimés pelliculés

Mimpara 90 mg comprimés pelliculés

Cinacalcet

Mimpara 30 mg comprimés pelliculés

Mimpara 60 mg comprimés pelliculés

Mimpara 90 mg comprimés pelliculés

Cinacalcet

Mimpara 30 mg comprimés pelliculés

Mimpara 60 mg comprimés pelliculés

Mimpara 90 mg comprimés pelliculés

Cinacalcet

Mimpara 30 mg comprimés pelliculés

Mimpara 60 mg comprimés pelliculés

Mimpara 90 mg comprimés pelliculés

Cinacalcet

Mimpara 30 mg comprimés pelliculés

Mimpara 60 mg comprimés pelliculés

Mimpara 90 mg comprimés pelliculés

Cinacalcet

Mimpara 30 mg comprimés pelliculés

Mimpara 60 mg comprimés pelliculés

Mimpara 90 mg comprimés pelliculés

Cinacalcet

Mimpara 30 mg comprimés pelliculés

Mimpara 60 mg comprimés pelliculés

Mimpara 90 mg comprimés pelliculés

Cinacalcet

Mimpara 30 mg comprimés pelliculés

Mimpara 60 mg comprimés pelliculés

Mimpara 90 mg comprimés pelliculés

Cinacalcet

Mimpara 30 mg comprimés pelliculés

Mimpara 60 mg comprimés pelliculés

Mimpara 90 mg comprimés pelliculés

Cinacalcet

Mimpara 30 mg comprimés pelliculés

Mimpara 60 mg comprimés pelliculés

Mimpara 90 mg comprimés pelliculés

Cinacalcet

Mimpara 30 mg comprimés pelliculés

Mimpara 60 mg comprimés pelliculés

Mimpara 90 mg comprimés pelliculés

Cinacalcet

Mimpara 30 mg comprimés pelliculés

Mimpara 60 mg comprimés pelliculés

Mimpara 90 mg comprimés pelliculés

Cinacalcet

Mimpara 30 mg comprimés pelliculés

Mimpara 60 mg comprimés pelliculés

Mimpara 90 mg comprimés pelliculés

Cinacalcet

Mimpara 30 mg comprimés pelliculés

Mimpara 60 mg comprimés pelliculés

Mimpara 90 mg comprimés pelliculés

Cinacalcet

Mimpara 30 mg comprimés pelliculés

Mimpara 60 mg comprimés pelliculés

Mimpara 90 mg comprimés pelliculés

Cinacalcet

Mimpara 30 mg comprimés pelliculés

Mimpara 60 mg comprimés pelliculés

Mimpara 90 mg comprimés pelliculés

Cinacalcet

Mimpara 30 mg comprimés pelliculés

Mimpara 60 mg comprimés pelliculés

Mimpara 90 mg comprimés pelliculés

Cinacalcet

Mimpara 30 mg comprimés pelliculés

Mimpara 60 mg comprimés pelliculés

Mimpara 90 mg comprimés pelliculés

Cinacalcet

Mimpara 30 mg comprimés pelliculés

Mimpara 60 mg comprimés pelliculés

Mimpara 90 mg comprimés pelliculés

Cinacalcet

Mimpara 30 mg comprimés pelliculés

Mimpara 60 mg comprimés pelliculés

Mimpara 90 mg comprimés pelliculés

Cinacalcet

Mimpara 30 mg comprimés pelliculés

Mimpara 60 mg comprimés pelliculés

Mimpara 90 mg comprimés pelliculés

Cinacalcet

Mimpara 30 mg comprimés pelliculés

Mimpara 60 mg comprimés pelliculés

Mimpara 90 mg comprimés pelliculés

Cinacalcet

Mimpara 30 mg comprimés pelliculés

Mimpara 60 mg comprimés pelliculés

Mimpara 90 mg comprimés pelliculés

Cinacalcet

Mimpara 30 mg comprimés pelliculés

Mimpara 60 mg comprimés pelliculés

Mimpara 90 mg comprimés pelliculés

Cinacalcet

Mimpara 30 mg comprimés pelliculés

Mimpara 60 mg comprimés pelliculés

Mimpara 90 mg comprimés pelliculés

Cinacalcet

Mimpara 30 mg comprimés pelliculés

Mimpara 60 mg comprimés pelliculés

Mimpara 90 mg comprimés pelliculés

Cinacalcet

Mimpara 30 mg comprimés pelliculés

Mimpara 60 mg comprimés pelliculés

Mimpara 90 mg comprimés pelliculés

Cinacalcet

Mimpara 30 mg comprimés pelliculés

Mimpara 60 mg comprimés pelliculés

Mimpara 90 mg comprimés pelliculés

Cinacalcet

Mimpara 30 mg comprimés pelliculés

Mimpara 60 mg comprimés pelliculés

Mimpara 90 mg comprimés pelliculés

Cinacalcet

Mimpara 30 mg comprimés pelliculés

Mimpara 60 mg comprimés pelliculés

Mimpara 90 mg comprimés pelliculés

Cinacalcet

Mimpara 30 mg comprimés pelliculés

Mimpara 60 mg comprimés pelliculés

Mimpara 90 mg comprimés pelliculés

Cinacalcet

Veillez indiquer à votre médecin si vous prenez les médicaments suivants.

- Médicament pouvant modifier l’action de Mimpara :
 - médicaments utilisés pour traiter les **infections de la peau** et les **mycoses** (kétoconazole, itraconazole et voriconazole) ;
 - médicaments utilisés pour traiter les **infections bactériennes** (télithromycine, rifampicine et ciprofloxacine) ;
 - un médicament utilisé pour traiter l’infection à **VIH** et le SIDA (ritonavir) ;
 - un médicament utilisé pour traiter la dépression (fluvoxamine).

- Mimpara peut modifier l’action des médicaments suivants:
 - médicaments utilisés pour traiter la **dépression** (amitriptyline, désipramine, nortriptyline et clomipramine) ;
 - médicaments utilisés pour traiter les **troubles du rythme cardiaque** (flécaïnide et propafénone) ;
 - un médicament utilisé pour traiter l’**hypertension artérielle** (métoprolol).

- Mimpara avec des aliments et boissons**
Mimpara doit être pris au cours d'un repas ou juste après.

- Grossesse, allaitement et fécondité**
Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez de débiter une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

- Mimpara n’a pas été étudié chez la femme enceinte. En cas de grossesse, votre médecin peut décider de modifier votre traitement, Mimpara pouvant nuire au bébé à naître.

- En l’absence de données concernant le passage dans le lait maternel, votre médecin décidera avec vous si vous devez arrêter l’allaitement ou le traitement par Mimpara.

- Conduite de véhicules et utilisation de machines**
Les effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines n’ont pas été étudiés. Des vertiges et des convulsions ont été signalés par les patients prenant Mimpara. Si vous présentez ces symptômes, votre capacité à conduire ou à utiliser des machines peut être affectée.

- Mimpara contient du lactose**
Si vous êtes intolérant à certains sucres, veuillez avertir votre médecin avant de prendre Mimpara.

- Mimpara contient du sodium**
Mimpara contient du sodium. Si vous souffrez d’une affection telle que l’hypertension artérielle, le diabète sucré ou l’insuffisance cardiaque, demandez conseil à votre médecin avant de prendre Mimpara.

- Mimpara contient du fer**
Mimpara contient du fer. Si vous souffrez d’une affection telle que l’anémie, demandez conseil à votre médecin avant de prendre Mimpara.

- Mimpara contient du calcium**
Mimpara contient du calcium. Si vous souffrez d’une affection telle que l’hyperparathyroïdisme, demandez conseil à votre médecin avant de prendre Mimpara.

- Mimpara contient du potassium**
Mimpara contient du potassium. Si vous souffrez d’une affection telle que l’hypokaliémie, demandez conseil à votre médecin avant de prendre Mimpara.

- Mimpara contient du phosphore**
Mimpara contient du phosphore. Si vous souffrez d’une affection telle que l’hypophosphatémie, demandez conseil à votre médecin avant de prendre Mimpara.

- Mimpara contient du magnésium**
Mimpara contient du magnésium. Si vous souffrez d’une affection telle que l’hypomagnésémie, demandez conseil à votre médecin avant de prendre Mimpara.

- Mimpara contient du zinc**
Mimpara contient du zinc. Si vous souffrez d’une affection telle que l’hypozincémie, demandez conseil à votre médecin avant de prendre Mimpara.

- Si vous avez pris plus de Mimpara que vous n’auriez dû**
Si vous avez pris plus de Mimpara que vous n’auriez dû, vous devez consulter immédiatement votre médecin. Les signes possibles de surdosage comprennent des engourdissements ou des picotements autour de la bouche, des douleurs musculaires ou des crampes et des convulsions.

- Si vous oubliez de prendre Mimpara**
Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

- Si vous avez oublié de prendre une dose de Mimpara, prenez normalement la dose suivante.

- Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.

- Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.**

- Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.**

- Si vous commencez à ressentir des engourdissements et des picotements autour de la bouche, des douleurs musculaires ou des crampes et des convulsions, **prévenez immédiatement votre médecin**.** Cela peut signifier que votre taux de calcium est trop bas (hypocalcémie).

- Très fréquents : peut concerner plus de 1 patient sur 10**
 - nausées et vomissements ; ces effets sont normalement légers et transitoires.

- Fréquents : peut concerner jusqu’à 1 patient sur 10**
 - vertiges
 - engourdissement ou sensation de picotements (paresthésie)
 - perte (anorexie) ou diminution d’appétit
 - douleurs musculaires (myalgies)

- fatigue (asthénie)
- rashes cutanés
- diminution du taux de testostérone
- taux sanguins de potassium élevés (hyperkaliémie)
- réactions allergiques (hypersensibilité)
- maux de tête
- épilepsie (convulsion ou crises)
- pression artérielle basse (hypotension)
- infection respiratoire haute
- difficultés respiratoires (dyspnée)
- toux
- indigestion (dyspepsie)
- diarrhée
- douleurs abdominales, douleurs épigastriques
- constipation
- spasmes musculaires
- douleurs dorsales
- taux de calcium sanguin faible (hypocalcémie)

- Non connue: la fréquence ne peut être estimée à partir des données disponibles**

- urticaire
- gonflement du visage, des lèvres, de la bouche, de la langue ou de la gorge pouvant entraîner des difficultés à avaler ou à respirer (œdème de Quincke).
- rythme cardiaque anormalement rapide ou fort pouvant être associé à un faible taux de calcium sanguin (allongement de l’intervalle QT et arythmie ventriculaire causés par une hypocalcémie).

- Après avoir pris du Mimpara, un très petit nombre de patients ayant une insuffisance cardiaque a présenté une aggravation de la maladie et/ ou une pression artérielle basse (hypotension)..

- Enfants et adolescents**
L'utilisation de Mimpara chez les enfants et les adolescents n’a pas été établie. Le décès d’un patient adolescent présentant un taux très faible de calcium dans le sang (hypocalcémie) a été rapporté au cours d’un essai clinique pédiatrique.

- Déclaration des effets secondaires**
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s’applique pour tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

- Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.**

- 5. Comment conserver Mimpara**

- Conserver Mimpara dans son emballage d’origine, à l’abri de la lumière, à une température comprise entre 2°C et 8°C.

- Ne pas conserver à une température supérieure à 30°C.

- Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

- 6. Contenu de l’emballage et autres informations**

- Chaque boîte de Mimpara contient 30, 60 ou 90 comprimés pelliculés.

- Ce que contient Mimpara**
 - La substance active est le cinacalcet. Chaque comprimé pelliculé contient 30 mg, 60 mg ou 90 mg de cinacalcet (sous forme de chlorhydrate).
 - Les autres composants sont :
 - amidon de maïs prégélatinisé
 - cellulose microcristalline
 - povidone
 - crospovidone
 - stéarate de magnésium
 - silice colloïdale anhydre

- Les comprimés sont recouverts par les composants suivants :
 - cire de Carnauba
 - Opadry vert (contenant du lactose monohydraté, de l’hypromellose, du dioxyde de titane (E171), du triacétate de glycérol, du bleu FD&C (E132), de l’oxyde de fer jaune (E172))
 - Opadry clair (contenant de l’hypromellose, du macrogol)

- Qu’est-ce que Mimpara et contenu de l’emballage extérieur**

- Mimpara est un comprimé pelliculé vert clair. Les comprimés sont de forme ovale et portent l’inscription « 30 », « 60 » ou « 90 » sur une face et « AMG » sur l’autre face.

- Mimpara est disponible en plaquette thermoformée contenant des comprimés pelliculés dosés à 30, 60 ou 90 mg. Une boîte peut contenir 14, 28 ou 84 comprimés.

- Les présentations peuvent ne pas être toutes commercialisées.

- Site de fabrication du produit médicamenteux:** Amgen Manufacturing Limited State Road 31 Kilometer 24.6 Juncos 00777-4060 Puerto Rico USA

- Titulaire de l’Autorisation de mise sur le marché et fabricant:** Amgen Europe B.V. Minervum 7061 4817 ZK Breda Pays-Bas

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est Aout 2015.

CECI EST UN MEDICAMENT

Ceci est un médicament affectant votre santé et sa consommation contraire aux instructions vous met en danger. Suivez scrupuleusement la prescription du médecin; le mode d'utilisation et les instructions fournies par votre pharmacien. <ul style="list-style-type: none">Le médecin et le pharmacien sont les experts en médicaments; leurs risques et bénéfices Ne pas interrompre par vous-même la période de traitement prescrite. Ne pas répéter la même prescription sans consulter votre médecin. Ne pas laisser les médicaments à la portée des enfants.
Le Conseil des Ministres Arabes de la Santé, l'Union des Pharmaciens Arabes