

MÉGAMYLASE® 200 U.CEIP/ml sirop

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

ALFA-AMYLASE 200 U. CEIP*

pour 1 ml

* soit 142,86 unités Pharmacopée Européenne par ml de sirop.

Excipients : Saccharose, glycérol, parahydroxybenzoate de méthyle sodique, parahydroxybenzoate de propyle sodique, huile essentielle de mandarine, acide citrique monohydraté, eau purifiée.

FORME PHARMACEUTIQUE

Sirop en flacon de 125 ml ou 250 ml.

CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE

ENZYMES À VISÉE ANTI-INFLAMMATOIRE

(R : Système Respiratoire).

NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT Laboratoires LEURQUIN MEDIOLANUM

68-88, Rue Ampère

Z.I. des Chanoux

93330 NEUILLY SUR MARNE

DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

(INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES)

Ce médicament est indiqué dans les maux de gorge peu intenses et sans fièvre.

ATTENTION !

DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT

(CONTRE-INDICATIONS)

Ce médicament **NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ** dans le cas suivant :

- Antécédents d'allergie à l'alfa-amylase ou à l'un des composants de la solution, notamment les parabens.
- En raison de la présence de saccharose, ce médicament est contre-indiqué en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrose-isomaltase.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

En cas de survenue de fièvre et/ou en cas d'apparition de nouveaux troubles (maux de gorge ou de tête importants, d'expectorations (crachat) purulentes, d'une gêne à la déglutition des aliments...) **CONSULTER VOTRE MÉDECIN**.

Ne pas utiliser ce médicament de façon prolongée sans avis médical.

En cas de régime pauvre en sucre ou de diabète, tenir compte dans la ration journalière de la quantité de saccharose :

- une cuillerée à café contient 3,2 g de saccharose,
- une cuillerée à soupe contient 9,6 g de saccharose.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE - ALLAITEMENT

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre un médicament.

LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NÉCESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS

- Parahydroxybenzoate de méthyle sodique (E219)
- Parahydroxybenzoate de propyle sodique (E217)
- Saccharose
- Glycérol.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT

POSOLOGIE

Voie orale.

Adulte : 15 ml 3 fois par jour mesuré à l'aide d'une cuillère à soupe ou d'un gobelet doseur.

Enfant de plus de 3 ans (plus de 15 kg) : 10 ml 3 fois par jour mesuré à l'aide de 2 cuillères à café ou d'un gobelet doseur.

Nourrisson et enfant de 6 mois à 3 ans (7 à 15 kg) : 5 ml 3 fois par jour mesuré à l'aide d'une cuillère à café ou d'un gobelet doseur.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION : Voie orale.

DURÉE DU TRAITEMENT

Ne pas utiliser ce médicament de façon prolongée sans avis médical.

EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS

(EFFETS INDÉSIRABLES)

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS :

- réactions allergiques : dans ce cas arrêtez le traitement.

SIGNEZ À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE

DÉCEMBRE 2000.