

نشرة العبوة: معلومات للمريض

إمبـوران* أقراص مغلفة ٢٥ ملـغ

إمبـوران* أقراص مغلفة ٥٠ ملـغ

أز الثيوبورين

يرجى قراءة محتويات هذه النشرة بالكامل بعناية قبل البدء بتناول هذا الدواء لأنه يحتوي على معلومات مهمة لك.

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج إلى قراءتها مرة أخرى.
- إن كان لديك أي استفسار، اسأل طبيبك، أو الممرضة، أو الصيدلي.
- لقد وصف هذا الدواء لك، ولا ينبغي إعطاؤه للآخرين، فربما يضرهم حتى لو كانوا يعانون من نفس الأعراض التي تعاني منها.
- إذا ظهرت عليك أي أعراض جانبية، تحدث مع طبيبك أو الممرضة أو الصيدلي، وذلك يتضمن أي أعراض جانبية محتملة غير مدرجة في هذه النشرة.
- راجع القسم ٤.

محتويات هذه النشرة:

١. ما هي أقراص إمبروان وما هي دواعي استعمالها.
٢. ما الذي يجب أن تعرفه قبل تناول أقراص إمبروان.
٣. كيفية تناول أقراص إمبروان.
٤. الآثار الجانبية المحتملة
٥. كيفية تخزين أقراص إمبروان.
٦. محتويات العبوة ومعلومات أخرى

١. ما هي أقراص إمبروان وما هي دواعي استعمالها.

تحتوي أقراص إمبروان على المادة الفعالة أزابثوبرين. وهي تنتمي إلى مجموعة من الأدوية يطلق عليها "كابتات المناعة"، وهذا يعني أنها تضعف قوة جهازك المناعي.

قد تستخدم أقراص إمبروان لمساعدة الجسم على تقبل زراعة الأعضاء، مثل كلية جديدة، أو قلب جديد أو كبد جديد، أو لعلاج بعض الأمراض حيث يتفاعل جهاز المناعة ضد الجسم (أمراض المناعة الذاتية).

أمراض المناعة الذاتية قد تتضمن:

- التهاب المفاصل الروماتويدي الحاد (مرض يهاجم فيه جهاز المناعة الخلايا المبطنة للمفاصل مسبباً تورم وآلم، وتصلب المفاصل)،
- الذئبة الحمامية المجمعة (مرض نادر يسبب التهاب الأعوية الدموية)،
- فقر الدم الانحلالي المناعي الذاتي (اضطراب خطير في الدم، حيث يدمر الجسم خلايا الدم الحمراء بسرعة أكبر من قدرته على إنتاجها، ويصحبه أعراض تتضمن الضعف وضيق التنفس)،
- الغرغرية الغليظة الصفائح المجهولة السبب الحرون المزمنة (وهي حالة ينخفض بها عدد الصفائح الدموية، مما قد يتسبب في سهولة أو فرط التكمد والنزف)

يمكن استخدام أقراص إمبروان أيضاً لعلاج مرض التهاب الأمعاء (مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي)

لقد اختار طبيبك هذا الدواء لأنه يناسبك ويناسب حالتك.

يمكن استخدام أقراص إمبروان وحدها، ولكنها تستخدم غالباً إلى جانب أدوية أخرى.

٢. ما الذي يجب أن تعرفه قبل تناول أقراص إمبروان.

لا تتناول أقراص إمبروان:

- إذا كنت تعاني من حساسية لمادة أزابثوبرين أو لأي من مكونات الدواء الأخرى (المذكورة في القسم ٦)،
- إذا كنت تعاني من حساسية لمادة الميركابتوبيرين (وهو دواء مشابه للأزابثوبرين، المادة الفعالة التي تحتويها أقراص إمبروان).

التحذيرات والاحتياطات

تحدث مع طبيبك أو الصيدلي قبل تناول أقراص إمبروان:

- إذا كنت قد تلقيت مؤخرًا أو من المقرر أن تتلقى تطعيمًا (لقاح). إذا كنت تتناول أقراص إمبروان، يجب عليك الامتناع عن تلقي التطعيمات الحية التي تحتوي على سبيل حية (على سبيل المثال، لقاح الإنفلونزا، لقاح الحصبة، لقاح عسيرة كالميت غيران (السل) (BCG)، إلخ) حتى ينصحك الطبيب بأن القيام بذلك آمن. وذلك لأن بعض اللقاحات قد تصيبك بالعدوى إذا تلقيتها أثناء تناولك لأقراص إمبروان.

- إذا كنت مصابًا بحالة وراثية تعرف بمتلازمة ليش نيهان. وهي حالة نادرة تتوارث في العائلات وتنتج عن نقص إنزيم يدعى HPRT أو "إنزيم ناقله الهيبوز أنتين- جرانين- الفسفوريبوزيل".

- إذا كنت مصابًا بمشكلات في الكبد أو الكلى.
- إذا كنت مصابًا بحالة وراثية تعرف بنقص TPMT (حيث ينتج جسمك كمية ضئيلة للغاية من إنزيم يدعى إنزيم ناقله الثيوبورين ميثيل)

- إذا أصبت من قبل بجذري الماء أو الحزام الناري.
- إذا أصبت من قبل بالالتهاب الكبدى ب (مرض كبدي فيروسي)

- تحتاج أنت شخصك لعملية جراحية (ذلك لأن أدوية مثل التوبوكورارين أو السكسينيل كولين التي تستخدم كمرخيات للعضلات أثناء العمليات الجراحية قد تتفاعل مع أقراص إمبروان. يجب أن تخبر أخصائي التخدير أنك تتناول العلاج بأقراص إمبروان قبل الخضوع للجراحة.

طفرة جينية في الجين- NUDT15

إذا كنت مصابًا بطفرة جينية وراثية في الجين - NUDT15 (وهو الجين المسئول عن تكسير أقراص إمبروان داخل الجسم). فبنته مُعرض بصورة كبيرة للإصابة بالالتهابات وتساخط الشعر، وفي هذه الحالة قد يلجأ الطبيب لإعطائك جرعة مُخفضة من الدواء.

إن لم تكن متأكدًا من أن أيًا مما ورد أعلاه ينطبق عليك، استشر طبيبك أو الممرضة أو الصيدلي قبل تناول أقراص إمبروان .

سيرغب طبيبك في أخذ عينات دم منتظمة خلال فترة العلاج بأقراص إمبروان، للتحقق من حدوث أي تغيرات (راجع القسم ٣ "كيفية تناول أقراص إمبروان"). عادة ما يقل تكرار إجراء اختبارات الدم كلما طالت فترة العلاج بأقراص إمبروان. قد يجري طبيبك أيضاً اختبارات جينية (على سبيل المثال، سينتفد إنزيم ناقله الثيوبورين ميثيل أو جينات NUDT15) قبل العلاج أو خلاله لتحديد إذا ما كانت استجابتك لهذا الدواء قد تتأثر نتيجة للوراثيات لديك.

قد يقوم طبيبك بتغيير جرعة إمبروان بحسب نتائج هذه الفحوصات.

إذا كنت تتلقى علاجاً كابتاً للمناعة، فإن تناول أقراص إمبروان يجعلك أكثر عرضة للإصابة بـ:

- الإصابة بالعدوى (بما في ذلك سرطان الجلد، إذا، عند تناول أقراص إمبروان، تجنب التعرض لضوء الشمس لفترات طويلة، وارتد ملابس واقية واستخدم مستحضراً واقياً من الشمس بمعامل حماية مرتفع.

- المضطرابات التنكثرية اللغمية:

- العلاج بأقراص إمبروان يرفع خطر الإصابة بنوع من السرطان يدعى الاضطراب التنكثري اللغمي. قد يؤدي اتباع نظام علاجي يحتوي على كابتات مناعة متعددة (بما في ذلك زمرة الثيوبورين) إلى الوفاة

- يرفع الجمع ما بين كابتات مناعة متعددة، حين يتم تناولها في نفس الوقت، احتمال الإصابة باضطرابات الجهاز اللمفاوى بسبب العدوى الفيروسية (الاضطرابات التنكثرية اللغمية المرتبطة بفيروس إشتاين-بار (EBV)).

- الإصابة بحالة خطيرة تدعى متلازمة تنشيط البلاعم (تنشيط مفرط لخلايا الدم البيضاء مصحوب بالالتهاب)، تحدث عادة عند الأشخاص المصابين بأنواع محددة من التهاب المفاصل.

- عدوى حادة بجذري الماء أو الحزام الناري. إذا، خلال فترة العلاج بأقراص إمبروان، تجنب التواصل مع المصابين بجذري الماء أو الحزام الناري.
- قد تنتشر لديك إصابة سابقة بالالتهاب الكبدى ب

- عدوى بأمراض أخرى مثل اعتلال بوضاء متعدد البؤر المترقي (PML) وهو عدوى انتهازية. إذا ظهرت أي علامات على الالتهاب، يُرجى الاتصال بطبيبك (راجع قسم ٤ "الآثار الجانبية المحتملة").

الأدوية الأخرى وأقراص إمبروان

أخبر طبيبك إن كنت تتناول أو تناولت مؤخرًا أو قد تتناول أي أدوية أخرى. هذا لأن أقراص إمبروان يمكن أن تؤثر على آلية عمل بعض الأدوية الأخرى. كما يمكن للأدوية الأخرى أن تؤثر على آلية عمل أقراص إمبروان. أخبر طبيبك إن كنت تتناول، أو تخطط لتناول أي من الأدوية التالية على وجه الخصوص:

- ريبافيرين (يستخدم لعلاج العدوى الفيروسية).
- ميثوتريكسيت (يستخدم بشكل رئيسي لعلاج السرطانات)
- ألوبيرونول، أو كيسيبيرونول، ثيوبورينول أو مضطبات أكسيداز الزانثين الأخرى، مثل فيوبكسوستات (يستخدم بشكل رئيسي في علاج النقرس)
- سيمبلامين (يستخدم بشكل رئيسي في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي)
- مضيق الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE) (يستخدم بشكل رئيسي في علاج ضغط الدم المرتفع (ارتفاع ضغط الدم)).
- مضادات التخثر مثل وارفارين أو أسينوكومارول (يستخدم لمنع تكون جلطات الدم)
- سيمنتين- (يستخدم لعلاج قرح المعدة وعسر الهضم)
- إنوميثاسين (يستخدم كمسكن للألم ومضاد للالتهابات)
- عقاقير السايكوتوستاتيك (تستخدم في علاج مختلف أنواع السرطان)

- الأمينوسليسيولات، مثل أو سلازالين، أو ميسالازين، أو سالفاسالازين (تستخدم بشكل رئيسي في علاج التهاب القولون التقرحي أو مرض كرون)
- كورتيموكسازول (مضاد حيوي، يستخدم لعلاج الالتهابات التي تسبب بها البكتريا)

- إينيفلغيساب (يستخدم بشكل رئيسي في علاج التهاب القولون التقرحي و مرض كرون)

- مرخيات العضلات، على سبيل المثال توبوكورارين أو سوكسيل كولين (يستخدمان أثناء العمليات) حيث أنها قد تتفاعل مع أقراص إمبروان. يجب أن تخبر أخصائي التخدير أنك تتناول العلاج بأقراص إمبروان قبل الخضوع للجراحة.

إن لم تكن متأكدًا من أن أيًا مما ورد أعلاه ينطبق عليك، استشر طبيبك أو الصيدلي قبل تناول أقراص إمبروان .

تلقى التطعيمات أثناء تناولك أقراص إمبروان

إذا كان من المقرر أن تتلقى تطعيمًا، تحدث إلى طبيبك أو الممرضة قبل تلقيه. إذا كنت تتناول أقراص إمبروان، يجب عليك الامتناع عن تلقي التطعيمات الحية (على سبيل المثال، لقاح الإنفلونزا، لقاح الحصبة، لقاح عسيرة كالميت غيران (السل)BCG)، إلخ) إلى أن يخبرك الطبيب أنه من الأمن تناول هذا الدواء. وذلك لأن بعض اللقاحات قد تصيبك بالعدوى إذا تلقيتها أثناء تناولك لأقراص إمبروان.

أقراص إمبروان مع الطعام والشراب

ينبغي أن تتناول دواءك قبل ساعة واحدة أو بعد ساعتين على الأقل من شرب الحليب أو تناول منتجات الألبان.

الحمل والرضاعة الطبيعية والخصوبة

إذا كنتِ حاملاً أو ترضعين رضاعة طبيعية، أو تعتقدين أنك قد تكونين حاملاً أو تخططين للحمل، اطلبي المشورة من طبيبك قبل تناول هذا الدواء.

الحمل

يجب اتخاذ تدابير منع الحمل الموثوقة لتجنب حدوث الحمل إذا كنت أنت أو زوجك/زوجتك تستخدم أقراص إمبروان.

إذا كنتِ حاملاً، سيخطر طبيبك بخاية إذا ما كان ينبغي أن تتناولي هذا الدواء، بناء على مخاطره ومنفعاه.

الرضاعة الطبيعية

قد تمر كميات صغيرة من أقراص إمبروان إلى حليب الثدي. توصي السيدات اللاتي يتناولن أقراص إمبروان بتجنب الإرضاع عدا كائنات فرائد العلاج تقوى المخاطر المحتملة على طفلك. اطلبي المشورة من طبيبك قبل إرضاع طفلك.

الخصوبة

أثار أقراص إمبروان على الخصوبة غير معروفة.

القيادة واستخدام الآلات

من غير المتوقع أن تؤثر أقراص إمبروان على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات. إذا ظهرت عليك أي من الآثار الجانبية لهذا الدواء، قد لا تتمكن من القيادة أو تشغيل الآلات.

أقراص إمبروان تحتوي على اللاكتوز

أقراص إمبروان تحتوي على لاكتوز أحادي الهيدرات. إذا أخبرك طبيبك أنك تعاني من عدم تحمل لبعض أنواع السكر، فغليك استشارة قبل تناول هذا الدواء.

٣. كيفية تناول أقراص إمبروان

تناول هذا الدواء دائماً على النحو الذي يصفه طبيبك أو الصيدلي. استشر طبيبك أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا.

قد تتبين كمية أقراص إمبروان التي يجب تناولها من مريض لآخر، وسيصف لك الطبيب الجرعة. تعتمد الجرعة على الحالة التي تعالج منها.

يمكنك تناول أقراص إمبروان مع الطعام أو على معدة خاوية، إلا أن الطريقة التي تختارها يجب أن تكون موحدة من يوم إلى الآخر . يشعر بعض المرضى بالغثان (رغبة في القيء) في بادئ الأمر عند تناول أقراص إمبروان، وقد يزول هذا الشعور إذا ما تم تناول الأقراص بعد الطعام.

- سوفوم طبيبك بطلب فحوصات دم دورية خلال فترة علاجك بأقراص إمبروان. وذلك لتفقد عدد ونوع الخلايا في الدم، ولضمان عمل الكبد بشكل سليم.
- قد يطلب الطبيب أيضاً إجراء اختبارات دم أو بول أخرى لمراقبة كيفية عمل الكلى لديك ولقياس مستويات حمض اليوريك. حمض اليوريك مادة طبيعية ينتجها الجسم وقد يرتفع مستوى هذا الحمض في فترة العلاج بأقراص إمبروان. قد يتسبب ارتفاع مستويات حمض اليوريك في تلف الكلى.

قد يقوم طبيبك بتغيير جرعة أقراص إمبروان بحسب نتائج هذه الفحوصات.

ابتلع القرص كاملاً. لا تمضغ الأقراص. لا ينبغي أن تكسر الأقراص أو تسحقها.

من الهام أن يبي مقدمو الرعاية الحاجة إلى التعامل الآمن مع هذا الدواء. إذا لمست أنت أو مقدم الرعاية أقراصاً مكسورة، يجب غسل اليدين على الفور. يرجى طلب المشورة من طبيبك أو الصيدلي.

الجرعة الموصى بها:

البالغون الذين خضعوا من قبل لعملية زرع أعضاء: في اليوم الأول من العلاج، تؤخذ عادة جرعة تصل إلى ٥ مل لكل كيلو غرام من وزن الجسم، ثم تؤخذ جرعة يومية متعاده من ١ ملغ إلى ٤ ملغ لكل كيلو غرام من وزن الجسم. خلال فترة العلاج، سيعمل الطبيب الجرعة بحسب استجابتك للدواء.

البالغون المصابون بحالات أخرى: تتراوح الجرعة الأولية عادة ما بين ١ ملغ إلى ٣ مل لكل كيلو غرام من وزن الجسم، ثم عادة ما تكون الجرعة اليومية أقل من ١ ملغ إلى ٣ ملغ لكل كيلو غرام من وزن الجسم. خلال فترة العلاج، سيعمل الطبيب الجرعة بحسب استجابتك للدواء.

قد يحتاج المرضى كبار السن لخفض الجرعة.

قد يحتاج المرضى الذين يعانون من مشاكل بالكبد أو الكلى لجرعة مخفضة.

الاستخدام في حالات الأطفال

الأطفال الذين خضعوا من قبل لعملية زرع أعضاء : الجرعة للأطفال الذين خضعوا من قبل لعملية زرع الأعضاء هي ذاتها التي يتناولها البالغون.

الأطفال المصابون بحالات أخرى: الجرعة للأطفال المصابين بحالات أخرى هي ذاتها التي يتناولها البالغون.

قد يحتاج الأطفال الذين يعتبرون زائدي الوزن إلى جرعة أعلى.

في حال تناول كمية أكثر من اللازم من أقراص إمبروان

إذا تناولت الكثير من الأقراص، اتصل بطبيبك أو الصيدلي على الفور .

إن نسيبت تناول أقراص إمبروان

لا تتناول جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة التي فاتتك. أخبر الطبيب إذا ما فوّت جرعة.

في حالة اقتراب موعد جرعتك التالية، تخطئ الجرعة التي فاتتك وتناول جرعتك التالية في الموعد المحدد. عدا ذلك، تناول جرعتك بمجرد أن تتذكر، ثم ارجع إلى تناول الدواء على النحو المعتاد.

إذا توقفت عن تناول أقراص إمبروان

قبل الانقطاع عن تناول أقراص إمبروان، استشر طبيبك أو الصيدلي. لا تتوقف عن تناول أقراص إمبروان حتى يخبرك الطبيب أن القيام بذلك آمن.

إن كان لديك أي استفسارات أخرى حول استخدام هذا المنتج، اسأل طبيبك أو الصيدلي.

٤. الآثار الجانبية المحتملة

مثل جميع الأدوية، يمكن أن تسبب أقراص إمبروان آثارًا جانبية، على الرغم من أنه ليس بالضرورة أن يعاني منها الجميع. قد تحدث الآثار الجانبية التالية مع تناول هذا الدواء:

توقف عن تناول أقراص إمبروان واستشر طبيباً فوراً إذا لاحظت ظهور أي من الآثار الجانبية الخطيرة التالية، فربما تحتاج إلى علاج طبي عاجل:

- ردود فعل تحسسية (هذه آثار جانبية غير شائعة قد تؤثر على ١ من كل ١٠٠ شخص)، وقد تتضمن العلامات:
 - إعياء عام، تورّار، الشعور بالغثان (رغبة في القيء)، القيء أو الإسهال، أو آلم البطن

- تورم الجفون أو الوجه أو الشفتين
 - احمرار الجلد أو طفح جلدي (بما في ذلك ظهور بثور، أو حكة أو انتشار الجلد)
 - آلم في العضلات أو المفاصل

- آذير مناجين، حكة أو صعوبة في التنفس

- في حالات حادة قد تكون ردود الفعل هذه مهددة للحياة (نادرة جداً) حيث قد تؤثر على ١ من كل ١٠٠٠٠ شخص).
- الاحمرار أو الطفح الجلدي، الذي قد يتحول إلى ردود فعل جلدية مهددة للحياة بما في ذلك انتشار الطلع مع بثور وتقرحات وتقرن الجلد، على الأخص (يسبب انقطاع النفس والكحة (قد تكون هذه آثار جانبية شائعة للغاية قد تؤثر على أكثر من ١٠ أشخاص)

- التهابات الجلد، وتضمن العلامات أصفرار الجلد أو بياض العينين (يرقان) (قد تكون هذه آثار جانبية غير شائعة قد تؤثر على ١ من كل ١٠٠٠ شخص)
- التهاب رئوي قابل للعكس (التهاب يصيب الرئتين ويسبب انقطاع النفس، والكحة، والحمى) (قد تكون هذه آثار جانبية نادرة للغاية قد تؤثر على ١ من كل ١٠٠٠٠ شخص)

- مشكلات في الدم والنخاع العظمي، وقد تتضمن العلامات الضعف، والإعياء، والشحوب، وسهولة التكدّم، وعدوى أو نزيف غير معاد (قد تكون هذه آثار جانبية شائعة للغاية قد تؤثر على أكثر من ١٠ أشخاص)

- عند استخدام أقراص إمبروان، قد تزداد الإصابة إلى كابتات، قد تصاب بفيروس التهاب السحايا (تضيق البصر) وقد ينجم عن ذلك صداع، وتغيرات في السمع، ضعف الكلام، تدهور الذاكرة، والانتباه والقدرة على اتخاذ القرارات (انخفاض الإدراك) وقد يكون مصيباً (حالة تعرف باسم اعتلال بوضاء الدماغ متعدد البؤر المترقي المرتبط بفيروس جيه سي (JC virus) (قد تكون هذه آثار جانبية نادرة للغاية قد تؤثر على ١ من كل ١٠٠٠٠ شخص)

إذا ظهرت عليك أي من الآثار الجانبية الخطيرة التالية، أخبر طبيبك أو طبيب أخصائي على الفور فقد تحتاج لعلاج طبي طارئ.:

- إذا عانيت من ارتفاع درجة الحرارة (الحمى) أو أي من علامات الالتهاب مثل التهاب الحلق، أو قرحة الفم، أو مشاكل بولية أو التهاب الصدر الذي يسبب انقطاع النفس والكحة (قد تكون هذه آثار جانبية شائعة للغاية قد تؤثر على أكثر من ١٠ أشخاص)
- مشاكل بالكبد، وتضمن العلامات أصفرار الجلد أو بياض العينين (يرقان) (قد تكون هذه آثار جانبية غير شائعة قد تؤثر على ١ من كل ١٠٠٠ شخص)

- أنواع السرطان المختلفة بما في ذلك سرطان الدم، والغدد الليمفاوية، والجلد (راجع القسم ٢ التحذيرات والاحتياطات) (قد تكون هذه آثار جانبية نادرة قد تؤثر على ١ من كل ١٠٠٠٠ شخص)

- متلازمة سويت (تعرف أيضاً بالجلد الحموي الحاد بالعدلات) قد تصاب بطفح جلدي (كثل مرتفعة حمراء، أو وردية أو أرجوانية تكون مؤلمة عند لمسها)، خاصة على الذراعين، واليدين، والأصابع، والوجه، والرقبة، والتي قد تكون مصحوبة أيضاً بحمى (ارتفاع درجة الحرارة) (المعدل الذي تحدث به هذه الآثار الجانبية غير معروفة. لا يمكن تقديره من البيانات المتوفرة)

- نوع معين من سرطان الغدد الليمفاوية (لمفومة كبدية محالية ثنائية المتأخرة). قد تصاب بنزيف من الأنف، إجهاد، تعرّق ليلي غزير، فقدان وزن ونبويات حمى غير مبررة (ارتفاع درجة الحرارة) (المعدل الذي تحدث به هذه الآثار الجانبية غير معروف. لا يمكن تقديره من البيانات المتوفرة)

إذا لاحظت أي من الأعراض المذكورة أعلاه، توقف عن تناول أقراص إمبروان واستشر طبيبياً على الفور.

الآثار الجانبية الأخرى:

شائعة جداً (قد تؤثر على أكثر من ١ من كل ١٠ أشخاص):

- انخفاض مستوى خلايا الدم البيضاء في فحوصات الدم الخاصة بك، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالالتهاب.

شائعة (قد تؤثر على ١ من كل ١٠ أشخاص)

• الغثان (شعور برغبة في القيء)

غير شائعة (قد تؤثر على ١ من كل ١٠٠ شخص)

- أنيميا (انخفاض مستوى كرات الدم الحمراء)
- التهاب البنكرياس، الذي قد يؤدي إلى آلم شديد أعلى المعدة،

نادرة (قد تؤثر على ١ من كل ١٠٠٠ شخص)

- قد تلاحظ بعض تساقط الشعر أثناء تناولك أقراص إمبروان. غالباً ما ينمو الشعر مرة أخرى، حتى لو واصلت العلاج بأقراص إمبروان. إن كنت تشعر بالقلق فاسأل طبيبك .

نادرة جداً (قد تؤثر على ١ من كل ١٠٠٠ شخص)

- اضطراب أدي في الأمعاء قد يؤدي إلى إسهال وآلم في البطن وإمساك والشعور بالغثان (رغبة في القيء) والقيء (تعب الأمعاء)

غير معروف (لا يمكن تقدير مدى التكرار من البيانات المتوفرة):

- تحصن ضوئي (حساسية للضوء أو أشعة الشمس)

- إذا ظهرت عليك أي أعراض جانبية، فحدث مع طبيبك أو الصيدلي. وذلك يتضمن أي أعراض جانبية محتملة غير مدرجة في هذه النشرة.
- كيفية تخزين أقراص إمبروان
- كيف تبدو أقراص إمبروان وما هي محتويات العبوة
- إمبروان أقراص مغلفة ٢٥ ملغ، أقراص مغلفة صفراء اللون، مستديرة ومحدبة، بخط فاصل ومحفور عليها GX CH1.
- إمبروان أقراص مغلفة ٢٥ ملغ، أقراص مغلفة برتقالية اللون، مستديرة ومحدبة، بخط فاصل ومحفور عليها GX EL5.
- تتوفر أقراص إمبروان في عبب تحتوي على ١٠٠ قرص في ٤ شرائط يحتوي كل منها على ٢٥ قرصاً).
- مالك حق التسويق والمُصنّع
- مالك حق التسويق:

شركة آسبن فارما التجارية المحدودة، ٣٠١٦ ليك درايف، مجمع سيتي ويست للأعمال، دبليو ٢، أيرلندا

المُصنّع:

شركة أكسبلا المحدودة وشركاها حي، ١٢ شارع نوردرينج، ٩٠٥٣٧، فويسيت، ألمانيا

تمت آخر مراجعة لهذه النشرة في يونيو ٢٠١٩

للاستفسارات العامة بشأن هذا الدواء، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني:

AHC.Medinfo@aie.aspenpharma.com

للاستفسار عن المعلومات الطبية أو البينة الدوائية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني:

AHC.DrugSafety@aie.aspenpharma.com

***علامة تجارية.**

هذا الدواء:

هو دواء مستحضر يؤثر على مسلك واستهلاك خلافاً للتقاليد يُعرضك للخطر.

اتبع بدقة وصفة الطبيب، وطريقة الاستعمال المنصوص عليها، وتعليمات الصيدلي الذي صرف لكها.

- الطبيب والصيدلي خبيران في مجال الأدوية وفوائدها ومخاطرها.
- لا تقلع مدة العلاج الموصوفة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر نفس الوصفة الطبية بدون استشارة الطبيب.

- احتفظ بجميع الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال.

محيطن وزراء الصحة العرب،

اتحاد الصيدادلة العرب.

