

نشرة العبوة: معلومات للمريض جل® ١٥٠ ميكروغرام/غرام

إنجينول ميبوتيت

الرجاء الإطلاع على هذه النشرة كاملة بعناية قبل الشروع في استخدام هذا الدواء لأنها تتضمن معلومات مهمة بالنسبة لك.

-احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.

-إذا كان لديك سائلة أو استفسارات أخرى فاطرجهها على طبيبك أو على الصيدلي.

-لقد تم وصف هذا الدواء لك فقط، فلا تعطيه لآخرين لأنه قد يؤديهم حتى لو كانت الأعراض التي تظهر عليهم هي نفسها الأعراض التي تشعر بها.

-إذا زادت خطورة أي من الآثار الجانبية، أو إذا لاحظت أي آثار جانبية غير مدرجة في هذه النشرة، يرجى إبلاغ طبيبك أو الصيدلي.

بين كل عشرة (١٠) أشخاص:

في المنطقة المعالجة:
- حكة (هرش)

- تهيج

- ألم

الآثار الجانبية غير الشائعة، والتي قد تصيب حتى شخص واحد (١)

من بين كل مئة (١٠٠) شخص:

في المنطقة المعالجة:
- تحدُّر أو تتميل (مَذَل)

- دمامل مفتوحة (تفتح)

- إحساس بالدفء

إذا زادت خطورة أي من الآثار الجانبية، أو إذا لاحظت أي آثار جانبية غير مدرجة في هذه النشرة، يرجى إبلاغ طبيبك أو الصيدلي على الفور.

٥. كيفية تحزين Picato®

يُحفظ هذا الدواء بعيداً عن متناول أيدي الأطفال وعن أنظارهم.

يُحظر استخدام هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على العبة والأنبوب. وبشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى آخر يوم في ذلك الشهر.

تحزن في الثلاجة (٢-٨ درجات مئوية).

للاستعمال مرة واحدة فقط. يُحظر إعادة استخدام الأنابيب بعد فتحها.

يجب عدم التخلص من الأدوية عبر مياه الصرف الصحي أو في النفايات المنزلية؛ بل يجب سؤال الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد تستخدم، وهذه التدابير تساعد على حماية البيئة.

٦. محتويات العبوة ومعلومات أخرى مكونات Picato®

المادة الفعالة هي "إنجينول ميبوتيت". ويحتوي كل غرام من المادة الهمامية (الجل) على ١٥٠ ميكروغرام من مادة إنجينول ميبوتيت. ويحتوي كل أنابيب على ٧ ميكروغرام من مادة إنجينول ميبوتيت في ٤٢٪. غرام من الجل.

أما المكونات الأخرى فهي كحول إيزوبروبيل، وهيدروكسي إثيل سيلولوز، وحمض سترات أحادي الهيدرات، وسترات الصوديوم، وكحول بنزيلي، وماء نقي.

الشكل الصيدلي لدواء Picato® ومحتويات العبوة

إن دواء ١٥٠ Picato® ميكروغرام/غرام هو جل صاف عديم اللون، وتحتوي كل عبة كرتون على ٣ أنابيب، يحتوي كل منها على ٧٪. غرام من الجل.

صاحب رخصة التسويق والشركة المصنعة

صاحب رخصة التسويق

LEO Pharma A/S
Industriparken 55
DK 2750 Ballerup
Denmark

الشركة المصنعة
LEO Laboratories Ltd.
285 Cashel Road, Crumlin, Dublin 12
Ireland

للحصول على أية معلومات بشأن هذا الدواء، يرجى الاتصال على:

مصر

للإبلاغ عن أية آثار جانبية:

هاتف: (تم إضافته لاحقاً)

الإسكندرية

للإبلاغ عن أية آثار جانبية:

هاتف: (تم إضافته لاحقاً)

الجيزة

للإبلاغ عن أية آثار جانبية:

هاتف: (تم إضافته لاحقاً)

السويد

للإبلاغ عن أية آثار جانبية:

هاتف: (تم إضافته لاحقاً)

(EPVC)
مركز البقطة الدوائية المصري

هاتف: +٢٠١٢٣٤٢٨٧

+٢٠١٢٣٤٨٤٠٤

البريد الإلكتروني: epvc@eda.mohealth.gov.eg

الموقع الإلكتروني: www.eda.mohealth.gov.eg

السعودية:

للإبلاغ عن أية آثار جانبية:

هاتف: (تم إضافته لاحقاً)

المركز الوطني للبيئة الدوائية

هاتف: +٩٦٦١٢٣٧٩٨

البريد الإلكتروني: npc.drug@sfda.gov.sa

الموقع الإلكتروني: www.sfda.gov.sa/npc

دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى:

البريد الإلكتروني: PV@moh.gov.ae

الموقع الإلكتروني: www.moh.gov.ae

إن هذا دواء

- الدواء هو منتج يؤثر على صحتك ويمثل تعاطيه بما يخالف إرشادات استخدامه خطراً عليك.

- يجب اتباع وصفة الطبيب وطريقة الاستخدام وإرشادات الصيدلي الذي باع لك هذا الدواء.

- إن الطبيب والصيدلي خبران بالدواء وفوائدها ومحاذطتها.

- لا تحاول من تلقاء ذاتك أن توقف فترة العلاج الموصوفة لحالتك.

- لا تكرر نفس العلاج بدون استشارة الطبيب المتابع لحالتك.

- يجب حفظ جميع الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال.

أحدث مراجعة لهذه النشرة: ٢٠١٣/٠٣

مجلس وزراء الصحة العرب
اتحاد الصيادلة العرب

لا يستخدم هذا الدواء فوراً بعد الاستحمام، أو قبل النوم بأقل من ساعتين.


- لا تغسل المنطقة التي استخدمت عليها الجل لمدة ١ ساعات على الأقل بعد استخدامه.

- لا تلمس المنطقة المعالجة أو تسمم لأحد أو أي حيوانات أليفة بملمسها

للمدة ٦ ساعات بعد استخدام الجل عليها.

- لا تغطي المنطقة المعالجة بضمادات مانعة للهواء أو الماء بعد استخدام الجل عليها.

- يمكن تقدير الآثار الكامل لدواء Picato® بعد العلاج بثمانية (٨) أسابيع تقريباً



استخدام كمية من دواء Picato® أكثر من اللازم

الرجاء الاتصال بطبيبك أو الصيدلي إذا استخدمت كمية من دواء Picato® أكثر مما ينبغي.

إذا نسيت استخدام دواء Picato®

الرجاء الاتصال بطبيبك أو الصيدلي إذا نسيت أن تستخدم دواء Picato®.

إذا كان لديك أيه سائلة أو استفسارات أخرى حول استخدام هذا الدواء

فاطرجهها على طبيبك أو على الصيدلي.

٤. الآثار الجانبية المحتملة

يمكن لهذا الدواء أن يسبب في إحداث آثار جانبية. رغم أنها

لا تحدث لجميع الأشخاص.

يمكن أن يصاب الجلد بعد وضع هذا الدواء عليه بالإحمرار والتقرّب وظهور

تشقّص الجلد الجديد محل الجلد المتضرر، وتحدث هذه الآثار الجانبية في

أعلى الأحوال خلال يوم واحد من استخدام الدواء. وبما تزداد الآثار الجانبية

ما تحسن خلال أسبوع واحد بحد أقصى بعد التوقف عن استخدامه؛ ولكنها عادة

ما تحسن خلال أسبوعين من بداية استخدام هذا الدواء في المعالجة.

يمكن أن تصاب منطقة الجلد التي تتم معالجتها بالاحمرار والتقرّب

بأنه من الآثار الجانبية الشائعة. والتي يمكن أن تصيب حتى شخص واحد (١)

. أشخاص أبناء طبيبك أو الصيدلي إذا استخدمت كمية من دواء Picato® أكثر مما ينبغي.

إذا نسيت استخدام دواء Picato®

الرجاء الاتصال بطبيبك أو الصيدلي إذا نسيت أن تستخدم دواء Picato®.

إذا كان لديك أيه سائلة أو استفسارات أخرى حول استخدام هذا الدواء

فاطرجهها على طبيبك أو على الصيدلي.

الآثار الجانبية الأكثر تكراراً عند معالجة الوجه وفروة الرأس:

أكثر من شخص واحد (١) من بين كل عشرة (١٠) أشخاص:

في المنطقة المعالجة:

- يمكن أن تناكل الطبقة الخارجية من الجلد (الناكل)

- تقرّبات (حويصلات، بنور)

- تسلّفات (تقشر)

- ظهور قشور الجلد الجديد محل الجلد المتضرر

- أحمرار نتيجة توسيع الأوعية الدموية الصغيرة (داء الحمامي)

- ألم

الآثار الجانبية الأكثر تكراراً عند معالجة الجذع والأطراف:

أكثر من شخص واحد (١) من بين كل عشرة (١٠) أشخاص:

في المنطقة المعالجة:

- يمكن أن تناكل الطبقة الخارجية من الجلد (الناكل)

- تقرّبات (حويصلات، بنور)

- تسلّفات (تقشر)

- ظهور قشور الجلد الجديد محل الجلد المتضرر

- أحمرار نتيجة توسيع الأوعية الدموية الصغيرة (داء الحمامي)

الآثار الجانبية المحتملة الأخرى عند معالجة الوجه وفروة الرأس:

بين كل عشرة (١٠) أشخاص:

في المنطقة المعالجة:

- حكة (هرش)

- تهيج

- آثار جانبية أخرى:

- تورم (وذمة) جفن العين (وذمة ما حول المحجر)

- تورم (وذمة) جفن العين

- صداع

الآثار الجانبية غير الشائعة، والتي قد تصيب حتى شخص واحد (١)

من بين كل مئة (١٠٠) شخص:

في المنطقة المعالجة:

- تحدُّر أو تتميل (مَذَل)

- دمامل مفتوحة (تفتح)

- حروق (إفراز) سوائل

- آثار جانبية أخرى:

- ألم في العين

الآثار الجانبية المحتملة الأخرى عند معالجة الجذع والأطراف:

أمثلة على آثار جانبية قد تصيب حتى شخص واحد (١) من

محتويات هذه النشرة:

١. التعريف بـ Picato® دواعي استعماله

٢. ما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام Picato®

٣. كيفية استخدام Picato®

٤. الآثار الجانبية المحتملة

٥. كيفية تخزين Picato®

٦. محتويات العبوة ومعلومات أخرى

١. التعريف بـ Picato® دواعي استعماله

يحتوى Picato® على المادة الفعالة "إنجينول ميبوتيت".

يُستخدم هذا الدواء في المعالجة الموضعية (على الجلد) للمرضى البالغين الذين

يعانون من مرض "تقعر الجلد السفوي" على شكل بقع حشرة على الجلد بالأشخاص الذين

ويظهر "تقعر الجلد السفوي" على طبلة طولية على مدى جهاتهم، ويستخدم جل ١٥٠ Picato® ميكروغرام/غرام لعلاج مرض "تقعر الجلد السفوي" الذي يصيب الوجه وفروة الرأس.

٢. ما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام Picato®

لا تستخدم Picato® إذا كنت تعاني من حساسية تجاه مادة "إنجينول ميبوتيت" أو أي مادة أخرى

تدخل في تركيب هذا الدواء (موضحة في القسم ٢).

التحذيرات والاحتياطات

-تجنب ملامسة المنتج للعينين. وفي حالة التلامس العارض، تتم إزالة الجل بشطف العينين بكمية كبيرة من الماء، وينبغي الحصول على عناية طبية في أقرب وقت ممكن.

-يُمنع ابتلاع هذا الدواء. وفي حالة ابتلاعه بصورة عارضة، يجب شرب كمية كبيرة من الماء والحصول على العناية الطبية فوراً.