

Erycine[®] Gel

Erythromycine 4%



Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

- 1- QU'EST-CE QUE ERYCINE GEL ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
- 2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ERYCINE GEL ?
- 3- COMMENT PRENDRE ERYCINE GEL ?
- 4- QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
- 5- COMMENT CONSERVER ERYCINE GEL ?
- 6- INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE ERYCINE GEL ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament est indiqué pour le traitement de l'acné.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ERYCINE GEL ?

N'utilisez jamais ERYCINE Gel en cas d'allergie à l'érythromycine ou à l'un des autres constituants de ce médicament.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Liste des excipients à effet notoire : Ethanol

3. COMMENT PRENDRE ERYCINE GEL ?

Posologie

1 à 2 applications par jour, après nettoyage de la peau. Respectez strictement l'ordonnance de votre médecin.

Si vous avez l'impression que l'effet d'ERYCINE Gel est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Mode d'administration

Voie cutanée.

Si vous avez utilisé plus d'ERYCINE Gel que vous n'auriez dû : consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre ERYCINE Gel : ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ERYCINE Gel est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- Réactions cutanées et allergiques : irritation, prurit (démangeaisons), érythème (rougeur de la peau).
 - Sensation de sécheresse de la peau en début de traitement.
 - En raison de la présence d'alcool, les applications fréquentes sur la peau peuvent provoquer des irritations et une sécheresse de la peau.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains des effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER ERYCINE GEL ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser ERYCINE Gel après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

A conserver à une température ne dépassant pas +25°C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères.

Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés.

Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient ERYCINE Gel ?

La substance active est :

Erythromycine 4g pour 100g de gel

Les autres composants sont :

Hydroxypropylcellulose, éthanol à 96 pour cent.

Qu'est-ce que ERYCINE Gel et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de gel. Tube de 30g.

Titulaire et Exploitant :

LABORATOIRES BAILLEUL-BIORGA

8 rue Laugier - 75017 PARIS

Fabricant :

LABORATOIRES CHEMINEAU

93 route de Monnaie - BP 16 - 37210 VOUVRAY

CONSEILS/EDUCATION SANITAIRE

Que savoir sur les antibiotiques ?

Les antibiotiques sont efficaces pour combattre les infections dues aux bactéries. Ils ne sont pas efficaces contre les infections dues aux virus.

Aussi, votre médecin a choisi de vous prescrire cet antibiotique parce qu'il convient précisément à votre cas et à votre maladie actuelle.

Les bactéries ont la capacité de survivre ou de se reproduire malgré l'action d'un antibiotique.

Ce phénomène est appelé résistance : il rend certains traitements antibiotiques inactifs.

La résistance s'accroît par l'usage abusif ou inapproprié des antibiotiques.

Vous risquez de favoriser l'apparition de bactéries résistantes et donc de retarder votre guérison ou même de rendre inactif ce médicament, si vous ne respectez pas :

- la dose à prendre,
- les moments de prise,
- et la durée du traitement.

En conséquence, pour préserver l'efficacité de ce médicament :

- 1- N'utilisez un antibiotique que lorsque votre médecin vous l'a prescrit.
- 2- Respectez strictement votre ordonnance.
- 3- Ne réutilisez pas un antibiotique sans prescription médicale même si vous pensez combattre une maladie apparemment semblable.
- 4- Ne donnez jamais votre antibiotique à une autre personne, il n'est peut-être pas adapté à sa maladie.
- 5- Une fois votre traitement terminé, rapportez à votre pharmacien toutes les boîtes entamées pour une destruction correcte et appropriée de ce médicament.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est octobre 2009.