

anestocil®

Chlorhydrate d'oxybuprocaine 0,4%

4 mg/ml collyre en solution

NOTICE: INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ou d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice:

1. Qu'est-ce que Anestocil et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Anestocil
3. Comment utiliser Anestocil
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Anestocil
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE ANESTOCIL ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ

Anestocil est un collyre en solution, qui contient le chlorhydrate d'oxybuprocaine, à une concentration de 4 mg/ml, dans un milieu osmotique stérile et de pH approprié. Anestocil a une action anesthésique superficielle de la cornée.

Anestocil est indiqué pour l'anesthésie superficielle qui s'avère nécessaire dans certains actes médicaux, tels que: tonométrie, examens pour lentilles de contact et extraction de corps étrangers de la cornée et de la conjonctive.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER ANESTOCIL N'utilisez jamais Anestocil

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (oxybuprocaine chlorhydrate) ou à l'un des autres composants contenus dans Anestocil;
- Pour améliorer la tolérance des lentilles de contact.

Faites attention avec Anestocil

- Un collyre anesthésique n'a aucune action curative; ainsi, en cas d'emploi sans indication du médecin pour calmer une douleur du globe oculaire, il ne devra pas être administré pendant plus de deux jours sans consulter l'ophtalmologue;
- L'usage indu de ce collyre peut provoquer de graves lésions de la cornée et des modifications irréversibles de la vue;
- Ce collyre ne doit pas être employé pour calmer une douleur du globe oculaire, sans avoir eu le diagnostic préalable de l'ophtalmologue, celle-ci peut en effet dissimuler ou aggraver des lésions au niveau de la cornée;
- Son usage doit être prudent chez des malades présentant une allergie et de l'hyperthyroïdisme;
- Ne pas l'appliquer chez de jeunes enfants, sauf indication spécifique du médecin.

Utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Il n'y a pas d'interactions connues entre Anestocil et d'autres médicaments.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament. Aucun test n'a été effectué dans ces situations; donc ce collyre ne doit pas être administré pendant la grossesse ou l'allaitement.

3. COMMENT UTILISER ANESTOCIL

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

La posologie doit être instituée par le médecin spécialiste selon les besoins de chaque cas. La dose habituelle est: 1 à 2 gouttes, deux minutes avant l'acte médical.

Ne pas l'appliquer chez de jeunes enfants, sauf indication spécifique du médecin.

Appliquez le collyre dans le cul-de-sac conjonctival (espace entre l'œil et la paupière, évitez le contact de l'embout du compte-gouttes avec les yeux ou les cils).

Après ouverture du flacon, le produit ne doit pas être utilisé au-delà de 28 jours.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS

Comme tous les médicaments, Anestocil peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Au moment de l'application, il peut se produire une sensation de chaleur ou de picotements qui, en dehors des sensations désagréables momentanées, n'ont aucune conséquence. Au niveau oculaire: conjonctivite, œdème cornéen, ulcère de la cornée, retard de la cicatrisation cornéenne et kératite punctata.

Si vous ressentez un des effets mentionnés comme grave ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER ANESTOCIL

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser Anestocil après la date de péremption mentionnée sur le flacon après "EXP". La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Conserver le flacon soigneusement fermé, dans l'emballage extérieur d'origine, à l'abri de la lumière et l'humidité.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES Que contient Anestocil

- La substance active est le oxybuprocaine chlorhydrate;
- Les autres composants sont: chlorure de sodium, nitrate de phénylmercure et eau hautement purifiée.

Qu'est ce que Anestocil et contenu de l'emballage extérieur

Anestocil est présenté sous la forme pharmaceutique de collyre contenu dans un flacon compte-gouttes, stérile, en LD-polyéthylène avec une bouchon de HD-polyéthylène. Chaque flacon contient 10 ml de solution de Anestocil collyre en solution.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Laboratório Edol - Produtos Farmacêuticos, S.A.
Av. 25 de Abril, 6
2795-195 Linda-a-Velha
Portugal
tel: +351 21 415 81 30
fax: +351 21 415 81 31
e-mail: geral@edol.pt

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 02/2010

IL S'AGIT D'UN MÉDICAMENT

- Le médicament est un produit qui affecte votre santé, et son utilisation contraire aux instructions est dangereuse pour vous.
- Respecter scrupuleusement les indications du médecin, le mode d'administration et les instructions du pharmacien qui a vendu le médicament.
- Le médecin et le pharmacien sont experts en médicaments et connaissent leurs bénéfices et des risques.
- Ne pas interrompre le traitement prescrit pour vous.
- Ne pas répéter la même prescription sans consulter votre médecin.
- Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Conseil des Ministères de la Santé Arabe
Union des Pharmaciens Arabes