

Deflamol

TRAITEMENT D'APPOINT DE L'ERYTHEME FESSIER DU NOURRISSON

IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT :

DÉNOMINATION : DÉFLAMOL, pommade

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

OXYDE DE ZINC .. 3,50 g

DIOXYDE DE TITANE .. 4,50 g

Excipients: graisse de laine, vaseline, paraffine liquide, huile essentielle de citron, huile essentielle de verveine. Pour 100 g de pommade

FORME PHARMACEUTIQUE : Pommade, tube de 30 g.

CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE : Topique cutané protecteur et émollient.

DANS QUEL CAS UTILISER CE MÉDICAMENT : Traitement d'appoint des irritations cutanées, notamment l'érythème fessier du nourrisson.

ATTENTION ! DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT :

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- allergie à l'un des composants (graisse de laine ou lanoline...),
- lésions suintantes,
- lésions surinfectées.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI : L'utilisation en pansement fermé peut favoriser la surinfection.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS : *AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.*

GROSSESSE – ALLAITEMENT : D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement, de toujours demander l'avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre un médicament.

LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NÉCESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS : Graisse de laine.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT : POSOLOGIE : Appliquer plusieurs fois par jour, après chaque change.
MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION : Voie cutanée.

Appliquer plusieurs fois par jour sur la région irritée de petites quantités de pommade et faire pénétrer en massant doucement. En cas d'érythème fessier du nourrisson, appliquer après chaque change.

EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS : *COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS notamment, allergie cutanée due à l'un des constituants (graisse de laine ou lanoline...)*

NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

SIGNEZ A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION : NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION : À conserver à une température inférieure à 25°C.

Fabricant : Laboratoires CHEMINEAU 93 route de Monnaie 37210 Vouvray

Exploitant : SOFIBEL 110-114 rue Victor Hugo 92686 Levallois-Perret Cedex - France

MÉDICAMENT AUTORISÉ N° 302 867-7

DATE DE REVISION DE LA NOTICE : Juin 1996

Deflamol

ADJUNCTIVE TREATMENT OF NAPPY RASH IN INFANTS

NAME OF THE DRUG

NAME : Déflamol, ointment

QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION :

ZINC OXIDE..... 3.50 g

TITANIUM DIOXIDE..... 4.50 g

Excipients : wool fat, vaseline, liquid paraffin, essential oil of lemon, essential oil of verbena. Per 100 g of ointment.

PHARMACEUTICAL FORM : ointment, tube containing 30 g.

PHARMACOTHERAPEUTIC CLASS : protective and emollient topical skin product.

WHEN SHOULD THIS MEDICAMENT BE USED ? Adjunctive treatment of skin irritation, particularly nappy rash in infants.

WARNING ! WHEN SHOULD THIS MEDICAMENT NOT BE USED ?
This drug MUST NOT BE USED in the following cases :

- allergy to any of the ingredients (wool fat or lanolin...),
- weeping wounds,
- superinfected lesions

IF YOU ARE IN ANY DOUBT, YOU MUST CONSULT YOUR DOCTOR OR YOUR PHARMACIST FOR ADVICE.

PRECAUTIONS FOR USE : use in under an occlusive dressing may promote superinfection.
IF YOU ARE IN ANY DOUBT, DO NOT HESITATE TO SEEK THE ADVICE OF YOUR PHARMACIST OR YOUR DOCTOR.

INTERACTIONS WITH OTHER MEDICAMENTS AND OTHER FORMS OF INTERACTION : IN ORDER TO AVOID POSSIBLE INTERACTIONS BETWEEN VARIOUS DRUGS, YOU MUST ALWAYS TELL YOUR DOCTOR OR YOUR PHARMACIST ABOUT ANY OTHER TREATMENT YOU ARE RECEIVING.
PREGNANCY - LACTATION : As a general rule, if you are pregnant or breastfeeding you should always seek the advice of your doctor or pharmacist before taking any medication.

LIST OF EXCIPIENTS THE KNOWLEDGE OF WHICH IS NECESSARY FOR RISK-FREE USE IN SOME PATIENTS : wool fat.

HOW TO USE THIS DRUG : DOSAGE. Apply several times a day, after each change.
METHOD AND ROUTE OF ADMINISTRATION : cutaneous route.
Apply small quantities of ointment to the irritated regions several times a day and cause to penetrate by rubbing gently. In case of nappy rash in infants, apply after each change.

UNDESIRABLE AND DISTRESSING EFFECTS : AS WITH ANY ACTIVE SUBSTANCE, THIS DRUG MAY RESULT IN MORE OR LESS DISTURBING EFFECTS IN SOME INDIVIDUALS particularly skin allergy due to one of the ingredients (wool fat or lanolin...).

DO NOT HESITATE TO SEEK THE ADVICE OF YOUR PHARMACIST OR YOUR DOCTOR.

REPORT ANY UNDESIRABLE OR DISTRESSING EFFECTS WHICH HAVE NOT BEEN MENTIONED IN THIS PACKAGE INSERT TO YOUR DOCTOR OR PHARMACIST.

STORAGE : DO NOT USE AFTER THE EXPIRY DATE SHOWN ON THE OUTER PACKAGING.

AL STORAGE PRECAUTIONS : to be stored at a temperature of less than 25° C.

Vouvray

SPECI

Manufacture : Laboratoires CHEMINEAU 93 route de Monnaie 37210

Marketing authorisation holder : SOFIBEL 110-114 rue Victor Hugo 92686 Levallois-Perret Cedex - France

AUTHORISED DRUG N° 302 867-7

TEXT REVISION DATE : June 1996

AN1010 0001