

# Azonit D<sup>®</sup>

(Nirate d'isoconazole et valérate de diflucortolone)

## **Propriétés pharmacologiques**

**Azonit D<sup>®</sup>** est un produit fongicide pour application locale. La présence de la valérate de diflucortolone rend ce produit convenable pour le traitement des mycoses accompagnée de symptômes cutanés et ayants une nature eczémateuse.

## **Indications**

- Mycoses superficielles de la peau poilue ou pas, tels que: dermatophytes, pityriasis versicolor, candidiase.
- Mycoses accompagnées de symptômes cutanés de natures inflammatoires ou eczémateuses.

## **Posologie et administration**

### Dose usuelle des adultes:

**Azonit D<sup>®</sup>** Est appliqué deux fois par jour sur la surface affectée. Pour le traitement des mycoses entre les orteils: un coton trempé avec **Azonit D<sup>®</sup>** doit être mis entre les orteils.

Après une semaine de traitement avec **Azonit D<sup>®</sup>** ou bien quand les symptômes inflammatoires et eczémateux disparaissent, il est recommandé d'arrêter **Azonit D<sup>®</sup>** et de continuer le traitement si nécessaire avec un produit uniquement fongicide ou bien avec un produit uniquement corticoïde.

### Dose pédiatrique usuelle:

**Azonit D<sup>®</sup>** doit être chez les nourrissons seulement si nécessaire et sous surveillance médicale

## **Utilisation en cas grossesse**

**Azonit D<sup>®</sup>** doit être utiliser chez la femme enceinte seulement si nécessaire et sous surveillance médicale.

## **Effets secondaires**

**Azonit D<sup>®</sup>** est en général bien toléré. Mais comme avec tous les produits contenant des corticoïdes, un traitement d'une durée de plus de semaines ou l'application sur des grandes surfaces peuvent provoquer des effets secondaires liés à l'absorption des corticoïdes comme: atrophies cutanée, hypertrichose, dépigmentation, stries, télangiectasies, sensation de brûlure, irritation, et folliculite.

## **Précautions**

- Un traitement prolongé peut causer l'apparition des micro-organismes résistants à l'anti-microbien présent dans ce produit.
- Ce produit doit être appliqué soigneusement sur le visage car il ne doit pas être appliqué au près des yeux.

## **Interactions médicamenteuses**

Aucune interaction médicamenteuse n'a été rapportée.

## **Contre-indications**

Hypersensibilité à l'un des composants de ce produit, présence d'une infection tuberculeuse. Syphilitique ou virale dans la surface à traité.

## **Mises en garde**

Une utilisation prolongée des produits locaux peut provoquer un phénomène de sensibilisation. en ce cas arrêter le traitement et utiliser une thérapie convenable.

## **Présentations**

**Azonit D<sup>®</sup> crème:** 1g de crème contient: 10mg de nitrate d'isokonazole et 1mg de valérate de diflucortolone.

(Disponible en boites à contenu différent)

(Ceci est un médicament - Garder les médicaments hors de la portée des enfants.)

- Le médicament est un produit qui agit sur votre santé, et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respecter rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et la mode d'emploi prescrit, ainsi que les conseils de votre pharmacien.
- Le médecin et le pharmacien sont les meilleures personnes à connaître le médicament, ses avantages et ses risques.
- N'arrêter pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne répéter pas le médicament sans l'avis de votre médecin