

نشرة الدواء : معلومات للمريض

موسيرول ٣ أقراص مغلفة بالفلم

باراسيتامول ٤٥٠ ملغ، ستترات أورفينادرين ٣٥ ملغ، أييبوروفين ٢٠٠ ملغ

اقرأ هذه النشرة بالكامل بعناية قبل القيام بتناول هذا الدواء حيث أنها تحتوي على معلومات مهمة لك.

- إحتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج إليها لاحقًا.
- في حال وجود أي تساؤلات لديك، يُفضل استشارة الطبيب المعالج أو الصيدلي.
- لقد وُصف هذا الدواء لك شخصيًّا، ولا ينبغي بك أن تعطه لأحد آخر حتى لو ظهرت عليه نفس أعراض مرضك فقد يؤدي ذلك إلى الإضرار به.
- إذا أصبت بأي آثار جانبية غير مذكورة في هذه النشرة، أخبر الطبيب المعالج أو الصيدلي.

ما الذي تحتويه هذه النشرة

١. ما هو موسيرول ٣ وما هي دواعي استعماله
٢. ما الذي يجب عليك معرفته قبل تناول موسيرول ٣
٣. ما هي طريقة تناول موسيرول ٣
٤. الأعراض الجانبية المحتملة
٥. طريقة تخزين موسيرول ٣
٦. محتويات العلبة ومعلومات إضافية أخرى

١ . ما هو موسيرول ٣ وما هي دواعي استعماله

يحتوي هذا الدواء على المواد الفعالة التالية: باراسيتامول، سترات أورفينادرين وأيبوبروفين.

الباراسيتامول هو مسكن يعمل بطريقة مختلفة عن الأيبوبروفين، يُستخدم لمعالجة الآلام أو لمنع حدوثها ويخفف الحمى.

سترات الأورفينادرين هي مادة مريحة للعضلات الهيكلية، تؤثر على الجهاز العصبي المركزي وبالتالي تحدث ارتخاء في وظيفة العضلات.

ينتمي الأيبوبروفين إلى مجموعة الأدوية المعروفة باسم مضادات التهاب غير الستيرويدية (المسكنات). تقوم مضادات التهاب غير الستيرويدية بتسكين الآلام وتخفيف التهاب والتورم والحمى.

يستخدم موسيرول ٣ لمعالجة الآلام الناتجة عن الروماتيزم وآلام الظهر. يساعد على استرخاء عضلات معينة في الجسم ويخفف الألم والانتعاج الناجمين عن الانتواءات أو الإجهاد العضلي أو أي إصابة أخرى في العضلات والمفاصل. يُستخدم موسيرول ٣ أيضًا لمعالجة صداع التوتر والصداع الناجم عن تشنج عضلات مؤخرة الرأس والرقبة.

يتم وصف هذا الدواء خصوصًا لمعالجة الآلام التي تتطلب مسكن له تأثير أقوى من الأيبوبروفين أو الباراسيتامول في حال تم تناولهما كل على حدة.

٢ . ما الذي يجب عليك معرفته قبل تناول موسيرول ٣

لا تتناول موسيرول ٣

- إذا كان لديك حساسية (حساسية مفرطة) للباراسيتامول، لسترات الأورفينادرين أو للأيبوبروفين، أو لمضادات التهاب غير الستيرويدية الأخرى، للأسبرين، أو لأي أدوية أخرى مماثلة، أو لأي من مكونات هذا الدواء (الدرجة في القسم ٦).

- إذا كنت تتناول أي أدوية أخرى لتسكين الآلام بما في ذلك الأيبوبروفين، الباراسيتامول، جرعة عالية من الأسبرين (أكثر من ٧٥ ملغ في اليوم) أو مضادات التهاب غير الستيرويدية الأخرى بما في ذلك مثبطات سيكلو أوكسيجيناز (كوكس-٢) الانتقائية.

- إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط العين (الزرق).
- إذا كنت تعاني من انسداد معوي أو مرض مريئي.
- إذا كنت تعاني من تضخم البروستاتا أو انسداد المثانة.

- إذا كنت تعاني من مرض في العضلات يسمى الوهن العضلي الوبيل الذي يسبب تدلي الجفون، الرؤية المزدوجة، صعوبة في الكلام والبلع، وأحيانًا ضعف في عضلات الذراعين أو الساقين.

- إذا كنت تُصاب بسهولة بكدمات أو نزيف.

- إذا كنت تعاني أو قد عانيت سابقًا من قرحة أو نزيف في المعدة أو قرحة الاثني عشر (الأمعاء الدقيقة).
- إذا كنت تعاني من أمراض خطيرة في القلب، الكبد أو الكلى.
- إذا كنت حاملًا.

التحذيرات والإحتياطات

استشر الطبيب المعالج أو الصيدلي قبل تناول موسيرول ٣:

- إذا كان لديك حساسية تجاه أي أدوية أو أطعمة أو مواد حافظة أو أصباغ أخرى.
- إذا كنت مسنًا.
- إذا كنت تعاني من أمراض في الكلى، الكبد أو الأمعاء.
- إذا كنت تواجه صعوبة في التوقف عن شرب الكحول.
- إذا كنت تعاني من الربو أو كنت قد عانيت منه سابقًا.

- إذا كنت تخططين لإنجاب طفل.

- إذا كنت ترضعين طفلك أو تخططين للرضاعة الطبيعية.

- إذا كنت تعاني من أي اضطراب في التنسج الضام، مثل الذئبة الحمامية الجهازية (SLE).

- إذا كنت تعاني من اضطرابات في الجهاز الهضمي أو مرض التهاب الأمعاء المزمن (مثل التهاب القولون التقرحي ومرض كرون).

- إذا كنت تعاني من أمراض في القلب أو عانيت سابقًا من سكتة دماغية أو تعتقد أنك قد تكون عرضة للإصابة بهذه الأمراض (على سبيل المثال إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو السكري أو ارتفاع الكوليسترول أو إذا كنت مدخنًا)، يجب أن تستشير الطبيب المعالج أو الصيدلي . قد تؤدي بعض الأدوية مثل الأيبوبروفين إلى زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية ("احتشاء عضلة القلب") أو السكتة الدماغية. قد يزيد الخطر إذا تم تناول جرعات عالية وإذا دام العلاج لفترات طويلة. لا تتجاوز الجرعة الموصى بها أو مدة العلاج

المحددة. إن كبار السن أكثر عرضة للإصابة بأثار جانبية.

إذا كانت الشروط المذكورة أعلاه تنطبق عليك، استشر الطبيب المعالج.

الأطفال والمراهقون

لا يجوز إعطاء هذا الدواء للمرضى الذين تقل أعمارهم عن ١٨ عامًا.

الأدوية الأخرى وموسيرول ٣

أبلغ الطبيب المعالج أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرًا أو قد تتناول أي أدوية أخرى بما في ذلك الأدوية التي يتم الحصول عليها بدون وصفة طبية.

على وجه الخصوص:

- الأدوية المضادة للكلولين (الأدوية المستخدمة لتخفيف تقلصات أو تشنجات المعدة).

- الأدوية المستخدمة لمعالجة الاكتئاب أو أمراض نفسية أخرى.

- أدوية أخرى مثبطة للجهاز العصبي المركزي (CNS)، بما في ذلك الكحول.

تشمل مثبطات الجهاز العصبي المركزي مضادات الهيستامين أو الأدوية المستخدمة لمعالجة حمى القش، الحساسية أو نزلات البرد الأخرى: المسكنات أو المهدئات: المسكنات الأفيونية (مثل ديكستروبروبيوكسيفين)؛ الباربيتورات: الأدوية المستخدمة لمعالجة النوبات؛ الأدوية المخدرة بما في ذلك بعض أنواع التخدير المستخدمة للأسنان؛ ومخربات العضلات الأخرى.

- الأدوية المستخدمة لمعالجة الصدغ أو النوبات.

- الأدوية المستخدمة لتسييل الدم أو منع التخثر، مثل الأسبرين والوارفارين.

- الأدوية التي تؤثر على الجهاز الهضمي مثل ميتوكلوراميد.

- مدرات البول (أدوية لإزالة السوائل الزائدة من الجسم عن طريق زيادة إفراز البول).

- الأدوية المستخدمة لمعالجة ارتفاع ضغط الدم مثل كابيتوبريل، أتينولول، فالسارتان.

- الأدوية المستخدمة في علاج ارتفاع الكوليسترول، مثل كوليسترامين.

- الميثوتريكسات الذي يُستخدم لمعالجة التهاب المفاصل الروماتويدي.

- الميفيستون الذي يُستخدم للإجهاض - لا يجب تناول أييبوروفين لمدة ١٢ يوم بعد الميفيبيريستون.

- سيكلوسبورين وتاكروليموس اللذين يُستخدمان بعد الزرع.

- أدوية الكورتيكوستيرويد المستخدمة لمعالجة التهاب أو الحساسية.

- المضادات الحيوية مثل كلورامفينيكول أو عائلة الكينولون مثل سيبروفلوكساسين.

- عائلة السلفونيل يوريا مثل غليبيكلاميد لمعالجة مرض السكري.

- زيدوفودين أو ريتونافير لمعالجة عدوى فيروسية أو فيروس نقص المناعة البشرية.

- دواء مثل الديجوكسين لمعالجة قصور القلب.

- بنتوكسيفيللين الذي يُستخدم لمعالجة اضطرابات الدورة الدموية.

- باكالوفين الذي يُستخدم للتخفيف من تشنج العضلات.

- المسكنات الأخرى.

قد تحتاج إلى جرعات مختلفة من الأدوية التي تتناولها، أو قد تحتاج إلى تناول أدوية أخرى. اسأل الطبيب المعالج أو الصيدلي لمزيد من المعلومات حول الأدوية التي يجب توخي الحذر عند تناولها أو تجنبها أثناء تناول موسيرول ٣.

موسيرول ٣ مع الطعام والكحول

لتقليل احتمال حدوث آثار جانبية، تناول موسيرول ٣ مع الطعام. يُمنع تناول الكحول أثناء تناول هذا الدواء.

الحمل والرضاعة الطبيعية

إذا كنت حاملًا أو ترضعين طفلك، تعتقدين أنك حامل أو تخططين لإنجاب طفل، استشيري الطبيب المعالج أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

لا يُنصح باستخدام هذا الدواء أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية.

سيشرح لك الطبيب المعالج أو الصيدلي المخاطر والفوائد المحتملة لاستخدام هذا الدواء أثناء الحمل.

ينتمي الأيبوبروفين إلى مجموعة الأدوية التي قد تضعف الخصوبة عند النساء. هذا التأثير سيروزل تدريجيًا عند التوقف عن تناول الدواء. من غير المحتمل أن يؤثر الأيبوبروفين إذا تم استخدامه من حين إلى آخر، على إمكانية حدوث الحمل، ولكن استشيري الطبيب المعالج قبل تناول هذا الدواء إذا كنت تعانين من مشاكل في الحمل.

القيادة واستخدام الآلات

كن حذرًا عند القيادة أو استخدام الآلات حتى تتأكد من كيفية تأثير هذا الدواء عليك.

قد يسبب موسيرول ٣ آثار جانبية لدى بعض الأشخاص مثل تشوش الرؤية، الشعور بالنعاس، الدوار، الدوخة، الإغماء أو قد يصبحون أقل يقظة مما هم عليه في المعتاد. قد يسبب أيضًا ضعف في العضلات لدى بعض الأشخاص.

إذا واجهت أي من هذه الأعراض، لا تقود السيارة ولا تستخدم الآلات ولا تقوم بأي نشاط آخر يمكن أن يكون خطيرًا.

٣. ما هي طريقة تناول موسيرول ٣

اتبع إرشادات الطبيب المعالج بدقة عند استخدام هذا الدواء واستشر الطبيب المعالج إذا لست متأكدًا.

يجب استخدام أقل جرعة فعالة لأقصر وقت ضروري لتخفيف الآلام.

تناول قرص أو قرصين إلى جانب كوب من الماء أو وجبة طعام، لغاية ٣ مرات في اليوم. يجب أن تكون الفترة الزمنية بين جرعة وأخرى ٦ ساعات على الأقل.

لا تتناول أكثر من ٦ أقراص خلال فترة ٢٤ ساعة.

يجب أن تستشير الطبيب المعالج إذا استمرت الأعراض أو ساءت أو في حال وُصف لك هذا الدواء لأكثر من ٣ أيام.

إذا تناولت موسيرول ٣ بكمية أكبر مما ينبغي عليك

إذا تناولت هذا الدواء بكمية أكبر مما ينبغي عليك، توقف عن تناوله واتصل بالطبيب المعالج على الفور حتى لو شعرت بتحسن. قد تؤدي الجرعات الزائدة من الأدوية التي تحتوي على الباراسيتامول إلى تلف الكبد. سوف تحتاج إلى عناية طبية عاجلة.

قد تعاني من أعراض الجرعة الزائدة والتي تشمل: ألم في البطن، القيء، زيادة التعرق، نعاس شديد، صعوبة في التنفس، تغير لون البشرة أو الأغشية المخاطية لتصبح زرقاء والذي عادة ما ينتج عن نقص الأكسجين في الدم (الزراق)، الانفعال، الارتباك، الارتباك الحاد الذي يؤدي إلى غيبوبة، تشنجات، تسارع ضربات القلب، اتساع حدقة العين وصعوبة في التبول.

إذا نسيت تناول موسيرول ٣

إذا نسيت تناول جرعة من هذا الدواء وتذكرت في غضون ساعة بعد موعد الجرعة الفائتة، تناولها على الفور. إذا لم تتذكر إلا لاحقًا، تجاوز الجرعة الفائتة وتناولها كالمعتاد، ثم تناول الجرعة التالية بعد ٦ ساعات على الأقل. لا تتناول جرعة مضاعفة للتعويض عن الجرعة الفائتة.

إذا كان لديك أي أسئلة إضافية حول طريقة تناول هذا الدواء، إسأل الطبيب المعالج أو الصيدلي.

٤ . الأعراض الجانبية المحتملة

قد ينتج عن هذا الدواء وكذلك باقي الأدوية، آثارًا جانبية إلا أنها قد لا تصيب الجميع.

إن الآثار الجانبية التالية نادرة جدًا ولكن إذا واجهت أيًا منها، توقف عن تناول هذا الدواء فورًا واتصل بالطبيب المعالج:

- حرقة المعدة وعسر الهضم
- علامات تدل على وجود نزيف في الأمعاء (آلام شديدة في المعدة، تقيؤ دم أو سائل يشبه حبيبات القهوة، ظهور دم في البراز، براز أسود مثل لون القطران)
- علامات تدل على التهاب بطانة الدماغ مثل: تصلب الرقبة، الصداع، الشعور بالغثيان أو الغثيان، الحمى أو الشعور بالارتباك
- علامات تدل على رد فعل تحسسي شديد (تورم الوجه، اللسان أو الحلق، تسارع ضربات القلب، دوار أو إغماء)
- تفاقم الربو والصفير أو صعوبة في التنفس

قد يسبب أيضًا موسيرول ٣ الآثار الجانبية نفسها التي تم الإبلاغ عنها سابقًا مع مكوناته (الأييبوروفين والباراسيتامول والأورفينادرين) إذا تم تناولها كل على حدة.

الأييبوروفين

الآثار الجانبية غير الشائعة: تفاعلات تحسسية مثل الشرى، الطفح الجلدي، الحكة (أو الذئبة الحمامية الجهازية)، آلام في البطن، عسر الهضم، حرقة المعدة، الشعور بالغثيان والصداع.

الآثار الجانبية النادرة: الإسهال، انتفاخ البطن، الإمساك والغثيان.

الآثار الجانبية النادرة جدًا: انخفاض عدد خلايا الدم قد يجعل الجلد شاحبًا أو أصفر اللون، ويسبب الحمى، التهاب الحلق، وتقرحات خفيفة في الفم.

أعراض تشبه الإنفلونزا، إرهاق أو ضعف، الإصابة بكدمات بسهولة، نزيف من الجلد أو الأنف. ارتفاع ضغط الدم، قصور القلب أو آلام في الصدر. توتر، اضطراب الرؤية، طنين في الأذنين ودوار.

مشاكل في الكبد: تشمل الأعراض اصفرار الجلد أو بياض العينين.

مشاكل في الكلى: قد تشمل الأعراض تورم الكاحلين.

ردود فعل جلدية شديدة: قد تشمل الأعراض ظهور تقرحات.

قد تزيد الأدوية مثل الأيبوبروفين من خطر الإصابة بنوبة قلبية ("احتشاء عضلة القلب") أو السكتة الدماغية. إذا تفاقمت أي من الآثار الجانبية المذكورة في هذه النشرة، أو إذا لاحظت أي آثار جانبية أخرى، توقف عن تناول هذا الدواء على الفور واتصل بالطبيب المعالج أو الصيدلي.

الباراسيتامول

الآثار الجانبية غير الشائعة: اضطرابات تخثر الدم مما قد يؤدي إلى سهولة حدوث كدمات أو نزيف.

الآثار الجانبية النادرة: انخفاض حاد في عدد خلايا الدم البيضاء مما يزيد من احتمال حدوث العدوى؛ ضيق في التنفس.

الأورفينادرين

الآثار الجانبية الشائعة: جفاف الفم، اضطرابات في المعدة، دوار، صعوبة في الرؤية

الآثار الجانبية غير الشائعة: تسارع ضربات القلب، تقلبات في المزاج مثل الهوس، الارتباك، النعاس، الهلوسة، صعوبة في النوم، التوتر، النوبات، صعوبة في التبول.

الآثار الجانبية النادرة: اضطراب الذاكرة.

الإبلاغ عن الآثار الجانبية

إذا واجهت أي آثار جانبية، استشر الطبيب المعالج أو الصيدلي، بما في ذلك أي آثار جانبية محتملة غير مذكورة في هذه النشرة. من خلال الإبلاغ عن الآثار الجانبية، يمكنك المساعدة في توفير مزيد من المعلومات حول سلامة هذا الدواء.

٥. طريقة تخزين موسيرول ٣

- قم بتخزين هذا الدواء بعيدًا عن مرآى ومتناول الأطفال.

- لا تستعمل هذا الدواء بعد انتهاء تاريخ الصلاحية والمذكور على الشريط الداخلي والعبوة الخارجية. يشير انتهاء تاريخ الصلاحية إلى آخر يوم من الشهر.

- لا تقم بتخزين هذا الدواء في درجة حرارة تزيد عن ٣٠ درجة مئوية. إحتفظ بعيدًا عن الرطوبة.

- لا تستخدم هذا الدواء إذا لاحظت علامات تدهور واضحة عليه.

- لا تتخلص من أي أدوية عبر مياه الصرف الصحي. إسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد بحاجة إليها، ستساعد هذه الإجراءات على حماية البيئة.

٦ . محتويات العلبة ومعلومات إضافية أخرى

على ماذا يحتوي موسيرول ٣

- المواد الفعالة هي الباراسيتامول وسترات الأورفينادرين والأيبوبروفين.

يحتوي كل قرص على ٤٥٠ ملغ من الباراسيتامول و٣٥ ملغ من سترات الأورفينادرين و٢٠٠ ملغ من الأيبوبروفين.

- المكونات الأخرى هي السيلولوز دقيق التبلور، نشا الذرة، ستيرات المغنيسيوم، السيليكا الغروية اللامائية، كروسكاراميلوز الصوديوم، كحول متعدد الفايثيل – بولي إيثيلين جلايكول، ثاني أكسيد التيتانيوم، التلك، وبوفيدون، حمض الستاريك وسيميثيكون.

كيف يبدو شكل موسيرول ٣ ومحتويات العبوة

إنها أقراص بيضاء، بيضاوية الشكل، مسطحة ومغلفة بالفلم.

يتوفر موسيرول ٣ في علب تحتوي على ٣٠ قرص.

الشركة المصنعة ومالكة حق التسويق

فارمالين ش.م.ل- لبنان

الصندوق البريدي ٩٠٢٠١ جديدة المتن، لبنان

البريد الإلكتروني:pharmaline@maliagroup.com

الموقع الإلكتروني:www.pharmaline.com.lb

رقم تسجيل موسيرول ٣ ملغ في لبنان: ١٣/١٨٧١٨١

إن هذا الدواء:

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الإستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.
- الطبيب والصيدلي هما الخبيران في الدواء وفي نفعه وضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.
- إحتفظ بجميع الأدوية بعيدًا عن متناول الأطفال.

تمت مراجعة هذه النشرة في نيسان / أبريل ٢٠٢٢ .

مجلس وزراء الصحة العرب

واتحاد الصيادلة العرب