

# ماكوايك®

**10 ملغم/مل، محلول للريّ الوريدي**  
**باراسيتامول 1 غرام – عبوة تحتوي على 100 مل**

**الرجاء قراءة هذه النشرة كاملة قبل تناول هذا الدواء.**

- احتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج إلى قراءتها مجدداً.

- إذا كانت لديك أسئلة أخرى إسأل الطبيب أو الصيدلي.

- لقد وصف هذا الدواء لك شخصياً لا تعطه أبداً إلى شخص آخر حتى إذا كانت عوارضه

مماثلة لعوارضك لأنه قد يؤديه.

- في حال تفاقم أحد التأثيرات الجانبية أو في حال لاحظت تأثيرات جانبية غير مذكورة في هذه

النشرة أعلم الطبيب أو الصيدلي.

في هذه النشرة:

١- ما هو ماكوايك ١٠ ملغم/مل، محلول للريّ الوريدي وما هي دواعي استعماله

٢- قبل أن تستعمل ماكوايك ١٠ ملغم/مل، محلول للريّ الوريدي

٣- كيف تستعمل ماكوايك ١٠ ملغم/مل، محلول للريّ الوريدي

٤- التأثيرات الجانبية المحتملة

٥- كيفية حفظ ماكوايك ١٠ ملغم/مل، محلول للريّ الوريدي

٦- معلومات إضافية

١- ما هو ماكوايك ١٠ ملغم/مل، محلول للريّ الوريدي وما هي دواعي استعماله

يعد هذا الدواء مسكناً للألم (يخفف الألم) وخافضاً للحرارة (يخفض الحمى).

يقتصر استعماله على البالغين والمراهقين والأطفال الذين تزيد أوزانهم على 33 كلغم.

يوصى باستعماله للعلاج القصير الأمد للألم المتوسط الحدة، لا سيما بعد العمليات الجراحية، وللعلاج

القصير الأمد للحمى.

٢- قبل أن تستعمل ماكوايك ١٠ ملغم/مل، محلول للريّ الوريدي

لا تستعمل ماكوايك ١٠ ملغم/مل، محلول للريّ الوريدي

- إذا كانت لديك حساسية تجاه باراسيتامول أو أي من المكونات الأخرى لمستحضر ماكوايك،

- إذا كانت لديك حساسية تجاه بروباميتامول (مسكن آخر يستعمل بالريّ الوريدي وهو سلف

للباراسيتامول)،

- إذا كنت تعاني من مرض كبدي شديد.

إلزم الحذر الشديد عند استعمال ماكوايك ١٠ ملغم/مل، محلول للريّ الوريدي

قم باستعمال مسكناً للألم (يخفف الألم) وخافضاً للحرارة (يخفض الحمى).

- إذا كنت تعاني من مرض في الكبد أو الكلى، أو في حالة الإكثار من تناول الكحول،

- إذا كنت تتناول أدوية أخرى تحتوي على باراسيتامول،

- في حالة وجود مشاكل بالتغذية (سوء تغذية) أو جفاف.

قم بإبلاغ طبيبك قبل البدء بالعلاج إذا كانت لديك أي من الحالات المذكورة أعلاه.

استعمال أو تناول الأدوية الأخرى

يحتوي هذا الدواء على باراسيتامول ويجب أن يأخذ ذلك في الاعتبار إذا تم تناول أدوية أخرى تحتوي

على باراسيتامول أو بروباميتامول، حتى لا يتم تجاوز مقدار الجرعة اليومية الموصى بها (انظر البند

التالي). يرجى أن تخبر طبيبك إذا كنت تتناول أدوية أخرى تحتوي على باراسيتامول أو

بروباميتامول.

يجب تقليل مقدار الجرعة عند تزامن تناول المستحضر مع بروباميتامول.

يرجى أن تخبر طبيبك أو الصيدلي الذي تتعامل معه إذا كنت تتناول أي من الأدوية المضادة للتخثر

التي يتم تناولها عن طريق الفم. قد يتطلب الأمر إجراء العديد من الفحوصات لمعرفة تأثير الأدوية

المضادة للتخثر.

يرجى أن تخبر طبيبك أو الصيدلي الذي تتعامل معه إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً أي دواء آخر

حتى إذا كان من الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية.

**الحمل والرضاعة**

**الحمل:** أخبري طبيبك إذا كنت حاملاً. يمكن استعمال ماكوايك أثناء الحمل، ولكن يفضل أن يحدد

الطبيب فيما إذا كان من المستحسن وصف العلاج.

إستشير طبيبك أو الصيدلي الذي تتعاملين معه قبل تناول أي دواء.

**الرضاعة:** يمكن استعمال ماكوايك أثناء فترة الرضاعة.

إستشير طبيبك أو الصيدلي الذي تتعاملين معه قبل تناول أي دواء.

معلومات هامة حول بعض مكونات ماكوايك ١٠ ملغم/مل، محلول للريّ الوريدي

يحتوي هذا المستحضر الدوائي على أقل من ١ ملمول (٢٣ ملغم) من الصوديوم في ١٠٠ مل من

ماكوايك، فهو بالتالي يعتبر "خال من الصوديوم".

٣- كيف تستعمل ماكوايك ١٠ ملغم/مل، محلول للريّ الوريدي

يستعمل عن طريق الريّ الوريدي.

يقتصر استعماله على البالغين، والمراهقين، والأطفال الذين تزيد أوزانهم عن ٣٣ كلغم.

يجب مراقبة المريض بحذر قبل انتهاء الريّ الوريدي للمحلول.

**الجرعة**

**المراهقون والبالغون الذين تزيد أوزانهم عن ٥٠ كلغم:**

١ غرام باراسيتامول في كل مرة إعطاء، أي عبوة واحدة تحتوي على ١٠٠ مليلتر، حتى أربع مرات

في اليوم.

يجب السماح بمرور ٤ ساعات على الأقل بين مرات الإعطاء.

يجب ألا تتجاوز الجرعة القصوى اليومية ما مقداره ٤ غرامات من باراسيتامول، مع الأخذ في

الاعتبار جميع الأدوية التي تحتوي على باراسيتامول أو بروباميتامول.

الأطفال الذين تزيد أوزانهم عن ٣٣ كلغم (حوالي ١١ سنة)، والمراهقون، والبالغون الذين تقل أوزانهم

عن ٥٠ كلغم:

١٥ ملغم/كلغم باراسيتامول في كل مرة إعطاء، أي ١,٥ مليلتر من المحلول لكل كلغم من وزن الجسم،

حتى أربع مرات في اليوم.

يجب السماح بمرور ٤ ساعات على الأقل بين مرات الإعطاء.

يجب ألا تتجاوز الجرعة القصوى اليومية ما مقداره ٦٠ ملغم باراسيتامول لكل كلغم من وزن الجسم

وما مقداره ٣ غرام من الباراسيتامول في اليوم. مع الأخذ في الاعتبار جميع الأدوية التي تحتوي

على باراسيتامول أو بروباميتامول.

**لا تتجاوز المقدار الموصى به من الجرعة**

**طريقة الإعطاء**

يتم إعطاء محلول باراسيتامول بالريّ الوريدي على مدى ١٥ دقيقة.

يجب استعمال إبرة بقطر ٠,٨ ملم لثقب السداة عمودياً في المكان المحدد لذلك.

عند الأطفال، يبلغ حجم المحلول الذي يتم ريه ١,٥ مليلتر/كلغم في كل مرة إعطاء.

يمكن تخفيف المحلول إلى ما مقداره ١ إلى ١٠ في محلول كلوريد الصوديوم ٠,٩٪ أو ٥٪ غلوكونز.

يجب فحص المحاليل المخففة بالعين المجردة، ويجب عدم استخدامها إذا لاحظت وجود شوائب أو

ترسبات.

إذا كان لديك الإنطباع بأن تأثير ماكوايك ١٠ ملغم/مل، محلول للريّ الوريدي أقوى أو أضعف من

اللازم، إتصل بطبيبك أو الصيدلي الذي تتعامل معه.

إذا استعملت على سبيل الخطأ مقداراً أكبر من اللازم من ماكوايك ١٠ ملغم/مل، محلول للريّ

الوريدي، إتصل فوراً بطبيبك أو الصيدلي الذي تتعامل معه. في حالات فرط الجرعة، تظهر الأعراض

عموماً خلال الأربع وعشرين ساعة الأولى وتشمل: الشعور بغثيان، وقيء، وفقدان الشهية، وشحوب،

وآلم في البطن، وخطر حدوث ضرر في الكبد.

إذا كانت لديك أية استفسارات تخص استعمال هذا المستحضر إتصل بطبيبك أو الصيدلي الذي تتعامل

معه.

٤- التأثيرات الجانبية المحتملة

شأنه شأن جميع الأدوية، قد يؤدي ماكوايك ١٠ ملغم/مل، محلول للريّ الوريدي إلى حدوث تأثيرات

جانبية، ولكن قد لا تحدث لكل شخص:

- في حالات نادرة (أكثر من ١ لكل ١٠٠٠٠ شخص وأقل من ١ لكل ١٠٠٠ شخص)، قد يحدث ما

يلي: تورع، إنخفاض ضغط الدم، أو تغيرات في نتائج التحاليل المخبرية: إكتشاف ارتفاع مستويات

الإنزيمات الكبدية أثناء فحص الدم. إذا حدث ذلك أبلغ طبيبك حيث أنه قد يلزم إجراء إختبارات

دورية للدم فيما بعد.

- في حالات نادرة جداً (أقل من ١ لكل ١٠٠٠٠ شخص، من ضمنها بعض التقارير المتفرقة القليلة)

قد يحدث طفح جلدي شديد أو تفاعلات الحساسية. أوقف العلاج فوراً وأبلغ طبيبك.

- في حالات متفرقة، لوحظت تغيرات في نتائج التحاليل المخبرية وقد يتطلب عمل إختبارات دورية

للدم: إنخفاض غير طبيعي لبعض أنواع خلايا الدم (صفيحات الدم، كريات الدم البيضاء) مما قد

يؤدي إلى نزيف من الأنف أو اللثة. إذا حدث ذلك أبلغ طبيبك.

سجل حدوث إحمرار في الجلد، وتوهج، وحكة، وتسارع غير طبيعي في ضربات القلب.

- سجل حدوث آلم وشعور بحرقة في موضع الحقن.

إذا اشتدت حالة الأعراض المذكورة أعلاه سواءً أو إذا لاحظت أي تأثيرات جانبية غير مذكورة في

هذه النشرة، يرجى إخبار طبيبك أو الصيدلي الذي تتعامل معه.

٥- كيفية حفظ ماكوايك ١٠ ملغم/مل، محلول للريّ الوريدي

يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

لا يستخدم ماكوايك ١٠ ملغم/مل، محلول للريّ الوريدي بعد إنتهاء تاريخ الصلاحية المحدد على

العلبة. يشير تاريخ إنتهاء الصلاحية إلى آخر يوم في الشهر.

يحفظ في درجة حرارة لا تتعدى ٢٥°م.

تجنب وضعه في التلاجة أو تجميده.

قبل الإستعمال، إفحص المستحضر بالعين المجردة. يجب عدم استعمال ماكوايك إذا لاحظت وجود شوائب أو حدوث تغيير في اللون. للإستخدام لمرة واحدة فقط. يجب إستعمال المستحضر مباشرة بعد فتح العبوة. يجب التخلص من أي مقدار غير مستخدم من المحلول.

## ٦- معلومات إضافية

ما هي محتويات ماكوايك ١٠ ملغم/مل، محلول للريّ الوريدي

المادة الفعالة هي باراسيتامول. يحتوي كل ١ مليلتر على ١٠ ملغم من باراسيتامول. تحتوي كل عبوة سعة ١٠٠ مليلتر على ١ غرام باراسيتامول.

المواد الأخرى: مانيتول، هيدروكلوريد السيستين أحادي الهيدرات، فوسفات ثنائي الصوديوم ثنائي الهيدرات، هيدروكسيد الصوديوم، حمض الهيدروكلوريك، ماء للحقن.

**ماهو الشكل الصيدلاني المتوفر من ماكوايك ١٠ ملغم/مل، محلول للريّ الوريدي ووصفه وحجم العبوة**

عبوة تحتوي على ١٠٠ مليلتر.

ماكوايك ١٠ ملغم/مل، محلول للريّ الوريدي عبارة عن محلول صافٍ أو بلون أصفر فاتح جداً.

تتوفر عبوات ماكوايك ١٠ ملغم/مل، محلول للريّ الوريدي في عبب تحتوي كل منها على عبوة واحدة أو ١٢ عبوة.

**إنتاج:**

**لصالح: أروان للصناعات الدوائية لبنان ش.م.ل.  
جدرا، لبنان**

### إن هذا الدواء

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- إتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الإستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.
- الطبيب والصيدلي هما الخبيران بالدواء وينفعه وضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.
- لا تترك الأدوية في متناول الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب، اتحاد الصيدلة العرب