

## Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage avant de prendre ou d'utiliser le médicament. Ce médicament vous a été remis sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

# Condrosulf®

IBSA

## Qu'est-ce que Condrosulf et quand est-il utilisé ?

Condrosulf est utilisé pour le traitement des maladies des articulations. Il contient comme principe actif le sulfate de chondroïtine, l'un des constituants principaux du cartilage.

Après un traitement avec Condrosulf, on a pu démontrer non seulement une régression des symptômes subjectifs, mais aussi une amélioration fonctionnelle de l'arthrose.

Condrosulf est utilisé sur prescription du médecin.

## Quand Condrosulf ne doit-il pas être utilisé ?

Condrosulf ne doit pas être utilisé lors d'hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients contenus dans le médicament (voir « Que contient Condrosulf ? »).

## Quelles sont les précautions à observer lors de la prise de Condrosulf ?

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si:

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique ou
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication!).

## Condrosulf peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement ?

Durant la grossesse ou l'allaitement, il faudrait renoncer à prendre des médicaments. Condrosulf ne doit être pris que si le médicament est expressément prescrit par votre médecin.

## Comment utiliser Condrosulf ?

Sauf prescription contraire du médecin, la posologie conseillée est la suivante:

Traitements d'attaque (pendant 2 semaines): 2x/jour 2 sachets ou 2 comprimés ou 2 capsules de 400 mg, ou bien 2x/jour 1 sachet ou 1 comprimé de 800 mg.

Traitements d'entretien (pendant 2-3 mois): 1x/jour 2 sachets ou 2 comprimés ou 2 capsules de 400 mg, ou bien 1x/jour 1 sachet ou 1 comprimé de 800 mg.

Les capsules et les comprimés peuvent être pris avant, pendant ou après les repas; les prendre sans les croquer et avec suffisamment de liquide.

Il est recommandé aux patients ayant l'estomac sensible de prendre le médicament après les repas. Pour l'administration des sachets l'on recommande de verser préalablement le contenu des sachets dans un verre, et de le dissoudre dans un peu d'eau.

L'emploi et la sécurité de Condrosulf chez les enfants et les adolescents n'ont pas été vérifiés jusqu'à maintenant.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

## Quels effets secondaires Condrosulf peut-il provoquer ?

La prise de Condrosulf peut provoquer les effets secondaires suivants:

Occasionnellement, des troubles gastro-intestinaux (p. ex. constipation) ou de légères nausées peuvent apparaître, ne nécessitant pas en général l'interruption du traitement. De rares cas

d'oedème et/ou de rétention d'eau ont été observés chez des patients souffrant d'insuffisance rénale et/ou d'insuffisance cardiaque.  
Si une allergie survient sous forme d'éruption cutanée accompagnée de démangeaisons, vous devez interrompre le traitement et consulter votre médecin.  
Si vous remarquez d'autres effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

### **A quoi faut-il encore faire attention ?**

Le médicament doit être conservé à température ambiante (15-25 °C) et hors de portée des enfants. Il ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention « EXP » sur l'emballage. Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

### **Que contient Condrosulf ?**

**Condrosulf 400**

Sachets à 1,8 g:

Principe actif: chondroitini sulfas naticus 400 mg.

Excipients: saccharinum, aromatica, antiox. E 320 (butylhydroxyanisolum), excipients ad granulatum pro charta.

Comprimés:

Principe actif: chondroitini sulfas naticus 400 mg.

Excipients: excipients pro compresso.

Capsules:

Principe actif: chondroitini sulfas naticus 400 mg.

Excipients: color. E 104 (quinoline jaune), E 132 (carmin indigo), excipients pro capsula.

**Condrosulf 800**

Sachets à 3,6 g:

Principe actif: chondroitini sulfas naticus 800 mg.

Excipients: saccharinum, aromatica, antiox. E 320 (butylhydroxyanisolum), excipients ad granulatum pro charta.

Comprimés:

Principe actif: chondroitini sulfas naticus 800 mg.

Excipients: excipients pro compresso.

Le contenu énergétique de 1 sachet de Condrosulf 400 correspond à 4,3 kcal (18,4 kJ), tandis que pour 1 sachet de Condrosulf 800 il correspond à 8,7 kcal (36,4 kJ).

Le principe actif de Condrosulf est obtenu à partir de cartilage de poisson.

### **Numéro d'autorisation**

42'277, 48'557, 51'610 (Swissmedic)

### **Où obtenez-vous Condrosulf ? Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?**

En pharmacie, sur ordonnance médicale. Les emballages suivants sont disponibles:

Condrosulf 400 mg: emballages à 60 ou 180 sachets, comprimés ou capsules.

Condrosulf 800 mg: emballages à 30 ou 90 sachets ou comprimés.

### **Titulaire de l'autorisation**

IBSA Institut Biochimique SA, CH-6903 Lugano.

Cette notice d'emballage a été contrôlée par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic) en mars 2007.