NOVARTIS

سيجنيفور®

التركيب
المادة الفعالة: سيجنيفور (في هيئة شنقي تسيرات الفوسفاتيدات)
المستحضرات/إدخار عبر الصفائح/ مايلوبلاتي، حمض الجلوتاريك، هيدروكسيد الصوديوم، حمض الهيدروكلوريك

الشكل الصيدلاني وكمية المادة الفعالة لكل وحدة
محلول لحقن في أمبولات.
محلول يحتوي على ٣٠ ملليغرام/ملليلتر.
صندوق كل أمبول ١ ملليلتر يحتوي على ٣٠ ملليغرام سيجنيفور.
صندوق كل أمبول ٢ ملليلتر يحتوي على ٦٠ ملليغرام سيجنيفور.
صندوق كل أمبول ٥ ملليلتر يحتوي على ١٥٠ ملليغرام سيجنيفور.

مواصفات الاستعمال/ الاستخدامات المحتملة
مادة أحرى الأمبول يحتوي من حمض الجلوتاريك مع حمض الهيدروكلوريك على ٣٠ ملليغرام سيجنيفور مع التطبيق الحمول بها مكانها

الفئة العلاجية
مضاد للخلايا الكيميائية (شنقي تسيرات ٢)

مؤشرات واحتياطات
الحالة الكلوية المزمنة: يجب تقليل الجرعة إذا كان معدل الترشيح الكبيبي التقديري (GFR) أقل من ٣٠ ملليلتر/دقيقة/١.٧٣ متر مربع. يجب إيقاف العلاج بسيجنيفور إذا كان معدل الترشيح الكبيبي التقديري (GFR) أقل من ١٥ ملليلتر/دقيقة/١.٧٣ متر مربع.
الحالة الكبدية: يجب تقليل الجرعة إذا كان مستوى البيلروبين في الدم أعلى من ٣ ملليغرام/دلتر.
الأطفال: لا يوجد بيانات كافية لتحديد الجرعة المناسبة للأطفال.
الحمل والرضاعة: يجب تجنب استخدام سيجنيفور أثناء الحمل. يجب تجنب الرضاعة الطبيعية أثناء العلاج بسيجنيفور.
الخصوبة: يجب تجنب الحمل أثناء العلاج بسيجنيفور.
التفاعلات الدوائية: يجب تجنب استخدام سيجنيفور مع مضادات الفطريات الأزولية (مثل فلوكونازول، إيتراكونازول، فوريكونازول، بوسكونازول، إيزافوكونازول، ميكونازول) لأنها تعيق عملية تمثيل سيجنيفور من أجل تكوين المستقلب النشط. يجب تجنب استخدام سيجنيفور مع مضادات الفيروسات الرتروفيرية مثبطات البروتيز (مثل ريتونافير، إنديناڤير، نيلفينافير، إتيرافيرين، أتازانافير، فوسامبرينافير، دارونافير، لوبينافير، تيبرانافير، فوسامبرينافير) لأنها تعيق عملية تمثيل سيجنيفور من أجل تكوين المستقلب النشط. يجب تجنب استخدام سيجنيفور مع مضادات الفيروسات الرتروفيرية مثبطات النسخ العكسي النوكليوسيدية (مثل زيدوفودين، لاميفودين، ستافودين، أبكاڤير، زالسيتابين، ديدانوسين، زيدوفودين/لاميفودين، زيدوفودين/لاميفودين/أبكاڤير، لاميفودين/ستافودين، أبكاڤير/لاميفودين، ديدانوسين/ستافودين) لأنها تعيق عملية تمثيل سيجنيفور من أجل تكوين المستقلب النشط. يجب تجنب استخدام سيجنيفور مع مضادات الفيروسات الرتروفيرية مثبطات النسخ العكسي غير النوكليوسيدية (مثل نيفيرابين، إفافيرينز، إتراڤيرين، رلپيفيرين، دلافيردين) لأنها تعيق عملية تمثيل سيجنيفور من أجل تكوين المستقلب النشط. يجب تجنب استخدام سيجنيفور مع مضادات الفيروسات الرتروفيرية مثبطات الانضمام (مثل ماراڤيروك، إنفوفيرتيد، إنسيفيرتيد، ليدبيسيفيرتيد، ميفيبيسيفيرتيد) لأنها تعيق عملية تمثيل سيجنيفور من أجل تكوين المستقلب النشط. يجب تجنب استخدام سيجنيفور مع مضادات الفيروسات الرتروفيرية مثبطات الاندماج (مثل رالتيجرافير، إلفيتيجرافير، دولوتيجرافير، بيتيجرافير) لأنها تعيق عملية تمثيل سيجنيفور من أجل تكوين المستقلب النشط. يجب تجنب استخدام سيجنيفور مع مضادات الفيروسات الرتروفيرية مثبطات الانضمام (مثل ماراڤيروك، إنفوفيرتيد، إنسيفيرتيد، ليدبيسيفيرتيد، ميفيبيسيفيرتيد) لأنها تعيق عملية تمثيل سيجنيفور من أجل تكوين المستقلب النشط. يجب تجنب استخدام سيجنيفور مع مضادات الفيروسات الرتروفيرية مثبطات الاندماج (مثل رالتيجرافير، إلفيتيجرافير، دولوتيجرافير، بيتيجرافير) لأنها تعيق عملية تمثيل سيجنيفور من أجل تكوين المستقلب النشط. يجب تجنب استخدام سيجنيفور مع مضادات الفيروسات الرتروفيرية مثبطات الاندماج