

عند الحاجة: ويمكن زيادة الجرعة إلى ٣ مرات يوميا مع الأخذ في الاعتبار أن الحد الأقصى للجرعة هي ٢٠ ملل (يجب تخفيفها) ٣ مرات يوميا .
قم بغسل أسنانك قبل كل استعمال وأشطف الفم بالماء بعناية قبل استخدام إيلودريل برو غسول الفم.
لبعثة الجرعة الواحدة ، قم بخلط محتويات الزجاجاة في نصف كوب من الماء واستخدمه كغسول للفم.

مدة العلاج:

العلاج قد يستمر لمدة أسبوعين للتهاب اللثة و الأسنجة المحيطة بالأسنان. لا يجوز اطالة مدة العلاج أكثر من أسبوعين إلا بعد استشارة الطبيب المعالج.

أذا قمت باستعمال إيلودريل برو أكثر من الموصى به:

إن استعمال جرعة زائدة غير مستحب في ظل الظروف الطبيعية من استعمال هذا الغسول . حيث أنه يمر إلى الدورة الدموية العامة و قد تظهر علامات السمية العصبية ما يتطلب العلاج في محيط متخصص.

في حالة السهو عن استعمال إيلودريل برو غسول الفم:

لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعات الفردية المنسية

٤. ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟

مثل أي دواء آخر إيلودريل برو غسول الفم قد يسبب بعض الآثار الجانبية غير المرغوب فيها وذلك لاعتنى أن هذا يحدث للجميع.
خطر حدوث حساسية لاحدى مكونات المحلول.
لا تتردد في استشارة أخصائي الأسنان والإبلاغ عن أي تأثير غير مرغوب فيه و غير مستحب ليس مدرج في هذه النشرة.

٥. كيفية تخزين إيلودريل برو غسول الفم؟

يحفظ بعيدا عن متناول وبصر الأطفال.
لا يستعمل بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على العلبة.
يحفظ في مكان جاف و نظيف.
يجب أن لا تلقى المستحضرات الطبية في مياه الصرف الصحي أو مع النفايات المنزلية. يرجى سؤال الصيدلي عما يجب القيام به مع الأدوية غير المستعملة. وسوف تسمح هذه الإجراءات لحماية البيئة.

٦. مزيد من المعلومات.

ماذا يحتوي إيلودريل برو؟

المواد الفعالة هي:

محلول ديجلوكونات الكلوروكسيدين ٠,٥٠٠ ملل.
كلوروبنانول هميهدرات ٠,٥٠٠ جم.
في كل ١٠٠ ملل

محتوى الكحول: ٤٢,٨٪ (جم/جم)

المكونات الأخرى هي: جليسرول ، الأيثانول ٩٦٪ ، دوكوزات الصوديوم ، ليفومنتول ، محلول كحولى برزت أساس النعناع، مياة نقية ، أحمر كوشينيل E 124) A (.

ما هو إيلودريل برو. غسول الفم وما هي عبوته الخارجية؟

هذا المستحضر متوفر كمحلول غسول للفم في زجاجة سعة ١٥ ملل، ٩٠ ملل، ٢٠٠ مللى أو ٥٠٠ ملل.

الموزع:

بيير فابر للأدوية

٤٥ ساحة ابل جانس - ٩٢١٠٠ بولونيا - فرنسا.

المصنع:

بيير فابر للأدوية

شارع ليسبة

المنطقة الصناعية كبرى - ٤٥٥٠٠ جيان

وقد تمت الموافقة على هذه النشرة في أبريل ٢٠١٤
معلومات مفصلة عن هذا المستحضر متاحة على الموقع الإلكتروني
ANSM (السلطات الفرنسية).

يجب قراءة هذه النشرة بعناية قبل البدء في استعمال هذا المستحضر حيث أنها تحتوي على معلومات هامة بخصوص علاجك.

إذا كان لديك المزيد من الاستفسارات أو أي شكوى يرجى استشارة الصيدلي أو الطبيب المعالج.

يجب إبقاء هذه النشرة لأنه قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى. إذا كنت بحاجة الى مزيد من المعلومات أو النصائح. يرجى استشارة الصيدلي.

إذا كانت الأعراض تزداد سوءاً أو لم تحسن اتصل بالطبيب.

إذا لاحظت بعض الأعراض الجانبية غير المذكورة في هذه النشرة أو إذا كنت تشعر بواحدة من الآثار الجانبية المذكورة في هذه النشرة التي تعتبر جادة يرجى إبلاغ الطبيب المعالج أو الصيدلي.

إيلودريل برو

غسول للفم

في هذه النشرة:

- ١- ما هو إيلودريل برو غسول الفم و ما هو استعماله؟
- ٢- ما هي احتياجاتك لمعرفة إيلودريل برو غسول الفم قبل استعماله ؟
- ٣- كيفية استعمال إيلودريل برو غسول الفم؟
- ٤- ما هي الأعراض الجانبية المحتملة؟
- ٥- كيفية تخزين إيلودريل برو غسول الفم؟
- ٦- معلومات أخرى.

١. ما هو إيلودريل برو غسول الفم و ما هو استعماله ؟

يوصى به كعلاج مساعد لاضطرابات جوف الفم وبعد العمليات الجراحية للأسنان وأمراض الفم.

٢. ما هي احتياجاتك لمعرفة إيلودريل برو غسول الفم قبل استعماله ؟

لا يستعمل إيلودريل برو غسول الفم في حالة وجود حساسية للكلوروكسيدين و كلوروبنانول أو غيرها من مكونات المحلول.
للاحتياطات الواجب مراعاتها عند استخدام إيلودريل برو:
يجب عدم ملامسة العين أو الأنف. لا يوضع في القناة السمعية.
إذا استمرت الأعراض لأكثر من ٥ أيام أو في حال وجود حمى مصاحبة يجب أن يتم إعادة تقييم للعلاج.
استعماله لفترة طويلة قد تؤدي إلى تلوين الأسنان و حشوات الأسنان.
استعمال أو تناول أدوية أخرى:

يجب تجنب الاستخدام المتزامن أو المتتابع لمطهرات الفم الأخرى لأحتمال التداخل (التضاد أو عدم الفاعلية... الخ).

إذا كنت تقوم باستعماله أو تناولت مؤخرا دواء آخر من دون وصفة طبية يرجى استشارة طبيبك أو الصيدلي.

الحمل والرضاعة الطبيعية:

أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية لا تتردد أن تطلب من طبيبك أو الصيدلي النصيحة قبل استعمال أي دواء.

السواوغ ذو تأثير معلوم.

الكحول
(E 124) أحمر كوشينيل

٣. كيفية استعمال إيلودريل برو غسول الفم؟

للبالغين و الاطفال فوق سن ١ سنوات.

طرق الاستعمال

غسول الفم للاستعمال الموضعي
لا يجب بلعه.

الجرعة المعتادة: من ١٠ الى ١٥ ملل من المحلول مرتين يوميا (يخفف بالماء الدافئ حتى الخط العلوي للمعايير للجرعة و تستعمل كل الكمية الموجودة في هذا الغطاء).



Pierre Fabre