

عند الحاجة: ويمكن زيادة الجرعة إلى ٣ مرات يومياً مع الأخذ في الاعتبار أن الدلائل الفنية للجرعة هي ١٠ مل (يجب تحفيتها) ٢ مرات يومياً. قم بغسل أسنانك قبل كل استعمال وأشطف الفم بالماء بعناية قبل استخدام إيلودريل برو غسول الفم.

لعيادة الجرعة الواحدة، قم بخلط محتويات الزجاجة في نصف كوب من الماء واستخدمه كغسول للضم.

مدة العلاج: العلاج قد يستمر لمدة أسبوعين لالتهاب اللثة والأنسجة المحيطة بالأسنان لا يجوز اطالة مدة العلاج أكثر من أسبوعين إلا بعد استشارة الطبيب المعالج.

آذا قمت باستخدام إيلودريل برو أكثر من الموصى به:

ان استعمال جرعة إائنة غير مسمحة في ظل الظروف الطبيعية من استعمال هذا الغسول، حيث أنه يزيد الدورة الدموية العامة وقد ظهرت علامات السمية العصبية مما يتطلب العلاج في محظوظ متخصص.

في حالة السهو عن استخدام إيلودريل برو غسول الفم:

لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعات الفردية المنسية.

٤. ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟

مثل أي دواء آخر إيلودريل برو غسول الفم قد يسبب بعض الآثار الجانبية غير المرغوب فيها وذلك لا يعني أن هذا يحدث للجميع. خطير حدوث حساسية لأحد مكونات المحلول.

لا تتردد في استشارة أخصائي الأسنان والإبلاغ عن أي تأثير غير مرغوب فيه وغير مستحب ليس مدمر في هذه النشرة.

٥. كيفية تخزين إيلودريل برو غسول الفم؟

يحفظ بعيداً عن متناول وبصر الأطفال.

لا يستعمل بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على العلبة.

يحفظ في مكان جاف ونظيف.

يجب أن لا تلتفي المستحضرات الطبية في مياه الصرف الصحي أو مع النفايات المنزلية. يرجى سؤال الصيدلي عما يجب القيام به مع الأدوية غير المستعملة. وسوف تسمح هذه الإجراءات لحماية البيئة.

٦. مزيد من المعلومات.

ماذا يحتوى إيلودريل برو؟

المادة الفعالة هي:

محلول ديجلوكونات الكلورهكسيدين ٥٠٠ مل.

محلول ديجلوكونات هميهدرات ٥٠٠ جم

في كل ١٠٠ ملل

محتوى الكحول: ٤٢,٨٪ (جم/جم)

المكونات الأخرى هي: جليسول، الابتأنول، ٩١٪، دوكوزات الصوديوم، ليغومونتون، محلول گلولي بزيت أساس الت鹼اع مياء نقية، أحمر كوشينيل (E 124).

ما هو إيلودريل برو. غسول الفم وما هي عبوته الخارجية؟

هذا المستحضر متوفّر ك محلول غسول للضم في زجاجة سعة ١٥ مل. ٩٠ ملل. ١٠٠ مللى أو ٥٠٠ ملل.

الموزع:

بير فابر للأدوية ٩٦١٠٠ - بولونيا - فرنسا

٤٤ ساحة ابن جاسن -

المصنوع:

بير فابر للأدوية

شارع ليبسيه

المنطقة الصناعية كبيرة - ٤٥٠٠ چيان

وقد تم الموافقة على هذه النشرة في أبريل ٢٠١٤
معلومات مفصلة عن هذا المستحضر متاحة على الموقع الإلكتروني (ANSM)
(السلطات الفرنسية).

يجب قراءة هذه النشرة بعناية قبل البدء في استعمال هذا المستحضر حيث أنها تحتوي على معلومات هامة بخصوص علاجك.

إذا كان لديك المزيد من الاستفسارات أو أي شكاوى يرجى استشارة الصيدلي أو الطبيب المعالج.

يجب إبقاء هذه النشرة لأنك قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.

إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات أو النصائح، يرجى استشارة الصيدلي.

إذا كانت الأعراض تزداد سوءاً أو لم تتحسن اتصل بالطبيب.

إذا لاحظت بعض الأعراض الجانبية غير المذكورة في هذه النشرة أو إذا كنت تشعر بواحدة من الآثار الجانبية المذكورة في هذه النشرة التي تعتبر جادة يرجى إبلاغ الطبيب العالج أو الصيدلي.

إيلودريل برو

غسول للضم

في هذه النشرة:

١- ما هو إيلودريل برو غسول الفم و ما هو استعماله؟

٢- ما هي احتياجاتك لغسل الفم و ما هو استعماله؟

٣- كيفية استخدام إيلودريل برو غسول الفم؟

٤- ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟

٥- كيفية تخزين إيلودريل برو غسول الفم؟

٦- معلومات أخرى.

١. ما هو إيلودريل برو غسول الفم و ما هو استعماله؟

يوصى به كعلاج مساعد لاضطرابات خلويات الفم وبعد العمليات المراجحة للأسنان وأمراض الفم.

٢. ما هي احتياجاتك لمعرفة إيلودريل برو غسول الفم قبل استعماله؟

لا يستعمل إيلودريل برو غسول الفم في حالة وجود حساسية للكلورهيكسيدين و كلوروبروتانول أو غيرها من مكونات المحلول.

الأحتياطيات الواجب مراعاتها عند استخدام إيلودريل برو:

يجب عدم ملامسة العين أو الأنف، لا يوضع في الفم السمعي.

إذا استترطت الأعراض لأكثر من ٥ أيام أو في حال وجود حمى مصاحبة

يجب أن يتم إعادة تقييم للعلاج.

استعماله فترة طويلة قد يؤدي إلى تلوين الأسنان و حشوات الأسنان.

استعماله أو تناول أدوية أخرى:

يجب خفض الاستخدام المتراكم أو المتتابع لطهارات الفم الأخرى لاحتمال

التدخل (التضاد أو عدم التفاعلية... الخ).

إذا كنت تقم باستعماله أو تناولت مؤخراً دواء آخر من دون وصفة طبية

يرجى استشارة طبيبك أو الصيدلي.

الحمل والرضاعة الطبيعية:

أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية لا تردد أن تطلب من طبيبك أو

السواء ذو تأثير معلوم.

الكحول.

(E 124) أحمر كوشينيل

٣. كيفية استخدام إيلودريل برو غسول الفم؟

للبالغين والاطفال فوق سن ١ سنوات.

طريق الاستعمال

غسول الفم للأستعمال الموضعي.

لا يجب بلعه.

الجرعة المقترنة: من ١٠ إلى ١٥ مل من المحلول للقطط الماعير للحجامة و يستعمل كل الكميات الموجودة في هذا الغطاء.



Pierre Fabre