

Information destinée aux patients

Qu'est ce que lalugen Plus et quand est-il utilisé ?

lalugen Plus contient comme principes actifs le hyaluronate de sodium, substance naturelle qui accélère la cicatrisation, et la sulfadiazine d'argent qui a une action antibactérienne. En automédication lalugen Plus est destiné au traitement des petites brûlures et des petites plaies infectées. Sur ordonnance médicale, lalugen Plus pourra être utilisé dans le traitement d'ulcères, brûlures et plaies infectées par des germes et champignons. lalugen Plus Crème peut être également utilisé dans le traitement des fissures anales et des lésions après intervention chirurgicale pour la résection des hémorroïdes (hémorroïdectomie).

De quoi faut-il tenir compte en dehors de traitement ?

Toute brûlure doit immédiatement être refroidie sous l'eau froide ; les cloques guérissent mieux, si elles sont laissées intactes. Les brûlures étendues ou graves, ainsi que les ulcères doivent être traitées sous la surveillance d'un médecin.

Les plaies de grande surface, très souillées ou profondes, telles que les plaies dues à une morsure ou à une blessure par instrument tranchant nécessitent un traitement médical (risque de tétanos). Dans le cas où le périmètre de la blessure ne diminue pas au bout d'un certain temps, ou si la plaie ne se cicatrise pas dans le délai de 10 à 14 jours, veuillez également consulter un médecin. Faites de même si les lèvres de la plaie sont très rouges, si celle-ci enflé subitement, devient très douloureuse, ou encore si la blessure est accompagnée de fièvre (risque d'empoisonnement du sang).

Quand lalugen Plus ne doit-il pas être utilisé ?

Evitez de prendre lalugen Plus dans les cas suivants :

- hypersensibilité connue à l'un ou plusieurs composants de lalugen Plus;
- grossesse;
- prématurés et nourrissons pendant le premier mois de vie.

Quelles sont les mesures de précaution à observer lors de la prise de lalugen Plus ?

Avant l'utilisation de la préparation, la plaie doit être débridée par le médecin de tout tissu nécrosé. Informez le médecin si vous présentez des antécédents allergiques à l'égard des sulfamides ou une insuffisance rénale ou hépatique. Eviter une exposition directe au soleil des parties traitées avec lalugen Plus. Si l'on recourt simultanément aux enzymes protéolytiques locaux, il faut tenir compte du fait que l'ion argent peut inactiver ces substances. Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous souffrez d'une autre maladie, si vous êtes allergique ou si vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication !).

lalugen Plus peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement ?

Durant la grossesse ou l'allaitement, il faudrait renoncer à prendre lalugen Plus.

Comment utiliser lalugen Plus ?

Crème: sauf prescription différente du médecin, appliquer la crème directement sur la lésion; il est recommandé de l'étendre en couche d'au moins 2 à 3 mm d'épaisseur. L'application doit être renouvelée toutes les 24 heures; enlever soigneusement les restes de crème

ou laver avec de l'eau. Lors d'application dans l'anus: appliquer la crème directement sur la lésion à l'aide de la canule jointe à l'emballage. Visser la canule sur l'extrémité du tube et l'introduire dans l'anus. Presser légèrement le tube en retirant doucement la canule. Après utilisation, bien nettoyer la canule sans la retirer du tube et refermer avec son capuchon. Compresses: suivant la surface de la lésion, appliquer une ou plusieurs compresses 1 fois par jour. Recouvrir avec une gaze stérile et le tout par de la ouate que l'on fixera avec un bandage approprié. Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice ou prescrit par votre médecin. Si vous avez l'impression que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien.

Quels effets indésirables Lalugen Plus peut-il avoir ?

Dans le cas de traitement de surfaces étendues du corps avec Lalugen Plus, les effets indésirables classiques des sulfamides administrés par voie systémique (insuffisance rénale, leucopénie, éruptions cutanées) ne sont pas à exclure. Au cas où, pendant un traitement prolongé avec des doses élevées du médicament, la partie traitée devenait bleuâtre, interrompre le traitement et consulter le médecin. Lors de l'apparition d'allergie par éruption cutanée, accompagnée de prurit, il est conseillé d'interrompre le traitement et d'informer le médecin. En cas d'apparition soudaine de fièvre, le médecin doit être consulté. En cas de traitement de longue durée, contrôler le nombre de leucocytes.

De quoi faut-il en outre tenir compte ?

Le médicament doit être conservé à l'abri de la lumière et à température ambiante. Il ne peut être utilisé au-delà de la date imprimée sur l'emballage avec la mention "EXP". Si vous possédez des médicaments dont la date de péremption est échue, il ne faut pas les utiliser, mais les rapporter à la pharmacie qui se chargera de les éliminer.

Veuillez tenir le médicament hors de portée des enfants. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux représentants des professions médicales.

Que contient Lalugen Plus ?

1g de crème contient: hyaluronate de sodium 2 mg, sulfadiazine d'argent 10 mg, laurylsulfate et des excipients.

Compresses: toile avec 4 g de crème. 1 g de crème contient: hyaluronate de sodium 0.5 mg, sulfadiazine d'argent 10 mg et des excipients.

Où obtenez-vous Lalugen Plus ?

Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?

En pharmacie, sur ordonnance médicale:

Crème: tube de 25 g et 60 g.

Compresses: boîte de 10 et 30 compresses.

En pharmacie, sans ordonnance médicale:

Crème: tube de 20 g.

Compresses: boîte de 5 compresses.

Fabricant et titulaire de l'autorisation (Marketing authorisation holder):

IBSA Institut Biochimique SA, CH-6903 Lugano

Cette notice d'emballage a été approuvée par les autorités de contrôle des médicaments (OICM) en décembre 1998.