



يجب قراءتها بدقة

تعليمات الاستخدام

كانس-تينTM

محلول

المادة الفعالة : كلوتريمازول

التركيب:

يحتوي كل مليلتر من المحلول على ٠.٠١ جرام من مادة كلوتريمازول.

محتويات أخرى:

مكروجل ٠.٠٠٢، بروبيلين الحلاكول.

تشتمل دواعي استعمال الكانستين عدوى الجلد بالفطريات المسببة من فطر الجلد، الفعن (مثل انواع الخمير جلدس) و انواع الفطريات الأخرى.

يعالج الكانستين انواع عدوى الجلد الآتية:

- بين أصابع الأيدي و بين أصابع الأقدام،
- الجلد و ثديا الجلد،
- ثديا الإناث (الثوب حثل الخلف)،
- الخشالية المتقرية (ملا سسيا فروور)،
- القرية الفطرية (كوبيناكريم مينوتيسيم)،
- الاضرابات الجلدية الفسحويه بالمعدوى بكائنات مجهرية حساسه للكانستين.

موانع الاستعمال:

الحساسية الزائدة ضد مادة كلوتريمازول.

التفاعلات الجانبية:

لا احتمال المرضي لحلول كانستين يكون عادة جيدا . في حالات نادرة قد تحدث تفاعلات جانبية مثل حرقان، لدغ أو احمرار في الجلد . لا يتسبب حدوث تأثير على أعضاء أخرى من استعمال كانستين المرضي.

ارشادات الجرعة و طريقة الاستعمال: إذا لم يوصف الطبيب خلاف ذلك، وذلك طبقه وثيقة من محلول كانستين في منطقة الجلد ذات العدوى مرتين إلى ثلاثة مرات يوميا ، نظرا لخاصية كانسكي المتأخره يكفي عادة قليل من التمسك لعلاج مساحه بقدر راحة اليد . مدة الاستعمال:

للتأكد أن العلاج سيكون ناجحا، هنس المهم أن يستعمل محلول كانستين بانتظام و لمدة زمنية كافية (التفاصيل آتية).

تتطلب مدة العلاج اعتمادا، بجانب أشياء أخرى، على مدى و مكان العدوى، للوصول إلى شفاء كامل لا يجب أن يقطع العلاج بمحلول كانستين فور انتهاء أعراض الالتهاب الحاد أو اختفاء أعراض عدم الكفاءة بل يجب استمرار العلاج بحيث أن لا تقل طول مدة العلاج عن فترة ٤ أسابيع، يتم شفاء الخشالية المتقرية عادة خلال ١-٢ أسابيع و القرية الفطرية خلال ٢-٤ أسابيع.

في حالة تبينا الإقدام، يجب استمرار العلاج لمدة اسبوعين بعد أن تكون كلا علامات العدوى قد اختفت و نرفع التحسن السريع في الأعراض الموضعية ذلك لتلافي رجوع العدوى مرة أخرى.

ملاحظة:

لا يجب السماح لحلول الكانستين أن يجتلك بالأنشيه المخاطيه أو العيون.

يجب أن نشطف الإقدام جيدا بعد غسلها خاصه عند المناطق بين أصابع الإقدام.

لا يجب استعمال محلول كانستين بعد تقان تاريخ صلاحيته المدون على العبوة.

العبوة:

قارورة بها ٢٠ مليلتر من المحلول.

يحفظ في درجة حرارة أقل من ٢٠ درجة مئوية.

احتفظ بكل الأدوية بعيدا عن متناول أيدي الأطفال.

إن هذا الدواء

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك و استعماله خلاف التعليمات يعرضك للخطر.

- اتبع بدقة وصفة الطبيب و طريقة الاستعمال المنصوص عليها و تعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.

- فاعليتي و الصيدلاني هما الخياران بالدواء و يتفقعه و ضرره.

- لا تقطع مدة العلاج المحدد لك من تلقاء نفسك.

- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفته طبية.

محسن وزلاء الفعالة العرب

والتحاد الصيدلانية العرب.

صنّع بواسطة كي في بي فارما + فيترينار بروكت جيا ام بي انش - ألمانيا لصانع باير كونسيمير كير أج - بازل - سويسرا

Bayer

80711289