

TimoFerol

gélule

COMPOSITION

SULFATE FERREUX DESSECHE 172,73 mg

Quantité correspondante en fer 50,00 mg

ACIDE ASCORBIQUE 30,00 mg

Excipients : carbonate de magnésium léger, talc, silice colloïdale anhydre, et amidon de maïs.

Une gélule contient 50 mg de fer.

FORME PHARMACEUTIQUE

Gélule, boîte de 30.

CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE

ANTIANÉMIQUE - SULFATE FERREUX PAR VOIE ORALE
(B : sang et organes hématopoïétiques)

DANS QUEL CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament contient du fer. Il est préconisé dans le traitement curatif des anémies dues à un manque de fer chez l'adulte et l'enfant de plus de 12 ans, et en traitement préventif de la carence en fer chez la femme enceinte.

ATTENTION! DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants: surcharge en fer, en particulier dans certaines formes d'anémies (thalassémie, anémies réfractaires, anémie par insuffisance médiullaire). EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPÉCIALES

- Ce médicament n'est pas adapté au traitement des anémies liées aux maladies inflammatoires.

- Une consultation médicale est nécessaire avant la mise en route de ce traitement, afin de rechercher la cause de l'anémie.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- La consommation importante de thé inhibe l'absorption du fer.

- Un contrôle de l'efficacité est utile après 3 mois de traitement, consultez votre médecin.

EN CAS DE DOUCE NE PAS HÉSITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'ÉVITER, D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE

PLUSIEURS MÉDICAMENTS IL FAUT SIGNALER

SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN, notamment des médicaments injectables contenant du fer.

GROSSESSE - ALLAITEMENT

Ce médicament, dans les conditions normales d'utilisation, peut être pris pendant la grossesse.

L'utilisation de ce médicament est possible chez la femme qui allaité.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT-POSÉOLOGIE

Traitement curatif: CHEZ L'ADULTE ET L'ENFANT DE PLUS DE 12 ANS

En moyenne: 2 à 4 gélules par jour.

Traitement préventif: CHEZ LA FEMME ENCEINTE : 1 gélule par jour, pendant les deux derniers trimestres de la grossesse (soit à partir du 4ème mois).

Dans tous les cas, respectez l'ordonnance de votre médecin.

CE MÉDICAMENT VOUS A ÊTÉ PERSONNELLEMENT DÉLIVRÉ DANS UNE SITUATION PRÉCISE:

- IL PEUT NE PAS ÊTRE ADAPTÉ A UN AUTRE CAS

- NE PAS LE CONSEILLER A UNE AUTRE PERSONNE.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION :

Voie orale.

FREQUENCE ET MOMENT AUQUEL LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE ADMINISTRE

Afin de limiter les effets indésirables et en raison d'un effet stimulant de la vitamine C, il est conseillé de prendre ce médicament à jeun le matin ou avant le déjeuner, mais l'horaire de la prise et éventuellement la poséologie sont à adapter en fonction de la tolérance digestive.

DUREE DU TRAITEMENT

Elle doit être suffisante pour corriger l'anémie et restaurer les réserves en fer (de l'ordre de 3 à 6 mois).

Dans tous les cas, respectez l'ordonnance de votre médecin.

CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE

En cas d'ingestion massive, consultez immédiatement un médecin.

EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÉNANTS

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÉNANTS :

Possibilité de troubles digestifs à type de nausées, constipation ou diarrhées.

Coloration habituelle des selles en noir ou gris noir.

NE PAS HÉSITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET A SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÉNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

A conserver à une température inférieure à 25°C et à l'abri de l'humidité.

DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE : 05/2014

Emballé par Mediphar Laboratories-Liban

Sous licence de Laboratoires ELERTE-France

Pour de plus amples informations, visitez notre site Internet: www.medipharlabs.com ou appelez le " Consumer Healthcare Service" au 961-4-540056.

THIS IS A MEDICAMENT

- Medicament is a product which affects your health and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.

- Follow strictly the doctor's prescription , the method of use and the

instructions of the pharmacist who sold the medicament .

- The doctor and the pharmacist are experts in medicine,its benefits and risks.

- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.

- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.

Keep medicament out of reach of children.

Council of Arab Health Ministers & Union of Arab Pharmacists



MEDIPHAR
LABORATORIES