

زيدان®

رانيتيدين هايدروكلورايد

محلول للحقن، أمبولات

التركيب

تحتوي كل أمبولة (٢ مليلتر) على:

المادة الفعالة: رانيتيدين هايدروكلورايد ما يعادل ٥٠ ملغم من

الرانيتيدين.

السواغ: ثنائي فوسفات الصوديوم، أحادي فوسفات البوتاسيوم،

فينول وماء للحقن.

الخواص

تعمل المادة الفعالة في زيدان، رانيتيدين، على تثبيط مستقبلات

الهستامين-٢ مما يؤدي إلى منع إفراز الحامض المعدي. يقلل

زيدان من حجم الإفرازات وكمية حامض المعدة والبيسين سواء

بعد الأكل أو أثناء النوم. يظهر تأثير زيدان بسرعة ويمتد

مفعوله لمدة طويلة نسبياً.

دواعي الاستعمال

يستعمل زيدان لعلاج الحالات التالية:

- قرحة الإثني عشر.

- قرحة المعدة الحميدة النشطة.

- التهاب المريء الناتج عن الارتجاع المعدي المريئي.

- حالات سوء الهضم المزمن سواء الناتج عن قرحة الجهاز

الهضمي أو بدونها.

- الحالات المرضية التي يزيد فيها إفراز حامض المعدة مثل

متلازمة زولينجر-إليسون.

تستخدم أمبولات زيدان بشكل خاص عند الحاجة لإستجابة

سريعة للدواء أو عندما يكون إعطاء الدواء عن طريق الفم غير

ممکن على سبيل المثال:

- الوقاية من النزيف المعدي - المعوي للمرضى المصابين

بالقرحة العصبية بسبب المرض الشديد.

- الوقاية من تكرار النزيف عند المرضى المصابين بنزيف

دموي نتيجة القرحة الهضمية.

- قبل التخدير العام للمرضى المصابين بخطر دخول حامض

المعدة في الجهاز التنفسي، وخاصة النساء أثناء الولادة.

الأطفال من ٦ أشهر الى ١٨ سنة:

يستخدم زيدان لعلاج القرحة الهضمية والارتجاع المعدي

المريئي، بما في ذلك التهاب المريء الناتج عن الارتجاع

ومعالجة الأعراض الناجمة عن الارتجاع المعدي المريئي.

الجرعة وطريقة الإعطاء

البالغين و المراهقين (١٢ سنة و ما فوق):

يعطى زيدان عن طريق:

- الحقن البطيء في الوريد: ٥٠ ملغم (لمدة لا تقل عن دقيقتين)

بعد تخفيف التركيز إلى ٥٠ ملغم في ٢٠ مليلتر، ومن الممكن

معاودة إعطاء الجرعة كل ٦-٨ ساعات.

- الري الوريدي بشكل متقطع: ٢٥ ملغم/ساعة لمدة ساعتين

كل ٦-٨ ساعات.

- الحقن في العضل: ٥٠ ملغم (٢ مليلتر) كل ٦-٨ ساعات.

للووقاية من النزيف نتيجة القرحة العصبية للمرضى في حالة

المرض الشديد أو للوقاية من معاودة النزيف في المرضى ذوي

القرحة الهضمية، يمكن أن يستمر العلاج بالحقن حتى يتمكن

المريض من تناول الدواء عن طريق الفم.

للووقاية من النزيف نتيجة القرحة العصبية للمرضى في حالة

المرض الشديد، يفضل إعطاء جرعة مبدئية ٥٠ ملغم ببطء عن

طريق الحقن البطيء في الوريد ويتبعها ري وريدي مستمر

(٠,١٢٥ - ٠,٢٥٠ ملغم/كغم/ساعة).

وعند خطورة تعرض المريض لدخول حامض المعدة في

الجهاز التنفسي، يمكن أن يعطى زيدان ٥٠ ملغم عن طريق

الحقن في العضل أو الحقن البطيء في الوريد، ٤٥-٦٠ دقيقة

قبل أن يبدأ مفعول المخدر الكلي.

الأطفال من ٦ أشهر الى ١١ سنة:

يمكن إعطاء زيدان عبر حقنة بطيئة في الوريد (مدة دقيقتين) على

ألا تتعدى الجرعة القصوى ٥٠ ملغم/كغم كل ٦-٨ ساعات. يتم

اللجوء للحقن الوريدي عند الأطفال لعلاج القرحة الهضمية

فقط عندما يتعذر إعطاء الدواء عن طريق الفم.

لمعالجة القرحة الهضمية والارتجاع المعدي المريئي عند

المرضى الصغار، تعطى الجرعة الأساسية من زيدان

(٢,٠ ملغم/كغم أو ٢,٥ ملغم/كغم، اقصاها ٥٠ ملغم/كغم)

عبر الري الوريدي مدة ١٠ دقائق، يليه غسيل ب ٣ مليلتر من

المحلول الملحي النظامي، أو يكون مخفف ب ٢٠ مليلتر من

المحلول الملحي النظامي. للمحافظة على درجة حموضة أكثر

من ٤,٠، يمكن اللجوء لري وريدي متقطع لجرعة ١,٥ ملغم/

كغم كل ٦-٨ ساعات. ويمكن ان يكون العلاج متواصل

وذلك عبر إعطاء جرعة ٠,٤٥ ملغم/كغم كجرعة تحميل ثم

٠,١٥ ملغم/كغم ري وريدي مستمر.

نواهي الاستعمال

يجب ألا يستعمل زيدان للمرضى ذوي الحساسية المفرطة

لرانيتيدين.

الإحتياطات

إختفاء الأعراض مع إستعمال الرانيتيدين قد يؤخر تشخيص

حالات أورام المعدة، لذلك يجب التحقق من عدم وجود أورام

قبل العلاج.

يفرز الرانيتيدين عن طريق الكليتين لذا يوصى في حالة قصور

وظائف الكليتين إعطاء جرعة ١٥٠ ملغم في المساء لمدة ٤-٨

أسابيع ويجب توخي الحذر للمرضى ذوي القصور في وظائف

الكبد عند علاجهم بالرانيتيدين حيث أن الأيض للرانيتيدين يتم

في الكبد.

كما هو الحال مع العقاقير الأخرى يجب حصر إستعمال

الرانيتيدين أثناء الحمل والإرضاع للحاجة الشديدة إليه فقط. قد

يحدث نادراً ببطء في ضربات القلب عند إعطاء رانيتيدين عن

طريق الحقن السريع وذلك فقط عند المرضى المعرضين.

إعطاء جرعات تتجاوز المقدار الموصى به قد يؤدي إلى زيادة

إفراز إنزيمات الكبد خاصة إذا إستمر العلاج لأكثر من ٥ أيام.

التأثيرات الجانبية

رانيتيدين عادة جيد التحمل.

نادراً ما قد يحدث أعراض مثل الصداع، غثيان وإمساك،

خمول ودوار وطفح جلدي عادة ما يختفي حتى مع الإستمرار

في العلاج.

يمكن أيضاً حدوث إرتفاعات عابرة لناقلات الامين

وكرياتينين الدم.

نادراً ما قد تحدث حساسية بعد إعطاء رانيتيدين عن طريق

الحقن وعن طريق الفم.

التفاعلات الدوائية

من الجائز أن يقلل رانيتيدين من إمتصاص الديازيبام ويقلل من تركيزه في البلازما.

إن إستعمال مضادات الحموضة ذات القدرة العالية على معادلة حامض المعدة يمكن أن يؤثر على التوافر الحيوي للرانيتيدين. قد تؤخر مضادات الأستيل كولين من إمتصاص الرانيتيدين وقد تزيد من توافره الحيوي.

محتوى العبة

زيدان محلول للحقن متوفر في عبة تحتوي على ٥ أمبولات أو ٥٠ أمبولة سعة ٢ مليلتر.

شروط التخزين

يحفظ في درجة حرارة لا تتعدى ٢٥°م، بعيداً عن الضوء.

أروان للصناعات الدوائية لبنان ش.م.ل.،
جدرا، لبنان

إن هذا الدواء

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر .
- إتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.
- الطبيب والصيدلي هما الخبيران بالدواء وبنفعه وضرره .
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.
- لا تترك الأدوية في متناول الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب، اتحاد الصيدالة العرب