

كانستين®



نشرة العبوة: معلومات للمستخدم كانستين كريم

كريم ١٪

المادة الفعالة: كلورمازول

يرجى قراءة هذه النشرة بعناية قبل البدء في استخدام هذا الدواء لأنه يحتوي على معلومات هامة لك.

- ◀ احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- ◀ اسأل الصيدلي إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات أو النصيحة.
- ◀ إذا أصبحت بأي أعراض جانبية، استشر طبيبك أو الصيدلي.

ماذا يحتوي هذه النشرة

- ١ - ما هو كانستين و ما هي استخداماته
- ٢ - ما الذي تحتاج معرفته قبل استخدام كانستين
- ٣ - كيف يتم استخدام كانستين
- ٤ - الآثار الجانبية المحتملة
- ٥ - كيف يتم تخزين كانستين
- ٦ - محتويات العبوة و معلومات أخرى

١ - ما هو كانستين و ما هي استخداماته

يحتوي كريم كانستين على المادة الفعالة كلورمازول. وهذه المادة الفعالة تقضي على الفطريات التي تصيب بشرة الإنسان وتتسبب في أمراض فطرية سطحية (عدوى فطرية) كما تعمل أيضا ضد بعض أنواع البكتيريا على الجلد.
كما يمكن أيضا استخدام كريم كانستين لعلاج طفح الحفاضات والاصابات الفطرية على الحشفة والقضيب.

٢ - ما الذي تحتاج معرفته قبل استخدام كانستين

متى لا ينبغي استخدام كريم كانستين
ينبغي عدم استخدام كريم كانستين إذا كنت مصابا بفرط الحساسية تجاه المنتجات المضادة للفطريات الأخرى (مضادات الفطريات من نوع إيميدازول) أو أي من مكونات المنتج الأخرى.
في الحالات المعروفة لفرط الحساسية تجاه الكحول السيتوستيريلي، يُنصح باستخدام شكل من أشكال المنتج الخالية من الكحول السيتوستيريلي بدلاً من الكريم.

لا ينبغي استخدام كريم كانستين على الغشاء المخاطي للأنف أو الفم، أو في العينين أو عليهما أو أن يتم بلعه.

التحذيرات والاحتياطات :

استشر الطبيب إذا كانت الإصابة الفطرية واسعة النطاق أو إذا كانت أظافرك مصابة أيضا.
يوجد أشكال مخصصة من الكانستين لعلاج الالتهابات الفطرية التي تصيب الأعضاء التناسلية للإناث.
يمكن أن يقلل كريم كانستين من مقاومة التمزق، وبذلك يقلل من سلامه المنتجات المطاطية مثل الواقي الذكري أو الحجاب العازل الأنثوي عند استعماله على منطقة الأعضاء التناسلية (في النساء: الشفرين والجلد الخيط، في الرجال: الحشفة والقلفة). وهذا التأثير مؤقت ومحظوظ على وقت العلاج.

إذا كنت تتناول تاكروليموس بالتزامن، فيجب عليك استشارة طبيبك قبل استعمال كريم كانستين على الحشفة والقلفة. حيث ينبغي مراقبة الجرعة الزائدة المحتملة من تاكروليموس بدقة.

أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت:
تعاني من أي أمراض أخرى.
مصابا بالحساسية

أو كنت تتناول أو تستخدم خارجيا أي أدوية أخرى (بما في ذلك تلك التي تقوم بشرائهاها من تلقاء نفسك).

الحمل والرضاعة الطبيعية

لا ينبغي استخدام كريم كانستين أثناء الحمل أو مع الرضاعة الطبيعية ما لم يصفه الطبيب.
وكإجراء وقائي، ينبغي جنب تناول الأدوية أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية إن أمكن، أو ينبغي استشارة طبيبك أو الصيدلي.

٣ - كيف يتم استخدام كانستين

للبالغين والمراهقين أكبر من عامين:

ما لم يوصف خلاف ذلك، ضع طبقة رقيقة من كريم كانستين على المناطق المصابة ٢ - ٣ مرات يوميا وادهن برقق. لعلاج الإصابات الفطرية في قناة الأذن حيث تكون طبلة الأذن سليمة، غلف شريطة من الشاش بطبقة من كريم كانستين وضعها في قناة الأذن كحشوة سائبة لعلاج طفح الحفاض باستخدام كريم كانستين. ضع طبقة رقيقة من الكريم على المناطق المصابة ٢ - ٣ مرات يوميا. ينبغي الاستمرار في العلاج لمدة ٧ أيام على الأقل. ثم يتعين على الطبيب أن يقيم مدى نجاح العلاج وتحديد ما إذا كان ينبغي الاستمرار في العلاج للإطفال أقل من عامين.

ينبغي استخدام كريم كانستين في الأطفال أقل من عامين فقط إذا وصفه الطبيب.

ولنجاح العلاج، من المهم استخدام كرم كانستين **بطريقة موثوقة ولفترة كافية** (انظر أدناه).
وتحتفل مدة العلاج بحسب المنطقة المصابة ومدى الإصابة.
بالنسبة للإصابات الفطرية على الجلد، فإنها تكون عادة من ٣ - ٤ أسابيع.
في حالة بفطيريات بين أصابع القدم وتنسم قدم الرياضي، ينبغي الاستمرار في العلاج لمدة أسبوعين تقريباً بعد اختفاء كل علامات الإصابة - حتى لو كان التحسن سريعاً - لتفادي تكرار العدوى.
ولنزع العدوى الفطرية من التكرر مرة أخرى، تأكد من خفيف المناطق المصابة من الجسم جيداً بعد غسلها. ومن المهم على وجه التحديد، خفيف ما بين أصابع اليدين والقدمين جيداً.
استشر طبيبك إذا ساءت الأعراض أو إذا لم تجد خسناً بعد أربعة أسابيع.
بالنسبة للإصابة الفطرية لمنطقة الحشفة والقلفة، فإن العلاج لمدة ١ - ٢ أسابيع تكون عادة كافية.

٤ - الآثار الجانبية المحتملة

من الممكن أن تحدث الآثار الجانبية التالية عند استخدام كرم كانستين:
من الممكن حدوث فرط حساسية وتفاعلات جلدية مثل جفاف الجلد، واحساس بالحرقان، وتقرحات وتورم، واحساس باللذع، واحمرار الجلد والحكمة، وقشور بالجلد، والشرى (ارتكاري)، وضيق في التنفس، وانخفاض في ضغط الدم قد يصل إلى الإغماء.
من الممكن أن تحدث التفاعلات الجلدية نتيجة لفرط حساسية موجود من قبل جاه الكحول سيتوستيريلي أو أي من مكونات المنتج الأخرى.
ليس من المتوقع حدوث أي تأثيرات جهازية بعد الاستعمال الخارجي.
ينبغي إبلاغ طبيبك أو الصيدلي إذا لاحظت أي أعراض جانبية غير مذكورة هنا.

٥ - كيف يتم تخزين كانستين

لا يحفظ في درجة حرارة أعلى من ٢٥ درجة مئوية
يمكن استخدام المنتج فقط حتى تاريخ الإنتهاء «EXP» الموضوع على العبوة.
حفظ الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال.
يمكن الحصول على مزيد من المعلومات من طبيبك أو الصيدلي. فهوّل الأشخاص لديهم المعلومات الكاملة الخاصة بالمتخصصين.

٦ - محتويات العبوة ومعلومات أخرى

ما الذي يحتوي عليه كانستين
كرم كانستين (مستحلب زيت في ماء)

المادة الفعالة: اجم من كرم كانستين يحتوي على ١٠ مجم من كلوتريازول.
السواغ: كحول البنزيل، سبيتيل باليتات، كحول سيتوستيريلي، ماء نقى، أوكتيل دوديكانول، بولي سوربيت ١٠، ستيرات (شماعات) السوربيتان.
استخدم دائماً الجرعة المذكورة في هذه النشرة أو التي يصفها لك طبيبك. إذا كنت تعتقد أن تأثير الدواء شديد الضعف أو شديد القوة، أخبر طبيبك أو الصيدلي.

من أين يمكن الحصول على كانستين وما هي أحجام العبوات المتوفرة؟
متوفّر في الصيدليات بدون وصفة طبية
الكرم متوفّر في أنابيب تحتوي على ٢٠ جم

تم التصنيع بواسطة شركة كيرن فارما إس إل، إسبانيا، صالح شركة باير كونسيومر كير أج. - بازل - سويسرا.

تمت آخر مراجعة لهذه النشرة في أكتوبر ٢٠١٤.

إن هذا الدواء:

- ◀ الدواء مستحضر مؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للمخاطر.
- ◀ اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك. فالطبيب والصيدلاني هما الخبراء بالدواء وبنفعه وضرره.
- ◀ لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- ◀ لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال