



زارلتو ٢,٥ ميليفرام

ريفاروكسابان

<div><div> </div>نشرة العبوة: معلومات لمستخدم الدواء</div>
زارلتو ٢,٥ مجم أقراص ذات كسوة غشائية ريفاروكسابان
<div> <div>▼ هذا الدواء يخضع لرقابة إضافية. سوف يسمح ذلك بالتعرف السريع على معلومات جديدة عن سلامة المستحضر. يمكنك المساعدة من خلال الإبلاغ عن أي آثار جانبية قد حدثت، انظر نهاية الجزء ٤ لتكيفية الإبلاغ عن الآثار الجانبية.</div></div>
<p>اقرأ كل هذه النشرة بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات هامة بالنسبة لك.</p> <ul style="list-style-type: none">⚠ احتفظ بهذه النشرة. قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى. إذا كان لديك أسئلة إضافية، اسأل طبيبك أو الصيدلي. هذا الدواء تم وصفه لك فقط. لا تعطيه للآخرين. إذ يمكن أن يسبب الضرر لهم، حتى لو كان لديهم نفس علامات المرض التي لديك. إذا تم إصابتك بأي آثار جانبية، أبلغ طبيبك أو الصيدلي. هذا يشمل أي آثار جانبية محتملة غير مذكورة في هذه النشرة، انظر الجزء ٤.

ماذا تحتوي هذه النشرة

- ١ – ما هو زارلتو و لأي غرض يستعمل
- ٢ – ما الذي تحتاج معرفته قبل تناول زارلتو
- ٣ – كيف تتناول زارلتو
- ٤ – الآثار الجانبية المحتملة
- ٥ – كيف يتم تخزين زارلتو
- ٦ – محتويات العبوة و معلومات اخرى

١ – ما هو زارلتو و لأي غرض يستعمل

لقد أعطيت زارلتو لأنه

- ⚠ قد تم تشخيص حالتك بمتلازمة الشريان التاجي الحادة (مجموعة من الحالات التي تشمل النوبات القلبية والذبحة الصدرية غير المستقرة، وهو نوع شديد من ألم في الصدر) و ظهر ان لديك زيادة في بعض اختبارات الدم في القلب.
- يقلل زارلتو لدى البالغين من خطر حدوث أزمة قلبية أخرى أو يقلل من خطر الوفاة نتيجة أمراض متعلقة بقلبك أو بالأوعية الدموية.
- لن يتم إعطائك زارلتو بمفرده، سوف يصف لك طبيبك أيضاً إما:
 - حمض أسيتيل الساليسيليك أو
 - حمض أسيتيل الساليسيليك بالإضافة إلى كلويدوجريل أو نيكلوبيدين.

أو

- ⚠ يشير تشخيص حالتك المرضية أنك تعاني من مخاطرة كبيرة لإصابتك بجلطة دموية بسبب مرض بالشريان التاجي أو مرض بالشرايين المحيطية مع العلم أن الجلطة الدموية تسبب أعراض مرضية.
- يقلل زارلتو من مخاطرة الإصابة بجلطات دموية لدى البالغين (حالات الجلطة الدموية في شريان متصّب).
- لن يتم إعطائك زارلتو بمفرده، سيخبرك طبيبك أيضاً بتناول حمض اسيتيل ساليسيليك.

يحتوي زارلتو على المادة الفعالة ريفاروكسابان و ينتمي لمجموعة من الأدوية تسمى عوامل مانعة للتخثر (مانعة للتجلط). يعمل على منع مفعول عامل جِلُّط الدم (عامل Xa) و بالتالي يقلل من ميل الدم لتكوين الجلطات.

٢ – ما الذي تحتاج معرفته قبل تناول زارلتو

لا تتناول زارلتو

- ⚠ إذا كان لديك حساسية للريفاروكسابان أو لأي من المكونات الأخرى في هذا الدواء (المذكورة في الجزء رقم ٦).
- ⚠ إذا كنت تنزف بإفراط
- ⚠ إذا كان لديك مرض في عضو من الجسم الذي يزيد المخاطرة للنزف الخطير (على سبيل المثال. قرحة المعدة أو الإصابة أو نزف في المخ. جراحة حديثة في المخ أو العيون)
- ⚠ إذا كنت تتناول أدوية تمنع جِلُّط الدم (مثل الوارفارين، دابيجتران، أبيكسابان أو الهيبارين)، الا في حالة تغيير مضاد التجلط أو أثناء الحصول على هيبارين عن طريق شرياني أو وريدي لكي يستمر هذا الخط مفتوحاً.
- ⚠ إذا كان لديك متلازمة الشريان التاجي الحادة . و كان لديك في السابق نزف أو جلطة دموية في المخ (السكتة الدماغية)
- ⚠ إذا كنت تعاني من مرض بالشريان التاجي أو مرض بالشرايين المحيطية. وتم إصابتك

في الماضي ينزف في الدماغ (سكتة دماغية) أو حدث انسداد في الشرايين الصغيرة التي توفر الدم إلى الأنسجة العميقة للدماغ (انسداد فرع صغير من أوعية دموية أكبر والذي يسبب السكتة الدماغية) أو كنت قد عانيت في الشهر الماضي من جلطة دموية في الدماغ (نقص إمدادات الدم بسبب تضيق الشرايين. سكتة دماغية لا يتم فيها انسداد فرع صغير من أوعية دموية أكبر)

⚠ إذا كان لديك مرض في الكبد يؤدي لزيادة خطر النزف

⚠ إذا كنت حاملا أو ترضعين من الثدي

لا تستخدم زارلتو و ابلغ طبيبك إذا كان أي من هذه الحالات ينطبق عليك.

التحذيرات و الاحتياطات

خذت إلى طبيبك أو الصيدلي قبل تناول زارلتو.

لا ينبغي استخدام زارلتو مع بعض الأدوية الأخرى التي تقلل من جِلُّط الدم مثل بروسوغريل أو تيكاجريلور بخلاف حمض أسيتيل الساليسيليك وعقار كلويدوجريل / نيكلوبيدين.

اتخاذ عناية خاصة مع زارلتو

⚠ إذا كان لديك خطر متزايد للنزف، كما يمكن أن يكون الحال في حالات مثل:

- مرض شديد للكلى حيث وظيفة الكلى الخاصة بك قد تؤثر على كمية الدواء التي تعمل في جسمك
- إذا كنت تتناول أدوية أخرى لمنع جِلُّط الدم (مثل الوارفارين، دابيجتران، أبيكسابان أو الهيبارين). عند تغيير العلاج المضاد للتجلط أو عندما يتم الحصول على الهيبارين عن طريق الوريد أو الشريان لإبقائه مفتوحاً (انظر الجزء ”زارلتو و الأدوية الأخرى“)
- اضطرابات النزف
- ضغط دم مرتفع جداً. غير منضبط بعلاج طبي
- أمراض المعدة أو الأمعاء التي قد تؤدي إلى النزف. على سبيل المثال التهاب الأمعاء أو المعدة. أو التهاب في المريء على سبيل المثال بسبب مرض الارتداد المعدي المريئي (يحدث في هذا المرض أن حمض المعدة يصعد إلى المريء) مشكلة بالأوعية الدموية
- خلف العيون (اعتلال الشبكية)

- مرض رئوي تكون فيه الشعب موسعة و مليئة بالصيد (توسع القصبات). أو حدوث نزيف سابق من الرئة
- كنت أكبر من ٧٥ عاماً
- كنت ترن ٦٠ كجم أو أقل
- لديك مرض الشريان التاجي مصاحب لفشل في القلب ذو أعراض شديدة
- ⚠ إذا كان لديك صمام صناعي في القلب
- ⚠ إذا كنت تعلم أن لديك مرضاً يسمى متلازمة مضاد الفوسفوليبيد (اضطراب في الجهاز المناعي الذي يسبب زيادة خطر جلطات الدم) . أخبر طبيبك الذي سيقرر ما إذا كان العلاج قد يحتاج إلى تغيير.

إذا كان اي من هذه الحالات ينطبق عليك، اخطر طبيبك قبل ان تتناول زارلتو. سوف يقر طبيبك، إذا كان يجب علاجك بالزارلتو أو إذا كان يجب أن يبقيك تحت ملاحظة دقيقة.

إذا كان هناك حاجة لإجراء عملية جراحية.

- ⚠ من المهم جداً تناول زارلتو قبل و بعد العملية الجراحية في الأوقات المحددة تماماً و التي أوصى بها طبيبك.
- ⚠ إذا كانت العملية تتضمن قسطرة أو حقن في العمود الفقري (مثل تخدير فوق الجافية أو النخاع الشوكي أو للحد من الألم).
- من المهم جداً أن تتناول زارلتو قبل وبعد الحقن أو إزالة القسطرة في الأوقات المحددة التي أوصي بها طبيبك
- أخبر طبيبك فوراً اذا كان لديك تمهيل أو ضعف في الساقين أو مشاكل بالأعضاء أو المثانة بعد انتهاء التخدير لأنه من الضروري وجود رعاية عاجلة

الاطفال و المراهقين

لا يوصى بتناول زارلتو لأشخاص عمرهم أقل من ١٨ سنة. لا توجد معلومات كافية عن استخدامه لدى الأطفال أو المراهقين.

استخدام أدوية أخرى مع زارلتو

ابلغ طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو قد تناولت حديثاً أو قد تتناول أية أدوية أخرى. بما فيها الأدوية التي يتم الحصول عليها بدون وصفة طبية.

⚠ **إذا كنت تتناول:**

- بعض الأدوية للعدوى الفطرية (مثل فلوكونازول، إيتراكونازول، فوريكونازول، بوزاكونازول). إلا إذا وضعت فقط على الجلد
- أقراص الكينوتوكانازول (المستخدمة لعلاج متلازمة كوشينغ – عندما ينتج الجسم فائض من الكورتيزول)
- بعض أدوية العدوى البكتيرية (مثل كلاريثرومايسين وإريثروميسين)
- بعض الأدوية المضادة للفيروسات لفيروس نقص المناعي البشري / الإيدز (متلازمة نقص المناعي المكتسب) HIV / AIDS (مثل ريتونافير)
- أدوية أخرى لتقليل جِلُّط الدم (على سبيل المثال إنوكسابارين. كلويدوجريل أو مضادات فيتامين ك مثل الوارفارين، اسينوكومارول، براسوجريل وتيكاجريلور (انظر في هذه النشرة إلى الجزء الذي عنوانه ”التحذيرات والاحتياطات“))
- أدوية مضادة للالتهاب و مسكنة للألم (مثل نابروكسين أو حامض الاسيتيل ساليسيليك)
- دروندارون، دواء لعلاج نبض غير طبيعي للقلب
- بعض الأدوية لعلاج الاكتئاب (مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs) أو مثبطات امتصاص النوريفرين سبروتونين (SNRIs))

ابلغ طبيبك قبل استخدام زارلتو إذا كان أي من الحالات المذكورة أعلاه تنطبق عليك. لأن تأثير زارلتو يمكن أن يزداد. سوف يقرر طبيبك، إذا كان يجب علاجك بالزارلتو و إذا كان يجب أن يبقيك تحت ملاحظة دقيقة.

إذا كان طبيبك يعتقد أن هناك خطورة حدوث قرح في المعدة أو في الأمعاء، يمكنه أيضاً استخدام علاج وقائي للقرحة.

⚠ **إذا كنت تتناول:**

- بعض الأدوية لعلاج الصرع (فينيتوين، كاربامازيبين، فينوباريتال).
- عشبة القديس جون. منتج نباتي يتم استخدامه لعلاج الاكتئاب.
- ريفاميسين، مضاد حيوي.

ابلغ طبيبك قبل تناول زارلتو، إذا كان أي من الحالات المذكورة أعلاه تنطبق عليك. لأن تأثير زارلتو يمكن أن يقل. سوف يقرر طبيبك، إذا كان يجب علاجك بزارلتو و إذا كان يجب أن يبقيك تحت ملاحظة دقيقة.

الحمل و الإرضاع من الثدي

إذا كنت حاملاً أو ترضعين من الثدي لا تستخدمين زارلتو. إذا كان هناك احتمال بأن تصبحي حاملا. استخدمي مانعاً للحمل مضموناً أثناء تناولك زارلتو. إذا أصبحتِ حاملا أثناء تناولك زارلتو، اخطري طبيبك فوراً. هو الذي سوف يقرر كيفية علاجك.

القيادة و استخدام الماكينات

يمكن أن يسبب زارلتو آثاراً جانبية مثل دوخة (التكرار؛ شائع) أو إغماء (التكرار؛ غير شائع) (انظر الجزء رقم ٤. الآثار الجانبية المحتملة). يجب عدم القيادة أو استخدام الماكينات إذا عانيت من هذه الأعراض.

يحتوي زارلتو على اللاكتوز و الصوديوم.

إذا كان قد تم إبلاغك من قبل الطبيب أن لديك عدم احتمال لبعض السكريات، اتصل بطبيبك قبل تناول زارلتو.

يحتوي كل قرص من هذا الدواء على أقل من ١ مللي مول صوديوم (٢٣ مجم)، وهذا يعني بشكل أساسي انه ”خالي من الصوديوم“.

٣ – كيف يستخدم زارلتو

دائماً استخدم هذا الدواء بدقة كما يوصي به طبيبك. إذا كنت غير متأكدً راجع طبيبك أو الصيدلي.

ما هي الكمية المستخدمة

الجرعة الموصي بها هي قرص واحد ٢,٥ مجم مرتين يومياً. تناول القرص في نفس الموعد تقريباً كل يوم (مثال لذلك، قرص واحد في الصباح و قرص واحد في المساء). هذا الدواء يمكن تناوله مع أو بدون طعام.

إذا كان لديك صعوبة في بلع القرص بأكمله، أبلغ طبيبك عن طرق أخرى لتناول زارلتو.

يمكن سحق الأقراص و خلطها مع الماء أو التفاح المهروس مباشرة قبل تناولها.

إذا لزم الأمر، قد يعطيك أيضاً طبيبك مسحوق قرص زارلتو عن طريق أنبوب في المعدة. لن يتم إعطائك زارلتو بمفرده، سوف يخبرك طبيبك أن تتناول حمض أسيتيل الساليسيليك.

إذا كنت قد تناولت زارلتو بعد الإصابة بمتلازمة حادة بالشريان التاجي، فقد يخبرك الطبيب أن تتناول أيضاً كلويدوجريل أو نيكلوبيدين.
طبيبك سوف يبلغك كم من هذه الأدوية يجب تناولها (عادة ما بين ٧٥ الى ١٠٠ ميليجرام حمض أسيتيل الساليسيليك يومياً أو جرعة يومية من ٧٥–١٠٠ ميليجرام حمض أسيتيل الساليسيليك، بالإضافة إلى جرعة يومية من إما ٧٥ ميليجرام كلويدوجريل أو جرعة يومية قياسية من نيكلوبيدين).

متى تبدأ تناول زارلتو

العلاج يتناول زارلتو بعد الإصابة بمتلازمة حادة بالشريان التاجي يجب أن يبدأ في أقرب وقت يمكن بعد استقرار متلازمة الشريان التاجي الحادة. في أقرب ٢٤ ساعة بعد دخول المستشفى، و في الوقت عندما يكون عادة قد تم التوقف عن علاج منع التجلط (عن طريق الحقن).

سيخبرك طبيبك متى تبدأ العلاج باستخدام زارلتو إذا تم تشخيصك بمرض بالشريان التاجي أو مرض بالشرايين المحيطية. سوف يقرر طبيبك الفترة الزمنية التي يجب أن تستمر بها في العلاج.

إذا تناولت زارلتو أكثر مما ينبغي تناوله

اتصل بطبيبك فوراً إذا كنت قد تناولت أقراص زارلتو أكثر كثيراً مما ينبغي. تناول زارلتو بكميات كبيرة يزيد خطر النزف.

إذا نسيت تناول زارلتو

لا تتناول جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية، إذا نسيت جرعة. تناول الجرعة التالية في التوقيت المعتاد.

إذا توقفت عن استخدام زارلتو

تناول زارلتو بشكل منتظم طالما يصفه طبيبك لك.

لا تتوقف عن استخدام زارلتو بدون مناقشة ذلك مع طبيبك أولاً، إذا توقفت عن تناول هذا الدواء، قد تزيد من خطر حدوث نوبة قلبية أخرى أو سكتة دماغية أو الموت من مرض متعلق بقلبك أو بالأوعية الدموية.

إذا كان لديك أسئلة إضافية عن استخدام هذا المستحضر، اسأل طبيبك أو الصيدلي.

٤ – الآثار الجانبية المحتملة

مثل كل الأدوية، زارلتو يمكن أن يسبب آثارا جانبية، على الرغم أنه ليس كل شخص يصاب بها.

مثل كل الأدوية الأخرى المشابهة (مانعة للتجلط)، زارلتو يمكن أن يسبب آثارا جانبية، على الرغم أنه ليس كل شخص يصاب بها. يمكن أن يسبب زارلتو نزف و الذي يمكن أن يكون مهدد للحياة. النزف الزائد يمكن أن يؤدي لهبوط مفاجيء في ضغط الدم (صدمة). في بعض الحالات هذا النزف يمكن أن يكون غير واضح.

الآثار الجانبية المحتمل حدوثها و التي يمكن أن تعتبر علامة لوجود نزف

أبلغ طبيبك فوراً إذا عانيت اي من الآثار الجانبية الآتية:

⚠ نزف لفترة طويلة أو مفرط (غزير)

⚠ ضعف غير اعتيادي. تعب، شحوب، دوخة، صداع، تورم غير مبرر. صعوبة التنفس. ألم في الصدر أو ذبحة صدرية، التي يمكن أن تكون علامات للنزف.

ربما يقرر طبيبك أن يبقيك تحت ملاحظة دقيقة أو يغير كيفية علاجك.

الآثار الجانبية المحتملة التي قد تكون علامة على رد فعل شديد في الجلد:

⚠ أخبر طبيبك فوراً إذا واجهت ردود فعل جلدية مثل:

⚠ انتشار طفح جلدي شديد، بثور أو آفات مخاطية، على سبيل المثال، في الفم أو

العيون (متلازمة ستيفنز جونسون / انحلال البشرة السام). معدل حدوث رد الفعل هذا نادر جدا (يصل إلى ١ في ١٠,٠٠٠).

⚠ تفاعل دوائي يسبب الطفح الجلدي والحُمى والتهاب الأعضاء الداخلية والشذوذ الدموي والأمراض الجهازية (متلازمة DRESS). تكرر هذا التأثير الجانبي نادر جدا (يصل إلى ١ في ١٠,٠٠٠).

الآثار الجانبية المحتملة التي قد تكون علامة على الحساسية الشديدة

⚠ أخبر طبيبك فوراً إذا واجهت أي من الآثار الجانبية التالية:

⚠ تورم في الوجه، الشفتين، الفم، اللسان أو الحلق. صعوبة في البلع؛ حكة موضعية وصعوبات في التنفس؛ انخفاض مفاجئ في ضغط الدم. تكرر هذه الآثار الجانبية نادر جداً (ردود أفعال حساسية مبالغ فيها). بما في ذلك صدمة الحساسية؛ يمكن أن تصل الإصابة إلى ١ في ١٠,٠٠٠ شخص) وغير شائع (تورم لمنطقة في الطبقة السفلى من الجلد والأنسجة التي تقع تحت الجلد أو الأغشية المخاطية والتراكم المفرط للسوائل. وخاصة الماء، في فراغات أنسجة الجسم بسبب الحساسية؛ يمكن أن تصل الإصابة إلى ١ في ١٠٠ شخص)

قائمة كاملة للآثار الجانبية المحتملة:

شائعة (يمكن أن تصيب حتى ١ في ١٠ أشخاص)

⚠ انخفاض في خلايا الدم الحمراء التي يمكن أن تجعل الجلد شاحب و تسبب ضعف أو

عسر التنفس

⚠ نزف في المعدة أو الأمعاء، نزف في الجهاز البولي و التناسلي (تشمل دم في البول و نزف حبيضي / دورة شهرية شديدة)، نزف بالانف، نزف بالثثة.

⚠ نزف داخل العين (يشمل نزف من بيض العيون)

⚠ نزف داخل نسيج أو جُوفٍ في الجسم (مُجم دموي، تكدم (كدمة))

⚠ سعال مصاحب لدم

⚠ نزف من الجلد أو تحت الجلد

⚠ نزف بعد العملية الجراحية

⚠ ارتشاح دم أو سائل من الجرح الجراحي

⚠ تورم في الاطراف

⚠ ألم في الاطراف

⚠ خلل في وظائف الكلى (يمكن التعرف عليها في الاختبارات التي يؤديها الطبيب)

⚠ ارتفاع في درجة حرارة الجسم

⚠ ألم في المعدة، عسر الهضم، شعور بالغثيان، إمساك، إسهال.

⚠ ضغط دم منخفض (الأعراض يمكن أن تكون دوخة أو إغماء عند الوقوف)

⚠ انخفاض عام في المقدرة و الطاقة (ضعف، تعب)، صداع، دوخة.

⚠ طفح، حكة جلدية

⚠ يمكن أن تُظهر اختبارات الدم زيادة في بعض إنزيمات الكبد

غير شائعة (يمكن أن تصيب حتى ١ في ١٠٠ شخص)

⚠ نزف داخل المخ أو داخل الجمجمة

⚠ نزف داخل المفصل فيسبب ألم و ورم

⚠ نقص الصفائح (انخفاض عدد الصفائح الدموية، وهي الخلايا التي تساعد على جِلُّط الدم)

⚠ تفاعلات أرجية (حساسية). تشمل تفاعلات أرجية (حساسية) للجلد.

⚠ خلل وظائف الكبد (يمكن أن يظهر في الفحوصات الجبرية الذي يقوم بها طبيبك)

⚠ يمكن أن تُظهر اختبارات الدم زيادة في البيليروبين، بعض إنزيمات البنكرياس أو إنزيمات الكبد أو في عدد الصفائح الدموية

⚠ إغماء

⚠ شعور باعتلال الصحة

⚠ زيادة ضربات القلب

⚠ جفاف بالفم

⚠ سُرى (ارتكاريا)

نادراً (يمكن أن تصيب حتى ١ في ١,٠٠٠ شخص)

⚠ نزف داخل العضل

⚠ ركود صفراوي (انخفاض تدفق الصفراء). التهاب الكبد بما في ذلك إصابة الخلايا الكبدية (التهاب الكبد بما في ذلك إصابة الكبد)

⚠ اصفرار الجلد و العين (يرقان)

⚠ تورم موضعي

⚠ مُجم دموي (ورم دموي) في الفخذ كمضاعفات لإجراءات قلبية تتطلب إدخال قسطرة

(قسطار) داخل شريان الساق (تمد كبسلى دموى كاتب)

غير معروفة (لا يمكن تقدير تكرارها من البيانات المتاحة):

⚠ فشل كلوي بعد نزف شديد

⚠ ارتفاع الضغط داخل عضلات السيقان أو الأذرع بعد النزف. و الذي يمكن أن يؤدي لألم، تورم، تغيير في الاحساس، تمهيل أو شلل.

الإبلاغ عن الآثار الجانبية

إذا تم إصابتك بأي آثار جانبية، خذت مع طبيبك أو الصيدلي. هذا يشمل أي آثار جانبية محتملة غير مذكورة في هذه النشرة. يمكن أن تساعد من خلال الإبلاغ عن الآثار الجانبية على توفير مزيد من المعلومات عن سلامة هذا الدواء.

٥ – كيف يتم تخزين زارلتو

يحفظ هذا الدواء بعيداً عن متناول نظر و ايدي الأطفال.

لا تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء المفعول المبين على العبلة الكرتون و على كل شريط أو العبوة الزجاجية بعد EXP. تاريخ انتهاء المفعول يشير الى آخر يوم من ذلك الشهر.

يحفظ في درجة حرارة لا تزيد عن ٣٠ درجة مئوية.

يجب عدم التخلص من الأدوية عن طريق الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي كيف تتخلص من الأدوية التي لم تعد تحتاج إليها. هذه الإجراءات سوف تساعد على حماية البيئة.

٦ – محتويات العبوة و معلومات اخرى

ماذا يحتوي زارلتو

⚠ المادة الفعالة ريفاروكسابان. يحتوي كل قرص على ٢,٥ مجم ريفاروكسابان.
⚠ المكونات الأخرى هي:

ليب القرص: سليبلوز ذات بلورات مجهرية، كروس كارمللوز صوديوم، لاكتوز مونو هيدرات، هيبرو مللوز ٢٩١٠، صوديوم لوراليل سلفات، استيرات المغنسيوم، انظر جزء ٢ ”يحتوي زارلتو على اللاكتوز و الصوديوم“.

الكسوة الغشائية: ماكروجول ٣٢٥٠، هيبرو مللوز ٢٩١٠، ثاني اكسيد التيتانيوم (E17١)، اكسيد الحديدك الأصفر (E172).

ماذا يشبه زارلتو و ما هي محتويات العبوة

زارلتو ٢,٥ مجم أقراص ذات كسوة غشائية لونها أصفر فاتح. مستديرة. محدبة من الوجهين و لها علامة على الوجه الأول BAYER-CROSS و على الوجه الآخر ”٢,٥“ و مثلث، متوفر منها:

- شرائط داخل عبلة كرتون تحتوي على ١٤، ٢٠، ٢٨، ٣٠، ٥٦ (1٤x٤)، ٦٠، ٩٨، ١١٨ أو ١٩٦ قرص أو
 - شرائط جرعة مفردة داخل عبلة كرتون عبوة ١٠ X ١٠ أو ١٠ X ١٠٠ قرص أو
 - في عبوات متعددة تحتوي على ١٠ عبب كرتون، تحتوي كل منها على ١٠ x ١٠ أقراص أو
 - في عبوات زجاجية بها ١٠٠ قرص
- ليس كل أحجام العبوات يتم تسويقها.

المصنع و حامل ترخيص التسويق:

باير ايه جي

٥١٣٦٨ ليفركوزن.

ألمانيا

تمت آخر مراجعة لهذه النشرة في يوليو ٢٠١٩.

إن هذا الدواء
⚠ مستحضر طبي يؤثر على صحتك و استعماله خلاف التعليمات يعرضك للخطر
⚠ اتبع بدقة استشارة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرف لك الدواء.
⚠ الطبيب والصيدلاني هما الخياران بالدواء وينفعه وضربه.
⚠ لا تقطع العلاج قبل المدة المحددة لك من تلقاء نفسك.
⚠ لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.
احفظ الدواء بعيدا عن متناول أيدي الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب

إتحاد الصيدالة العرب

باير