

دليل الدّواء جانوفيا® (جاه-نو-في-اه) (سيتاجليبتين) 25 ملغم و50 ملغم و100 ملغم أقراص، للاستخدام عن طريق الفم

اقرأ دليل الدّواء هذا بعناية قبل بدء تناول عقار جانوفيا وفي كل مرة يُعاد فيها صرف هذا الدّواء. قد تكون هناك معلومات جديدة. لا يمكن الاستعاضة بهذه المعلومات عن التّحدث إلى طبيبك حول حالتك الطبية أو علاجك. إذا كان لديك أيُّ أسئلة حول عقار جانوفيا، فاستشر طبيبك أو الصيدلي الخاص بك.

- ما المعلومات الأكثر أهمية التي ينبغي عليّ معرفتها حول عقار جانوفيا؟** يمكن أن يُسبب عقار جانوفيا أعراضًا جانبية خطيرة، بما في ذلك الآتي:
 - التهاب البنكرياس الذي قد يكون شديدًا وربما يؤدي إلى الوفاة.** بعض المشاكل الطبية تجعلك أكثر عُرضة للإصابة بالتهاب البنكرياس. **قبل أن تبدأ في تناول عقار جانوفيا،** أخبر طبيبك إذا كنت قد عانيت من قبل من الآتي:
 - التهاب البنكرياس.
 - وجود حصّى
 - وجود تاريخ من المرارة.
 - إدمان الكحوليات.
 - ارتفاع مستويات
 - مشاكل بالكلى.

الدهون الثلاثية بالذّم.
توقف عن تناول عقار جانوفيا واتصل بطبيبك فورًا إذا عانيت من ألم شديد ومستمر بمنطقة المعدة (البطن). قد تشعر بالألم يمتد من بطنك إلى ظهرك. قد يحدث الألم مصحوبًا أو غير مصحوب بقيء. قد تكون تلك أعراض الإصابة بالتهاب البنكرياس.

- فشل القلب.** يُقصد بفشل القلب أن القلب لديك لا يضخ الدّم بشكل كافٍ. **قبل أن تبدأ في تناول عقار جانوفيا،** أخبر طبيبك إذا كنت قد عانيت من قبل من فشل القلب أو وجود مشاكل بالكلى. اتصل بطبيبك فورًا إذا أصبت بأيّ من الأعراض التّالية:
 - زيادة ضيق التّنفّس أو صعوبة في التّنفّس، خاصّةً عند الاستلقاء
 - تورم أو احتباس السوائل، خاصّةً بالقدمين، أو الكاحلين أو الساقين
 - زيادة الوزن بشكل سريع وغير مُعتاد
 - تعب غير مُعتادقد تكون تلك أعراض الإصابة بفشل القلب.

ما هو عقار جانوفيا؟

- عقار جانوفيا هو دواء وصفي يُستخدم بجانب اتباع النظام الغذائي وممارسة التمارين الرياضية لخفض مستوى السكر بالذّم لدى البالغين المُصابين بمرض السكري من النوع "2".
- عقار جانوفيا غير مُخصص للاستخدام لعلاج الأشخاص المُصابين بمرض السكري من النوع "4".
- إذا كنت قد أصبت بالتهاب البنكرياس في الماضي، فمن غير المعروف ما إذا كنت أكثر عُرضة للإصابة بالتهاب البنكرياس أثناء تناول عقار جانوفيا أم لا.
- لم يتم التّحقّق من أمان وفعّالية استخدام عقار جانوفيا في المرضى من الأطفال.

من يجب عليهم عدم تناول عقار جانوفيا؟

لا تتناول عقار جانوفيا في الحالات الآتية:

- إذا كنت تُعاني من الحساسية تجاه أيّ من المكونات الموجودة في عقار جانوفيا. انظر نهاية دليل الدّواء هذا لمعرفة القائمة الكاملة لمكونات عقار جانوفيا. قد تُشمل أعراض إحدى تفاعلات الحساسية الخطيرة تجاه عقار جانوفيا طفحًا جلديًا أو بقعًا حمراء بارزة على الجلد (ارتكاريًا) أو تورّم الوجه والشفَتين واللسان والحنق مما قد يسبب صعوبة في التّنفّس أو البلع.

بماذا ينبغي عليّ إخبار طبيبي قبل تناول عقار جانوفيا؟

قبل تناول عقار جانوفيا، أخبر طبيبك بكافة حالاتك الطبية، بما في ذلك الحالات الآتية:

- إذا كنت تعاني أو قد عانيت من التهاب البنكرياس.
- إذا كنت تعاني من مشاكل بالكلى.
- إذا كنت تعاني من فشل القلب.
- إذا كنت حاملًا أو تخططين للحمل. من غير المعروف ما إذا كان عقار جانوفيا سيسبب بجنينك أم لا. إذا كنت حاملًا، تحدثي إلى طبيبك حول الطريقة المثلى لضبط مستوى السكر لديك في الدّم أثناء حملك.
- إذا كنتِ مرضعًا أو تخططين لممارسة الرضاعة الطبيعية. من غير المعروف ما إذا كان عقار جانوفيا يمر في حليب الأم أم لا. تحدثي إلى طبيبك حول الطريقة المثلى لإطعام طفلك إذا كنتِ تتناولين عقار جانوفيا.

أخبر طبيبك عن جميع الأدوية التي تتناولها، بما في ذلك الأدوية التي تحصل عليها بوصفة طبية أو بدون وصفة طبية والفيتامينات والمكملات العشبية. كن على علم بالأدوية التي تتناولها. احتفظ بقائمة بأدويةك وأعرضها على طبيبك والصيدلي الخاص بك عند حصولك على دواء جديد.

كيف يجب عليّ تناول عقار جانوفيا؟

- تناول عقار جانوفيا مرة واحدة كل يوم كما أخبرك طبيبك بالضبط.
- يمكنك تناول عقار جانوفيا مع الطعام أو بدونه.
- سيجري طبيبك اختبارات بالذّم للتحقق من مدى كفاءة عمل الكلى لديك قبل وأثناء علاجك بعقار جانوفيا.
- قد يخبرك طبيبك بتناول عقار جانوفيا بجانب أدوية أخرى خاصة بمرض السكري. قد يحدث انخفاض في مستوى السكر بالذّم بوتيرة أكبر عند تناول عقار جانوفيا إلى جانب أدوية أخرى خاصة بمرض السكري. انظر **"ما هي الأعراض الجانبية المحتملة لعقار جانوفيا؟"**
- إذا أغفلت تناول إحدى الجرعات، فتناولها بمجرد تتذكرك لها. إذا لم تتذكر حتى حلول موعد تناول الجرعة التالية، فتجاوز الجرعة التي أغفلتها واستمر في تناول الجرعات وفقًا لجدولك المعتاد. لا تتناول جرعتين من عقار جانوفيا في الوقت نفسه.

- إذا تناولت كمية كبيرة من عقار جانوفيا، فاتصل فورًا بطبيبك أو بمركز مكافحة السموم المحلي.
- عندما يكون جسمك تحت بعض أنواع التوتر، مثل الحمى، أو الإصابات الرضحية (الناجمة على سبيل المثال عن حادث سير)، أو العدوى أو الجراحة، فقد تتغير الكمية التي تحتاجها من دواء مرض السكري. أخبر طبيبك فورًا إذا كنت تعاني من أيّ من هذه الحالات واتبع تعليمات طبيبك.
- تحقق من مستوى السكر لديك بالذّم كما أخبرك طبيبك.
- التزم بالنظام الغذائي وبرنامج التمارين الرياضية الموصوفين لك أثناء تناول عقار جانوفيا.
- تحدث إلى طبيبك حول كيفية الوقاية من انخفاض مستوى السكر بالذّم (نقص السكر بالذّم) وارتفاع مستوى السكر بالذّم (فرط السكر بالذّم) والمشاكل الناجمة عن مرض السكري الذي تعاني منه وكيفية اكتشافها وعلاجها.
- سيخصص طبيبك حالة مرض السكري الذي تعاني منه عبر إجراء اختبارات بالذّم، بما في ذلك مستويات السكر لديك بالذّم ومستوى الهيموجلوبين السكري لديك.

ما هي الأعراض الجانبية المحتملة لعقار جانوفيا؟

يمكن أن يُسبب عقار جانوفيا أعراضًا جانبية خطيرة، بما في ذلك الآتي:

- انظر **"ما المعلومات الأكثر أهمية التي ينبغي عليّ معرفتها حول عقار جانوفيا؟"**
- مشاكل بالكلى،** في بعض الأحيان يتطلب الأمر الخضوع للغسيل الكلوي.
- انخفاض مستوى السكر بالذّم (نقص السكر بالذّم).** إذا تناولت عقار جانوفيا إلى جانب دواء آخر يمكنه خفض مستوى السكر بالذّم، مثل السلفونيل يوريا أو الأنسولين، فسيكون التعرض لخطر الإصابة بانخفاض مستوى السكر بالذّم أعلى. قد يقتضي الأمر خفض الجرعة الخاصة بك من دواء السلفونيل يوريا أو الأنسولين أثناء استخدامك لعقار جانوفيا. قد تشمل علامات وأعراض انخفاض مستوى السكر بالذّم الآتي:
 - صداعًا
 - نعاسًا
 - هياجًا
 - جوعًا
 - دوخة

- تفاعلات حساسية خطيرة.** إذا كنت تُعاني من أيّ من أعراض أحد تفاعلات الحساسية الخطيرة، توقف عن تناول عقار جانوفيا واتصل بطبيبك فورًا أو احصل على المساعدة الطبية الطارئة. انظر **"من يجب عليهم عدم تناول عقار جانوفيا؟"**. قد يعطيك طبيبك دواءً لعلاج تفاعل الحساسية الذي تعاني منه ويصف لك دواءً آخر لعلاج مرض السكري.
- ألم المفاصل.** قد يُصاب بعض الأشخاص الذين يتناولون أدوية تُدعى مثبطات إنزيم ثنائي بيتيدل- البيبتيداز— 4 مثل عقار جانوفيا بألم بالمفاصل والذي قد يكون شديدًا. اتصل بطبيبك إذا كنت تعاني من ألم شديد بالمفاصل.
- التفاعلات الجلدية.** قد يُصاب بعض الأشخاص الذين يتناولون أدوية تُدعى مثبطات إنزيم ثنائي بيتيدل- البيبتيداز— 4 مثل عقار جانوفيا بتفاعل جلدي يُسمى شبيه القفاح القفاعي والذي قد يتطلب الخضوع للعلاج بالمستشفى. أخبر طبيبك فورًا إذا عانيت من بثور أو انحلال الطبقة الخارجية للجلد (تآكل الجلد). قد يخبرك طبيبك بالتوقف عن تناول عقار جانوفيا.

تشمل الأعراض الجانبية الأكثر شيوعًا لعقار جانوفيا عدوى بالجهاز التنفسي العلوي وانسداد الأنف أو سيلانه والتهاب الحلق وصداعًا.

قد يكون لعقار جانوفيا أعراضًا جانبية أخرى، من ضمنها اضطراب المعدة والإسهال وتورم اليدين أو الساقين، عند استخدام عقار جانوفيا إلى جانب ميتفورمين وروزيجليتازون (أفانديا). روزيجليتازون هو نوع آخر من أدوية علاج مرض السكري.

أخبر طبيبك إذا كنت تُعاني من أي عرض جانبي يُسبب لك انزعاجًا أو لا يزول. هذه ليست جميع الأعراض الجانبية المحتملة لعقار جانوفيا. للمزيد من المعلومات، يرجى استشارة طبيبك أو الصيدلي الخاص بك.

اتصل بطبيبك للحصول على المشورة الطبية حول الأعراض الجانبية.

كيف يجب عليّ تخزين عقار جانوفيا؟

لا يُخزّن في درجة حرارة تتعدى 30 درجة مئوية.

احفظ عقار جانوفيا وجميع الأدوية بعيدًا عن متناول الأطفال.

معلومات عامة حول الاستخدام الآمن والفعّال لعقار جانوفيا.

يتم أحيانًا وصف الأدوية لأغراض بخلاف تلك المُدرجة في دليل الدواء. لا تستخدم عقار جانوفيا لعلاج حالة لم يتم وصفه لها. لا تعط عقار جانوفيا لأشخاص آخرين، حتى إذا كانوا يعانون من نفس الأعراض التي تعاني أنت منها؛ فقد يضر بهم.

يلخص دليل الدّواء هذا أهم المعلومات المتعلقة بعقار جانوفيا. تحدث إلى طبيبك إذا أردت معرفة المزيد من المعلومات. يمكنك أن تطلب من طبيبك أو الصيدلي الخاص بك المعلومات المتعلقة بعقار جانوفيا المكتوبة لأخصائي الرعاية الصحية.

ما هي مكونات عقار جانوفيا؟

المكون الفعّال: سيتاجليبتين

المكونات غير الفعّالة: سليولز دقيق الثّبُلور، وفوسفات الكالسيوم ثنائي القاعدة اللامائي، وكروسكارميلوز الصوديوم، وستيرات الماغسيوم وفومارات ستيريل الصوديوم. يحتوي غلاف القرص على المكونات غير الفعّالة التالية: كحول عديد الفينيل، وبولي إيثيلين الجلايكول، وتالك، وثاني أكسيد التيتانيوم، وأكسيد الحديد الأحمر وأكسيد الحديد الأصفر.

كيف يتوافر عقار جانوفيا؟

يتوافر عقار جانوفيا 25 ملغم، و50 ملغم و100 ملغم على هيئة عيوه كرتونية بها شريطان بهما 14 قرصًا.

قد لا يتم تسجيل/تسويق جميع التركيزات.

تم التّصنيع والإصدار من قبل:

أورجانون فارما (UK) المحدودة. شوتون لين، كراملينجتون نورثمبرلاند NE23 3JU المملكة المتحدة

مالك حق التسويق:

شركة ميرك شارب أند دوم ذ.م.م، راهواي، نيوجيرسي.

126 طريق إيست لينكولن.

راهواي، نيوجيرسي 07065 ، الولايات المتحدة الأمريكية .

تمت المراجعة في: 07/2022

جميع الحقوق محفوظة.

(هذا منتج دوائي)

الدّواء منتج يُؤثر على صحتك وتناوله على نحو مخالف للتعليمات يعرضك للخطر.

اتبع الوصفة الطبية تمامًا وطريقة الاستخدام وتعليمات الصيدلي الذي باعك الدّواء.

الطبيب والصيدلي هما خبيران في الأدوية وفوائدها ومخاطر ها.

لا توقف من تلقاء نفسك فترة العلاج التي تم وصفها لك.

لا تكرر نفس الوصفة الطبية دون استشارة طبيبك.

احفظ الدّواء بعيدًا عن متناول الأطفال

مجلس وزراء الصحة العرب