

انتبه واقرأ بعناية**أليرجوديل بخاخ للأنف**

المكونات الفعالة : أزيلاستين هايدروكلورايد

التركيب :

كل بخة (تعادل ٠,١٤ ميليلتر من المحلول) تحتوي على ٠,١٤ مليغرام من أزيلاستين هايدروكلورايد .

مكونات أخرى :

ايديتات الصوديوم ، ميثايل هيدروكسي بروبيل سيليلوز ، حمض الستريك منزوع الماء فوسفات الصوديوم ، كلورايد الصوديوم ، ماء مقطر .

دواعي الاستعمال :

لعلاج أعراض التهاب الأنف التحسسي الموسمي (حمى القش) أو التهاب غشاء الأنف التحسسي غير الموسمي (الدائم).

مضادات الاستعمال :

أليرجوديل يجب ألا يستعمل للمرض ذوي فرط التحسس للأزيلاستين هايدروكلورايد ، أو الايدتا ولا للأطفال دون سن ٦ سنوات .

الاستعمال في حالتي الحمل و الرضاعة :

على الرغم من أن الجرعات الزائدة جدا عن معدل الجرعة العلاجية المجربة على حيوانات المختبر ، لم تؤد إلى اظهار أيه دلالة على أن العقار له تأثير غير طبيعي على الجنين ، إلا أن النظريات الطبية الحالية لا تشجع على استعمال الليرجوديل في فترة الثلاثة أشهر الأولى من الحمل.

يجب ألا تستعمل الأمهات المرضعات الأليلرجوديل لأنه لا يوجد دليل كاف على سلامة استعمال العقار خلال فترة الرضاعة

التأثيرات الجانبية :

في حالات نادرة تحدث تهيجات في الغشاء المخاطي الملتهب للأنف عند الرش، مثل : لسع ، حكة و عطاس. وفي بعض الحالات قد يحدث للمريض نزف أنفي. في حالة الاستعمال غير الصحيح (الرأس مائل للخلف ، انظر تعليمات الجرعة و طريقة الاستعمال) ربما يحدث طعما مرا و الذي يمكن أن يؤدي أحيانا إلى الغثيان.

التفاعل مع الأدوية الأخرى :

غير معروف

تعليمات الجرعة، وكيف تستعمل الدواء و مدة العلاج:

مالم يصف لك الطبيب خلاف ذلك ، رش الدواء في كل فتحة أنف مرتين يوميا (يعادل جرعة يومية مقدارها ٠,٥٦ مليغرام أزيلاستين هايدروكلوريد)

رش الدواء و راسك في وضعه المنتصب (راجع : كيف تستعمل الليرجوديل) .

الليرجوديل يمكن استعماله حتى تزول الاعراض ، ولكن يجب عدم الاستمرار بالمعالجة لأكثر من (٦ أشهر) متتالية .

ملاحظة خاصة بالثباتية :

لا يحفظ في الثلاجة / يحفظ عند درجة حرارة اقل من ٢٥ °م

لا تستعمل الدواء بعد تاريخ انتهاء فترة الصلاحية على العبوة.

لا تستعمل الدواء لأكثر من (٦ أشهر) بعد فتح العلبة لأول مرة.

احفظ الأدوية بعيدا عن متناول الاطفال!

العبوة:

قارورة تحتوي على ١٠ مليلتر محلول .

الجهة المالكة المفوضة بالتسويق:

ميدا للصناعات الدوائية ذات المسؤولية المحدودة

بنزستراس ١

٦١٣٥٢ بادهمبورغ، ألمانيا

الجهة المصنعة:

ميدا للصناعات الدوائية ذات المسؤولية المحدودة

نيوراذر رينغ ١

٥١٠٦٣ كولون ، ألمانيا

"ان هذا دواء "

الدواء مستحضر و لكن ليس كغيره من المستحضرات.

الدواء يؤثر على صحتك وإستهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر

اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الإستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.

الطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وينفعه وضرره.

لاتقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.

لاتكرر صرف الدواء بدون إستشارة الطبيب.


كيف تستعمل الليرجوديل:

١ – أزل الغطاء الواقي.


٢ – قبل أول إستعمال ، اضغط المضخة عدة مرات إلى أن يصبح الرش الخارج منتظما.

٣ – رش في كل فتحة أنف مرة واحدة ورأسك في وضعه المنتصب.


٤ – إمسح ، وضع الغطاء الواقي.



الشكل ٣



الشكل ٢



الشكل ١

تاريخ الإصدار يناير ٢٠١١

T5005196
562202-5810ME01 C120