

3. COMMENT PRENDRE MAGNÉVIE B6® 100 mg/10 mg, comprimé pelliculé ?

Posologie

Chez l'adulte : 3 à 4 comprimés par jour à répartir en 2 ou 3 prises pendant les repas.

Chez l'enfant de plus de 6 ans (environ 20 kg) : 2 à 4 comprimés par jour à répartir en 2 ou 3 prises pendant les repas.

Si vous avez l'impression que l'effet de MAGNÉVIE B6® 100 mg/10 mg, comprimé pelliculé est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Mode d'administration

Voie orale.

Les comprimés sont à avaler tels quels avec un verre d'eau.

Fréquence d'administration

La dose journalière est à répartir de préférence en plusieurs prises avant ou au cours du repas.

Durée de traitement

En l'absence d'amélioration des symptômes au bout d'un mois de traitement, il n'est pas utile de le poursuivre.

Si vous avez pris plus de MAGNÉVIE B6® 100 mg/10 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû

Le surdosage de magnésium par voie orale n'entraîne pas, en général, de réactions toxiques en cas de fonctionnement normal du rein. L'intoxication au magnésium peut, toutefois, se développer en cas d'insuffisance rénale.

Si vous oubliez de prendre MAGNÉVIE B6® 100 mg/10 mg, comprimé pelliculé

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié de prendre.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, MAGNÉVIE B6® 100 mg/10 mg, comprimé pelliculé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet :

- diarrhées,
- douleurs abdominales,
- réactions cutanées,
- réactions allergiques.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER MAGNÉVIE B6® 100 mg/10 mg, comprimé pelliculé ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser MAGNÉVIE B6® 100 mg/10 mg, comprimé pelliculé après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Pas de précautions particulières de conservation.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR



MAGNÉVIE B6® 100 mg/10 mg

magnésium-vitamine B6

comprimé pelliculé

sanofi aventis

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que MAGNÉVIE B6® 100 mg/10 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre MAGNÉVIE B6® 100 mg/10 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre MAGNÉVIE B6® 100 mg/10 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver MAGNÉVIE B6® 100 mg/10 mg, comprimé pelliculé ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE MAGNÉVIE B6® 100 mg/10 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament contient du magnésium.

L'association d'un certain nombre des symptômes suivants peut évoquer un déficit en magnésium :

- nervosité, irritabilité, anxiété légère, fatigue passagère, troubles mineurs du sommeil,
- manifestations d'anxiété, telles que spasmes digestifs ou palpitations (cœur sain),
- crampes musculaires, fourmillements.

L'apport du magnésium peut améliorer ces symptômes. En l'absence d'amélioration de ces symptômes au bout d'un mois de traitement, il n'est pas utile de le poursuivre.

BTI CONTINU	Version	3	Type Article	Notice double	N° version Logo/Name	NA
créé le	09/11/2010	par	JY Prigent	N° plan Dimensionnel	1-606062c	sanofi aventis
modifié le	19/11/2010	par	JY Prigent	N° plan positionnement	606062-1c	Logo et nom de l'entité
Laboratoires	Sanofi-Aventis	Pays	France	Couleur Nbre/Ref.	4 Bleu 287U Bleu 300U Process BlueU Jaune 116U	Numéro de Pages
					9 pts	1 - 3

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE MAGNÉVIE B6® 100 mg/10 mg, comprimé pelliculé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais MAGNÉVIE B6® 100 mg/10 mg, comprimé pelliculé dans les cas suivants :

- allergie connue à l'un des constituants de ce médicament (voir « Que contient MAGNÉVIE B6® 100mg/10 mg, comprimé pelliculé »),
- insuffisance rénale sévère (défaillance des fonctions du rein).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec MAGNÉVIE B6® 100 mg/10 mg, comprimé pelliculé

Mises en garde

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

Une consommation à fortes doses de pyridoxine (ou vitamine B6) pendant une longue période (plusieurs mois, voire années) peut provoquer des fourmillements et des troubles de l'équilibre, des tremblements des mains et des pieds, et des difficultés dans la coordination des mouvements. Ces effets sont généralement réversibles à l'arrêt du traitement.

Précautions d'emploi

Le dosage n'est pas adapté pour les enfants de moins de 20 kg (environ 6 ans).

En cas d'insuffisance rénale modérée, des précautions sont à prendre, afin d'éviter le risque relatif à une augmentation du magnésium dans le sang.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, notamment des sels de phosphate ou de calcium, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

Grossesse et allaitement

Grossesse

L'utilisation de ce médicament peut être envisagée au cours de la grossesse si besoin, quel qu'en soit le terme.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de la poursuivre.

Allaitement

Il est recommandé de ne pas dépasser la dose de 20 mg/jour de vitamine B6 chez les femmes allaitant.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Liste des excipients à effet notoire

Lactose.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES.

Que contient MAGNÉVIE B6® 100 mg/10 mg, comprimé pelliculé ?

Les substances actives sont :

Magnésium 100 mg
sous forme de citrate de magnésium anhydre
Chlorhydrate de pyridoxine 10 mg
pour un comprimé pelliculé

Les autres composants sont :

Noyau : lactose anhydre, macrogol 6000, stéarate de magnésium.

Pelliculage : hypromellose, macrogol 6000, dioxyde de titane (E171), talc.

Qu'est-ce que MAGNÉVIE B6® 100 mg/10 mg, comprimé pelliculé et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimés pelliculés. Boîte de 60.

Titulaire et exploitant

sanofi-aventis France

1-13, boulevard Romain Rolland

75014 Paris – France

Information Patient : N° vert 0800 222 555

Appel depuis l'étranger : +33 1 57 63 23 23

Fabricant

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

60205 Compiègne - France

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est : Octobre 2010.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).

BTI COMPIÈGNE	Version	3	Type Article	Notice double	N° version Logo/Name	NA
créé le	09/11/2010	par	Nom du produit	MagnéVie B6	N° version Country Ex.	NA
modifié le	19/11/2010	par	Référence article	R761940	N° plan Dimensionnel	1-606062c
			Dosage	100 mg	Dimensions	606062-1c
			Quantité	cps	Taille mini caractères	150 x 210 mm
					9 pts	761940
Laboratoires	Sanofi-Aventis		Couleur	4	Bleu 287U	Code
Pays	France		Nbre/Ref.		Bleu 300U	Numéro de Pages

sanofi-aventis
L'essentiel pour la santé

R761940 - NOT MAGNE VIE B6 100MG 60CP FR

Plant: COMPIEGNE - FRANCE
Packaging material code: R761940
Packaging material name: NOT MAGNE VIE B6 100MG 60CP
FR
Second packaging material code:
VISTAlink folder number: 662302
VISTAlink PDF version: 4

This document has been digitally signed by the following people within the VISTAlink system, following the sanofi-aventis group guidelines.

Reason	Signed by	Date
Market regulatory validation	Sophie CHAUVEAU (France regulatory team)	29/11/2010 11:32:45
Market regulatory validation 2	Sophie CHAUVEAU (France regulatory team)	29/11/2010 11:33:23
Plant final technical validation	Celine Flatet (Compiègne Change Service (Ofloxacin, Levofloxacin, Lasix, Solupred, MagnéB6, Idarac))	29/11/2010 11:38:07
Plant ready to print	Celine Flatet (Compiègne Change Service (Ofloxacin, Levofloxacin, Lasix, Solupred, MagnéB6, Idarac))	30/11/2010 15:49:18