

LEAFLET PREGADEX CAPSULES

بريجاديكس

بريجاديكس ٧٥ ملجم
بريجاديكس ١٥٠ ملجم
بريجاديكس ٣٠٠ ملجم
بريجاباين

قم بقراءة هذه النشرة جيدا قبل تناول هذا الدواء.

- احتفظ بهذا النشرة، فقد تحتاج إليها لاحقاً.
- في حال كان لديك أي أسئلة تتعلق بهذا المستحضر قم باستشارة الطبيب أو الصيدلي.
- إن هذا الدواء قد تم صرفه خصيصاً لك بناء على وصفة طبية، ولهذا يجب عليك عدم إعطائه لأي شخص فقد تسبب له الأذى حتى وإن كان هذا الشخص يعاني من نفس الأعراض التي سبق وأن عانيت منها.
- قم بالاتصال بطبيبك أو الصيدلي في حال زيادة حدة الأعراض الجانبية أو الإصابة بعرض جانبي لم يتم ذكره في هذه النشرة.

تحتوي هذه النشرة على:

- ١- ما هو بريجاديكس وما هي دواعي استعماله.**
- ٢- قبل القيام بتناول بريجاديكس**
- طريقة استخدام بريجاديكس.**
- الأعراض الجانبية.**
- حذوف تخزين بريجاديكس.**
- معلومات إضافية.**

- ١- ما هو بريجاديكس وما هي دواعي استعماله.**

ينتمي **بريجاديكس** إلى مجموعة من الأدوية تستخدم للألمابين في حالة علاج الصرع، ألم الاعتلال العصبي واضطراب القلق المتعمم.

ألم الاعتلال العصبي الطرفي (المركزي): إن **بريجاديكس** يستخدم في علاج حالات الألم المستمر الناتج عن تلف في الأعصاب. إذ أن هناك الكثير من الأسباب التي قد تؤدي إلى حصول ألم الاعتلال العصبي الطرفي مثل السكري أو الهربس الشفائي، ويُسعر المريض بألم يمكن وصفه بأنه حار، حارق، نابض، بارق، طعن، جاد، تشنج، وجع، وخز، تمول، إر أو دبابس. كما أنه قد يصاحب ألم الاعتلال العصبي الطرفي و اضطرابات في المزاج، عدم انتظام في النوم، التعب (الإرهاق)، كما أنه قد يؤثر على وظائف المريض الجسدية والنفسية كما أنه قد يؤثر على نوعية الحياة بشكل عام عند المريض.

الصرع: يمكن استخدام **بريجاديكس** لعلاج شكل محدد من الصرع (نوبات الصرع الجزئية تعميم ناجم عنه أو بدونه) عند البالغين. إن طبيبك سوف يقوم بوصفه لك كعلاج إضافي للعلاج الذي تتناوله حالياً في حالة أن العلاج الحالي لنوبات الصرع التي تعاني منها غير كافٍ للسيطرة عليها. إن **بريجاديكس** لا يصرف وحده كعلاج لهذه الحالات، بل يترجّب دائماً تناوله بمصاحبة أدوية علاج نوبات الصرع الأخرى.

اضطراب القلق المتعمم: كما إن **بريجاديكس** يوصف كعلاج لحالات اضطرابات القلق المتعمم. تشمل أعراض اضطرابات القلق المتعمم زيادة القلق والتوتر واستمراره لفترات طويلة يصعب السيطرة عليها. كما أن اضطرابات القلق المتعمم قد تسبب أيضاً التمدل والإحساس بالقيء أو الغثيبة، الشعور بالتعب و (الإرهاق بسهولة، صعوبة التركيز أو النسيان، سرعة التهيج، وجود تشنج عضلي أو عدم انتظام النوم. وهذه الأعراض تختلف عن الضغوط والتوترات الناتجة عن الحياة اليومية.

- ٢- قبل القيام بتناول بريجاديكس.**

مواعٍ تناول بريجاديكس (التأق) من مادة بريجاباين أو لأي من مكونات **بريجاديكس** الأخرى.

- **الاحتياطات عند تناول بريجاديكس**
- بريجاباين له مريضى ضمن هذه الفئة المعرّية.
- سجل في حالة بعض المرضى لدى تناولهم مادة بريجاباين حدوث أعراض تدل على حدوث تفاعل فرط تحسس. شملت هذه الأعراض تورم في الوجه، الشفاه، اللسان، والحنجرة، كما سجل ظهور طفح جلدي منتشر، في حالة ظهور مثل هذه الأعراض عليك، يجب عليك مراجعة طبيبك فوراً.
- قد يصاحب تناول **بريجاديكس** شعور بالدوخة والغثاس والتي قد تزيد من احتمالية الإصابة نتيجة السقوط في حالة المرضي كبار السن. لذلك يجب أن توخى الحذر لحين التعود على أي تأثير قد يصاحب هذا الدواء.
- قد يسبب تناول **بريجاديكس** حدوث ضبابية في الرؤية أو فقدان للإبصار، أو أي تغير في القدرة على الإبصار، معظم هذه التغيرات يكون مؤقتة. إذا شعرت بأي تغير في ذلك على الإبصار أثناء تناول **بريجاديكس** يوجب عليك مراجعة طبيبك فوراً.
- في حالة بعض مرضى السكري الذين قد تحدث زيادة في الوزن لديهم تبين تناول **بريجاديكس** قد يحتاجون إلى إجراء تعديل في أوزينهم المخفضة للسكر في الدم.

- قد تزداد احتمالية ظهور بعض الأعراض الجانبية مثل الغثاس في حالة المرضى الذين يعانون من إصابات في الشغاع الشوكي بسبب تناولهم أدوية أخرى مثل مضادات الألم والتشنج، التي تكون تأثيراتها الجانبية مماثلة لتأثيرات **بريجاديكس**، لذلك تزداد حدة هذه الأعراض عند تناول **بريجاديكس** مع هذه الأدوية بشكل متزامن.
- سجل حدوث حالات قصور في القلب عند تناول مادة بريجاباين في حالة بعض المرضى كبار السن والذين يعانون من اضطرابات قلبية وعائية. لذا يجب عليك أن تخبر طبيبك **معال قبل تناول هذا الدواء إذا كنت تعاني من مشاكل في القلب.**

- ورد في بعض التقارير - حدوث قصور في وظائف الكلى عند بعض المرضى لدى تناولهم مادة بريجاباين. إذا لاحظت حدوث شح في البول لديك أثناء تناول **بريجاديكس**، يجب عليك أن تخبر طبيبك طالما أن البول يعود لطبيعته عند التوقف عن تناول **بريجاديكس**.
- في حالات محدودة لدى بعض المرضى الذين يعانون بأدوية للصرع مشابهة **لفريجاديكس** تكون أفكار لديهم يقل أو يذآه الضمير. إذا تكونت لديك مثل هذه الأفكار في أي وقت قم باستشارة طبيبك على الفور.
- عند تناول **بريجاديكس** بشكل متزامن مع أدوية أخرى تسبب الإصابة بالإسكاس (مثل بعض أنواع أدوية الألم) فمن المحتمل حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي (مثل الإسكاس) استداد أو قمل (الأمعاء). أخير طبيبك في حالة إصابتك بالإسكاس، خصوصاً إذا كنت ممن يعانون بمشكلة الإسكاس بشكل متكرر.
- قبل تناول هذا الدواء يجب عليك إخبار طبيبك إذا كان قد سبق أن أصبت بالإدمان على الكحول أو الأدوية. كما يجب عليك أن تخبر طبيبك إذا شعرت أنك محتاج لدواء أكثر من الموصوف.
- سجل في بعض الحالات حدوث تشنجات أثناء تناول بريجاباين أو خلال فترة قصيرة بعد التوقف عن تناوله. إذا أصبت بمثل هذه التشنجات قم باستشارة طبيبك على الفور.
- سجل في بعض الحالات حدوث انخفاض في وظائف الدماغ (اعتلال دماغي) عند تناول بريجاباين في حالة بعض المرضى الذين يعانون من مشاكل صحية أخرى، قبل تناول هذا الدواء يتوجب عليك إخبار طبيبك إذا كان لديك تاريخ مرضي لحذوت مشاكل صحية خطيرة، يشمل ذلك امراض الكبد والكلى.
- قد يسبب هذا الدواء مشاكل خطيرة و مهددة للحياة أو قد تكون قاتلة بوظائف الجهاز التنفسي. قد تزداد خطورة حدوث ذلك عند استخدام هذا الدواء بالتزامن مع المواد الأفيونية وغيرها من مثبثات الجهاز العصبي المركزي، وإيضاً مع حالات مثل مرض الاسداد الرئوي المزمن. المرضى من كبار السن أيضاً هم أكثر عرضة لحدوث ذلك. يجب أن يتصاحب طبيبك المعالج بيده هذا الدواء بأقل جرعة ومراقبة أعراض تدور ووظائف الجهاز التنفسي أو الغثاس لديك عند تناولك لأي من مشتقات الأفيون أو مثبثات الجهاز العصبي المركزي الأخرى (مثل التيزودازينبيات). إذا كنت تعاني أساساً من مرض تنفسي أو كنت مريضاً مسناً، فأتأ أيضاً معرض لخطر متزايد ويجب متابعة حالتك بنسبى الطريقة.

التفاعلات الدوائية من أخذ هذا الدواء مع أي أدوية أو أعشاب أو مكملات غذائية:

- قبل تناول أي دواء آخر مع **بريجاديكس** يتوجب عليك إخبار طبيبك بذلك. فضلاً أخبر الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو قد تناولت مؤخراً أي دواء آخر يشمل ذلك الأدوية التي تصرف بدون وصفة.
- قد تحدث بعض التفاعلات الدوائية وذلك عند تناول **بريجاديكس** بشكل متزامن مع بعض الأدوية؛ حيث أن تناول **بريجاديكس** مع هذه الأدوية قد يؤدي إلى زيادة التأثيرات الجانبية الناتجة عن تناول هذه الأدوية، و قد يشمل ذلك حدوث قصور تنفسي وغيرهية. كما أن حدة الدوخة والغثاس وقلة التركيز الناتجة عن **بريجاديكس** قد تزداد عند تناول **بريجاديكس** مع أدوية تحتوي على:
 - أوكسيكودون (يستخدم كمضاد للألم).
 - لوزازيبام (يستخدم لعلاج القلق).
 - الكحول.

المواد الأفيونية ومثبثات الجهاز العصبي المركزي قد يحدث تدور حاد في وظائف الجهاز التنفسي لديك عند تناول بريجاباين بالتزامن مع المواد الأفيونية ومثبثات الجهاز العصبي المركزي مثل تيزودازينين. لذلك يجب أن يراقب طبيبك المعالج أعراض تدور الجهاز التنفسي لديك أو التعرض للغثاس إذا كنت بحاجة إلى استخدام مشتقات الأفيون أو مثبثات الجهاز العصبي المركزي بالتزامن مع هذا الدواء

يمكن استخدام **بريجاديكس** بشكل متزامن مع أدوية منع الحمل التي يتم إعطائها عن طريق الفم.

تناول بريجاديكس مع الطعام والشراب:

يمكن تناول كبسولات **بريجاديكس** مع الطعام أو بدونه.

بوصى بعدم تناول الكحول أثناء تناول **بريجاديكس**.

الحمل والرضاعة:

- إذا كنت حاملاً ، أو تعتقدين أنك حامل ، يجب عليك إخبار طبيبك على الفور وناقشي المخاطر المحتملة التي قد يسببها الدواء الذي تتناوليه لطفلك الذي لم يولد بعد.
- إذا كنت تخطئين للحمل ، فعليك مناقشة علاجك مع طبيبك في أقرب وقت ممكن قبل الحمل.
- لا توقفي عن العلاج دون مناقشة هذا الأمر مع طبيبك.

الحمل

لا ينبغي أن يؤخذ بريجاباين أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية ، ما لم يخبرك طبيبك بخلاف ذلك. يجب أن نستخدم النساء في سن الإنجاب وسائل منع الحمل الفعالة. كانت هناك أبحاث محدودة تبحث على وجه التحديد استخدام بريجاباين في النساء الحوامل. أشارت دراسة حديثة إلى أن النساء اللاتي تناولن عقار بريجاباين أثناء الحمل قد يكون لديهن فرصة أكبر قليلاً في ولادة طفل مصاب بتشوهات جسدية في الولادة. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم وإبلاخ أفضل عن سلامة استخدام بريجاباين أثناء الحمل وما إذا كان مرتبطاً بزيادة خطر (الحاق الضرر بالجنين ما لا.

الرضاعة الطبيعية

يفرز بريجاباين عن حليب الثدي ولا ينبغي تناوله أثناء الرضاعة الطبيعية ما لم يخبرك طبيبك بخلاف ذلك. أسأل طبيبك أو الصيدلي للحصول على المشورة قبل تناول أي دواء.

تأثير بريجاديكس على القيادة واستخدام الآلات:

قد يسبب تناول **بريجاديكس** حدوث دوخة، غثاس، نعاس وقلة في التركيز. لذا يتوجب عليك تجنب القيادة، استعمال الآلات أو القيام بأي عمل فيه خطورة إلى أن تأكدك من أن حدة الدواء لا يحدث مثل هذه التأثيرات عندك.

معلومة عامة حول بعض مكونات بريجاديكس

يحتوي **بريجاديكس** على لاكوز. استشر طبيبك قبل تناول هذا الدواء، إذا كان قد أخبرك سابقاً بأنك تعاني من مشكلة عدم التحمل لبعض أنواع السكر.

- ٣- طريقة استخدام بريجاديكس**

دائماً يتوجب عليك تناول **بريجاديكس** حسب الجرعة الموصوفة من قبل طبيبك، لا يتوجب عليك استشارة طبيبك أو الصيدلي في حالة عدم تأكدك من الجرعة.

إن طبيبك سوف يقوم بتحديد الجرعة المناسبة لك.

ألم الاعتلال العصبي المركزي والطرفي، الصرع، اضطراب القلق المتعمم:

تناول عدد الكبسولات تماماً كما وصفه الطبيب لك.

إن طبيبك سيتم تحديدها بما يتناسب مع حالتك وتراوح عادة بين ١٥٠ ملجم و ٦٠٠ ملجم يوميا.

إن طبيبك سوف يخبرك إن تناول **بريجاديكس** إما مرتين أو ثلاث مرات يوميا. في حالة أنه أخبرك أن تتناولها مرتين، تناول كبسولة **بريجاديكس** واحدة صباحاً وواحدة مساءً يوميا وفي نفس الوقت تقريبا. في حالة أنه قد وصفه لك ثلاث مرات يوميا تناول كبسولة **بريجاديكس** واحدة صباحاً وواحدة بعد الظهر والثالثة عند المساء يوميا وفي نفس الوقت تقريبا.

إذا شعرت أن تأثير **بريجاديس** أقوى أو أضعف من المطلوب، أخبر طبيبك أو الصيدلي.

إذا كنت مريضاً كبير السن (أكبر من ٦٥ سنة)، تناول **بريجاديكس** بشكل اعتيادي (لا إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى).

في حالة المرضى الذين يعانون من مشاكل في الكلى قد يصف الطبيب هذا الدواء بنظام أو جرعة مختلفة عن الجرعات الاعتيادية.

إلغ الكبسولة كاملة كما هي مع كمية كافية من الماء.

استمر بتناول **بريجاديكس** كما وصف لك إلى أن يطلب منك الطبيب التوقف عن تناوله.

الجرعة الزائدة من بريجاديكس

لا تتناول طبيبك أو إذهب إلى أقرب وحدة طوارئ في الحال. خذ عليه كبسولات **بريجاديكس** معك. قد تشعر بالغثاس، الارتباك، الهياج وعدم الارتياح عند تناولك جرعة زائدة من **بريجاديكس**.

نسيان تناول جرعة من بريجاديس

من المهم جداً تناول كبسولات **بريجاديكس** بانتظام و في نفس التسيان يوميا. في حالة نسيان جرعة من **بريجاديس** تناول هذه الجرعة فور تذكرك، إلا إذا كان ذلك في وقت الجرعة التالية في هذه الحالة خذ الجرعة التالية فقط وأكمل كالمعتاد. لا تتناول جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة التي نسيته.

التوقف عن تناول بريجاديكس

لا توقف عن تناول **بريجاديكس** ما لم يطلب طبيبك منك ذلك. وفي هذه الحالة يتوجب عليك التوقف عن تناول **بريجاديس** بشكل تدريجي على مدى أسبوع واحد كحد أدنى. إذا كانت لديك أية اضطرابات إضافية حول هذا الدواء فقللاً استشر طبيبك أو الصيدلي.

بعد التوقف عن العلاج سواء أكان العلاج لفترات طويلة أو قصيرة بواسطة بريجاباين، قد تصاب ببعض الأعراض الجانبية التي تشتمل على: اضطراب في النوم، الصداع، الغثاس، الشعور بالتوتر، الإسهال، أعراض شبيهة بالزكام، التشنجات، الغثيبة، الانتصاب، الألم، التحرق، والدوخة. و لا توجد معلومات إلى الآن عما إذا كانت هذه الأعراض ستكون أكثر حدوثاً أو شدة إذا كان المريض قد تناول بريجاباين لفترات طويلة.

- ٤- الأعراض الجانبية**

كما هو الحال في جميع الأدوية، فإن تناول **بريجاديكس** قد يصاحبه ظهور بعض الأعراض الجانبية والتي ليس

بالضرورة أن تظهر عند كل من يتناول **بريجاديس**.

أعراض جانبية شائعة جدا (١٥/ ١٠):

- الدوخة، التعب.
- أعراض جانبية شائعة (> ١٥ / ١٥) ١٥/ ١٥):
- زيادة الشهية.
- الإحساس بالنشوة، الارتباك، التوهان، اضطرابات في الاهتمام الجنسي، التهيج.
- اختلال في التركيز و المهارة، ضعف الذاكرة، الرعاش، صعوبة في الكلام، الإحساس بالغثوز، التخدير والخمول، الأرق، التعب.
- ضبابية الرؤية، ازدواج الرؤية.
- الدوار، مشاكل في التوازن.
- جفاف الفم، الإسكاس، القيء،، والانتفاخ
- صعوبة الانتصاب.
- تورم الجسم يشمل ذلك الأطراف.
- شعور بالثقل، اختلال طريقة المشي.
- زيادة في الوزن.

أعراض جانبية غير شائعة (> ١٥/ ١٠٠ ١٥/ ١٥٠):

- فقدان الشهية، انخفاض سكر الدم.
- تغير النظرة إلى الذات، عدم الارتياح، الاكتئاب، هياج، تراجع المزاج، صعوبة إيجاد الكلمات، فقدان الذاكرة، هلوسة، أحلام غير طبيعية، الشعور بالهلع، خمول، الإحساس بالإختلال، اضطرابات في الوظائف الجنسية تشمل عدم القدرة على الوصول إلى حزة الجماع، تأخر القذف.
- عدم القدرة على التفكير، شمل، نعرات في البصر، حركة غير طبيعية للعين، حركات قنصية، انخفاض المنعكسات، زيادة في النشاط، دوخة عند الوقوف، تحسس الجلد، حاسة الذئوق، إحساس بالحرقان، رجفة في الحركة، انخفاض الوعي، إغماء، زيادة الحساسية تجاه الضوضاء.
- جفاف العينين، تورم العينين، ألم العينين، ضعف العينين، و التثمع.
- اضطراب نظم القلب، زيادة سرعة القلب، انخفاض ضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم.
- احمرار الوجه، تورودات ساخنة.
- صعوبة في التنفس، التهاب الحلق، جفاف الألف.
- تورم لطيف، زيادة إفراز الغاباب، حوة القلاء، تقلد حول الفم.
- التحرق، طفح، التهشيرة.
- ارتفاع الغضلائ، تورم المفاصل، تشنج عضلي، تيس عضلي، ألم يشمل ألم العضلات، ألم الظهر، ألم في الأطراف.
- صعوبة أو ألم عند التبول، عسر التبول.
- ضعف، سقوط عطش، خفق في الصدر.
- تغيرات في نتائج فح اختبارات الدم ووظائف الكبد (زيادة فسفوكيناز كراتين الدم، زيادة ألأمين أمينو ترانسفيريز، زيادة أسباريت أمينو ترانسفيريز، نقص الصفائح الدموية).

أعراض جانبية نادرة (> ١٥/ ١٠٠٠)

- تورعرات في ضربة القلب.
- برودة الأيدي والأقدام.
- السعال، احتقان الأنف، سيلان الأنف، الرعاف، شخير.
- اختلال في حاسة السب، اضطراب في الإبصار بما في ذلك الرؤية النفقية، تذبذب الإبصار، تحسس العمق البصري المتغير، وجع الضوء، يهر البصر.
- توسع الحدقة، حلق راسي، تهيج العينين.
- الحمى، الحرقان في فمق الحنجرة.
- التهاب الكبد، الكيراس.
- صعوبة في البلع.
- قلة النشاط أو ضعف الحركة.
- عسر الكتانة.
- شري.
- زيادة السوائل في البطن.
- الحلال العضلات.
- ألم عتقي.
- ألم الثدي، إفراز الثدي، تضخم الثدي، ألم أو اضطراب في الدورة الشهرية.
- ارتفاع مستوى سكر الدم.
- فقدان الوزن.
- ارتفاع المزاج.
- الفشل الكلوي، شح البول.
- تورعرات في نتائج فح اختبارات الدم (نقص بوتاسيوم الدم، زيادة كراتينيت الدم، نقص عدد كريات الدم البيضاء بما في ذلك العدلات).
- اضطراب السكول.

هذا وقد سجلت آثار جانبية أخرى بعد أن تم استخدام بريجاباين على المرضى تشمل هذه الآثار الجانبية قصور القلب، تغيرات في قيم التخطيط الكهربائي للقلب(ECG) مما يدل على حدوث اختلالات في نظم القلب، الاستشفاء الرئوي، فقدان الوعي، التشنجات، تفاعلات فرط التحسس التأق (قد تشتمل هذه التفاعلات على تورم الوجه، تورم اللسان، صعوبة التنفس، الحككة، تهيج العينين، التهاب القرنية)، فقدان الإبصار، و حدوث تفاعل تدملي خطير يتميز بحدوث طفح، غثاس، تشنج الجلد وألم)، اعتلال عقلي، غثف، حصر بول، إسهال، صداع، غثيان، وإحساس بالمرض.

في حالة إصابتك بتورم في الوجه أو اللسان أو تغير لون جلدك إلى الأحمر وظهرت نقط عليه أو بدأ بتقشر يجب عليك مراجعة الطبيب فوراً.

قد تزداد احتمالية ظهور بعض الأعراض الجانبية مثل الغثاس في حالة المرضى الذين يعانون من إصابات في الشغاع الشوكي بسبب تناولهم أدوية أخرى مثل مضادات الألم والتشنج، والتي تكون تأثيراتها الجانبية مثل تأثيرات بريجاباين، لذلك تزداد حدة هذه الأعراض عند تناول **بريجاديس** مع هذه الأدوية بشكل متزامن.

إذا ازدادت شدة إحدى هذه الأعراض، أو أصبت بأية أعراض جانبية أخرى لم تذكر في هذه النشرة، أخبر طبيبك المعالج أو الصيدلي.

- ٥- ظروف تخزين بريجاديس**

لا يحفظ في درجة حرارة أعلى من ٣٠ درجة مئوية.

يحفظ بعيداً عن متناول ونظر الأطفال.

- ٦- معلومات إضافية**

ما هي محتويات بريجاديس؟

المادة الفعالة: بريجاباين. كل كبسولة تحتوي على ٧٥ ملجم، ١٥٠ ملجم، ٣٠٠ ملجم بريجاباين.

المكونات الأخرى: لاكوز، نشا، تالك، نقي، جيلاتين.

ما هو الشكل الصيدلاني لمستحضر بريجاديسكس ووصفه وجرعته:

كبسولة **بريجاديسكس** ٧٥ ملجم هي مقاس رقم ٣، كبسولة جيلاتينية صلبة لها غطاء معتم لونه أصفر إلى أصفر فاتح والجسم يحتوي على مسحوق أبيض إلى مائل للبياض. الكبسولة مطبوعة بـ **PREGADEX 75mg** على كلا الجانبين.

كبسولات **بريجاديسكس** ١٥٠ ملجم هي مقاس رقم ٣، كبسولة جيلاتينية صلبة لها غطاء معتم لونه برتقالي والجسم يحتوي على مسحوق أبيض إلى مائل للبياض. الكبسولة مطبوعة بـ **PREGADEX 150mg** على كلا الجانبين.

كبسولات **بريجاديسكس** ٣٠٠ ملجم هي مقاس رقم "0el"، كبسولة جيلاتينية صلبة لها غطاء معتم لونه بني فاتح والجسم يحتوي على مسحوق أبيض إلى مائل للبياض. الكبسولة مطبوعة بـ **PREGADEX 300mg** على كلا

الجانبين.

تحتوي كل عبوة على ٣٠٠ كبسولة.

مالك الحقوق النشوية والصنع

الدوائية

مصنع الأدوية بالقصيم

المملكة العربية السعودية

تمت آخر مراجعة لهذه النشرة بتاريخ مايو ٢٠٢٢.

النسخة: ١.

"بريجاديسكس" علامة تجارية 34PGA36

للإبلاغ عن الأعراض الجانبية

المملكة العربية السعودية:

المركز الوطني للتنبذق الدوائي:

مركز الاتصال الموحد: ١٩٩٩٩

البريد الإلكتروني: npc.drug@sda.gov.sa

الموقع الإلكتروني: https://ade.sda.gov.sa

الإمارات العربية المتحدة

• قسم التبظق الدوائي والأجهزة الطبية

• الصئوق البريدي: ١٨٥٣

• هاتف: ٨٠١١١١١١

• البريد الإلكتروني: pv@mohap.gov.ae

• قسم الدواء، وزارة الصحة والوقاية

• دبي، الإمارات العربية المتحدة.

سلطنة عُمان

• دائرة التبظق والمعلومات الدوائية

• المديرية العامة للصئدة والوقاية الدوائية

• هاتف: ٠٠٩٦٨٢٢٣٠٥٧١٨٦

• فاكس: ٠٠٩١٨٥٢٢٣٠٥٨٤٩٨

• البريد الإلكتروني: dg-pado@moh.gov.om

• الموقع الإلكتروني: www.moh.gov.om

الأردن:

• المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية

• الموقع الإلكتروني: jfda.com

• البريد الإلكتروني: jpc@jfda.jo

• هاتف: ٠٠٩٢٢٠٦-٠٩٢٢٠٠

• رابط الإبلاغ: https://primaryreporting.who.ume.org.jo

• رمز الإستجابة السريع



إن هذا الدواء

- الدواء مستحضر يؤثر عل صحتك واستهلاكه خلافاً لتعليمات عرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستخدام المصصوب عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- فاقطع الصئدالني لها مخيران بالدواء وبتفعه وخزوره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال

مجلس وزراء الصحة العرب
وأنحاد الصئدة العرب