سبيماكو الدوائية
SPIMACO ADDWAEIH

LEAFLET PREGADEX CAPSULES

بريجاديكس®

بريجاديكس ٧٥ ملجم
بريجاديكس ١٥٠ ملجم
بريجاديكس ٣٠٠ ملجم
بريجابالين

قم بقراءة هذه النشرة جيدا قبل تناول هذا الدواء.
- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج إليها لاحقا.
- في حال كان لديك أي أسئلة تتعلق بهذا المستحضر قم باستشارة الطبيب أو الصيدلي.
- إن هذا الدواء قد تم صرفه خصيصا لك بناء على وصفة طبية، ولهذا يجب عليك عدم إعطائه لأي شخص فقد تسبب له الأذى حتى وإن كان هذا الشخص يعاني من نفس الأعراض التي سبق وأن عانيت منها.
- قم بالاتصال بطبيبك أو الصيدلي في حال زيادة حدة الأعراض الجانبية أو الإصابة بعرض جانبي لم يتم ذكره في هذه النشرة.

تحتوي هذه النشرة على:

١- **ما هو بريجاديكس و ما هي دواعي استعماله.**
٢- **قبل القيام بتناول بريجاديكس.**
٣- **طريقة استخدام بريجاديكس.**
٤- **الأعراض الجانبية.**
٥- **ظروف تخزين بريجاديكس.**
٦- **معلومات إضافية.**

١- ما هو بريجاديكس و ما هي دواعي استعماله.

ينتمي **بريجاديكس** إلى مجموعة من الأدوية تستخدم للبالغين في حالة علاج الصرع، ألم الاعتلال العصبي و اضطراب القلق المتعمم.

ألم الاعتلال العصبي الطرفي والمركزي: إن **بريجاديكس** يستخدم في علاج حالات الألم المستمر الناتج عن تلف في الأعصاب. إذ أن هناك الكثير من الأسباب التي قد تؤدي إلى حصول ألم الاعتلال العصبي الطرفي مثل السكري أو الهرپس النطاقي. ويشعر المريض بألم يمكن وصفه بأنه حار، حارق، نابض، بارق، طعن، حاد، تشنج، وجع، وخز، تنمل، إبر أو دبابيس. كما أنه قد يصاحب ألم الاعتلال العصبي الطرفي و المركزي اضطرابات في المزاج، عدم انتظام في النوم، التعب (الإرهاق)، كما أنه قد يؤثر على وظائف المريض الجسدية والنفسية كما أنه قد يؤثر على نوعية الحياة بشكل عام عند المريض.

الصرع: يمكن استخدام **بريجاديكس** لعلاج شكل محدد من الصرع (نوبات الصرع الجزئية بتعميم ناجم عنه أو بدونه) عند البالغين. إن طبيبك سوف يقوم بوصفه لك كعلاج إضافي للعلاج الذي تتناوله حاليا في حالة أن العلاج الحالي لنوبات الصرع التي تعاني منها غير كافي للسيطرة عليها. إن **بريجاديكس** لا يصرف وحده كعلاج لهذه الحالات، بل يتوجب دائما تناوله بمصاحبة أدوية علاج نوبات الصرع الأخرى.

اضطراب القلق المتعمم: كما إن **بريجاديكس** يوصف كعلاج لحالات اضطرابات القلق المتعمم. تتمثل أعراض اضطرابات القلق المتعمم بزيادة القلق والتوتر واستمراره لفترات طويلة بصعب السيطرة عليها. كما أن اضطرابات القلق المتعمم قد تسبب أيضا التململ والإحساس بالضيق أو العصبية، الشعور بالتعب و الإرهاق بسهولة، صعوبة التركيز أو النسيان، سرعة التهيج، وجود تشنج عضلي أو عدم انتظام النوم. وهذه الأعراض تختلف عن الضغوط والتوترات الناتجة عن الحياة اليومية.

٢- قبل القيام بتناول بريجاديكس.

موانع تناول بريجاديكس

إذا كنت تعاني من فرط التحسس (التأق) من مادة بريجابالين أو لأي من مكونات **بريجاديكس** الأخرى.

الاحتياطات عند تناول بريجاديكس

لم تتم دراسة أمان وفعالية بريجابالين على الأطفال والمراهقين (تحت سن ١٨ سنة)، وعليه يجب تجنب إعطاء بريجابالين للمرضى ضمن هذه الفئة العمرية.

- سجل في حالة بعض المرضى لدى تناولهم مادة بريجابالين حدوث أعراض تدل على حدوث تفاعل فرط تحسس. شملت هذه الأعراض تورم في الوجه، الشفاه، اللسان، والحنجرة، كما سجل ظهور طفح جلدي منتشر، في حالة ظهور مثل هذه الأعراض عليك، يجب عليك مراجعة طبيبك فورا.
- قد يصاحب تناول **بريجاديكس** شعور بالدوخة والنعاس والتي قد تزيد من احتمالية الإصابة نتيجة السقوط في حالة المرضى كبار السن. لذلك يجب أن تتوخى الحذر لحين التعود على أي تأثير قد يصاحب هذا الدواء.
- قد يسبب تناول **بريجاديكس** حدوث ضبابية في الرؤية أو فقدان للإبصار، أو أي تغير في القدرة على الإبصار، معظم هذه التغيرات يكون مؤقتا. إذا شعرت بأي تغير في قدرتك على الإبصار أثناء تناول **بريجاديكس** يتوجب عليك مراجعة طبيبك فورا.
- في حالة بعض مرضى السكري الذين قد تحدث زيادة في الوزن لديهم نتيجة تناول **بريجاديكس** قد يحتاجون إلى إجراء تعديل في أدويتهم المخفضة للسكر في الدم.
- قد تزداد احتمالية ظهور بعض الأعراض الجانبية مثل النعاس في حالة المرضى الذين يعانون من إصابات في النخاع الشوكي بسبب تناولهم أدوية أخرى مثل مضادات الألم والتشنج، التي تكون تأثيراتها الجانبية مماثلة لتأثيرات **بريجاديكس**، لذلك تزداد حدة هذه الأعراض عند تناول **بريجاديكس** مع هذه الأدوية بشكل متزامن.
- سجل حدوث حالات قصور في القلب عند تناول مادة بريجابالين في حالة بعض المرضى كبار السن والذين يعانون من اضطرابات قلبية وعائية. **لذا يجب عليك أن تخبر طبيبك المعالج قبل تناول هذا الدواء إذا كنت تعاني من مشاكل في القلب.**
- ورد في بعض التقارير حدوث قصور في وظائف الكلى عند بعض المرضى لدى تناولهم مادة بريجابالين. إذا لاحظت حدوث شح في التبول لديك أثناء تناول **بريجاديكس**، يجب عليك أن تخبر طبيبك طالما أن التبول يعود لطبيعته عند التوقف عن **بريجاديكس**.
- سجل في حالات محدودة لدى بعض المرضى الذين يعالجون بأدوية للصرع مشابهة **لبريجاديكس** تكون أفكار لديهم بقتل أو إيذاء أنفسهم. إذا تكونت لديك مثل هذه الأفكار في أي وقت قم باستشارة طبيبك على الفور.
- عند تناول **بريجاديكس** بشكل متزامن مع أدوية أخرى تسبب الإصابة بالإمساك (مثل بعض أنواع أدوية الألم) فمن المحتمل حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي (مثل الإمساك، انسداد أو شلل الأمعاء). أخبر طبيبك في حالة إصابتك بالإمساك، خصوصا إذا كنت ممن يصابون بمشكلة الإمساك بشكل متكرر.
- قبل تناول هذا الدواء يتوجب عليك إخبار طبيبك إذا كان قد سبق أن أصبت بالإدمان على الكحول أو الأدوية. كما يجب عليك أن تخبر طبيبك إذا شعرت أنك محتاج لدواء أكثر من الموصوف.
- سجل في بعض الحالات حدوث تشنجات أثناء تناول بريجابالين أو خلال فترة قصيرة بعد التوقف عن تناوله. إذا أصبت بمثل هذه التشنجات قم باستشارة طبيبك على الفور.
- سجل في بعض الحالات حدوث انخفاض في وظائف الدماغ (اعتلال دماغي) عند تناول بريجابالين في حالة بعض المرضى الذين يعانون من مشاكل صحية أخرى. قبل تناول هذا الدواء يتوجب عليك إخبار طبيبك إذا كان لديك تاريخ مرضي لحدوث مشاكل صحية خطيرة، يشمل ذلك أمراض الكبد والكلى.
- قد يسبب هذا الدواء مشاكل خطيرة و مهددة للحياة أو قد تكون قاتلة بوظائف الجهاز التنفسي. قد تزداد خطورة حدوث ذلك عند استخدام هذا الدواء بالتزامن مع المواد الأفيونية وغيرها من مثبطات الجهاز العصبي المركزي، وأيضاً مع حالات مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن. المرضى من كبار السن أيضاً هم أكثر عرضة لحدوث ذلك. يجب أن ينصحك طبيبك المعالج ببدء هذا الدواء بأقل جرعة ومراقبة أعراض تدهور وظائف الجهاز التنفسي أو النعاس لديك عند تناولك لأي من مشتقات الأفيون أو مثبطات الجهاز العصبي المركزي الأخرى (مثل البنزوديازيبينات). إذا كنت تعاني أساساً من مرض تنفسي أو كنت مريضاً مسناً، فأنت أيضاً معرض لخطر متزايد ويجب متابعة حالتك بنفس الطريقة.

التداخلات الدوائية من أخذ هذا الدواء مع أي أدوية أو أعشاب أو مكملات غذائية:

قبل تناول أي دواء آخر مع **بريجاديكس** يتوجب عليك إخبار طبيبك بذلك. فضلا أخبر الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو قد تناولت مؤخرا أي دواء آخر يشمل ذلك الأدوية التي تصرف بدون وصفة.

قد تحدث بعض التداخلات الدوائية وذلك عند تناول **بريجاديكس** بشكل متزامن مع بعض الأدوية؛ حيث أن تناول **بريجاديكس** مع هذه الأدوية قد يؤدي إلى زيادة التأثيرات الجانبية الناتجة عن تناول هذه الأدوية، و قد يشمل ذلك حدوث قصور تنفسي وغيبوبة. كما أن حدة الدوخة والنعاس وقلة التركيز الناتجة عن **بريجاديكس** قد تزداد عند تناول **بريجاديكس** مع أدوية تحتوي على:
- أوكسيكودون (يستخدم كمضاد لألم).
- لورازيبام (يستخدم لعلاج القلق).
- الكحول.
- المواد الأفيونية ومثبطات الجهاز العصبي المركزي

قد يحدث تدهور حاد في وظائف الجهاز التنفسي لديك عند تناول بريجابالين بالتزامن مع المواد الأفيونية ومثبطات الجهاز العصبي المركزي مثل بنزوديازيبين. لذلك، يجب أن يراقب طبيبك المعالج أعراض تدهور الجهاز التنفسي لديك أو التعرض للنعاس إذا كنت بحاجة إلى استخدام مشتقات الأفيون أو مثبطات الجهاز العصبي المركزي بالتزامن مع هذا الدواء.

يمكن استخدام **بريجاديكس** بشكل متزامن مع أدوية منع الحمل التي يتم إعطاءها عن طريق الفم.

تناول بريجاديكس مع الطعام والشراب:

يكمن تناول كبسولات **بريجاديكس** مع الطعام أو بدونه.

يوصى بعدم تناول الكحول أثناء تناول **بريجاديكس**.

الحمل والرضاعة:
- إذا كنت حاملاً ، أو تعتقدين أنك حامل ، يجب عليك إخبار طبيبك على الفور وناقشي المخاطر المحتملة التي قد يسببها الدواء الذي تتناوليه لطفلك الذي لم يولد بعد.
- إذا كنت تخططين للحمل ، فعليك مناقشة علاجك مع طبيبك في أقرب وقت ممكن قبل الحمل.
- لا تتوقفي عن العلاج دون مناقشة هذا الأمر مع طبيبك.

الحمل

لا ينبغي أن يؤخذ بريجابالين أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية ، ما لم يخبرك طبيبك بخلاف ذلك. يجب أن تستخدم النساء في سن الإنجاب وسائل منع الحمل الفعالة.

كانت هناك أبحاث محدودة تبحث على وجه التحديد استخدام بريجابالين في النساء الحوامل.

أشارت دراسة حديثة إلى أن النساء اللاتي تناولن عقار بريجابالين أثناء الحمل قد يكون لديهن فرصة أكبر قليلاً في ولادة طفل مصاب بتشوهات جسدية في الولادة. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم وإبلاغ أفضل عن سلامة استخدام بريجابالين أثناء الحمل وما إذا كان مرتبطًا بزيادة خطر إلحاق الضرر بالجنين ام لا.

الرضاعة الطبيعية

يفرز بريجابالين مع حليب الثدي ولا ينبغي تناوله أثناء الرضاعة الطبيعية ما لم يخبرك طبيبك بخلاف ذلك. اسأل طبيبك أو الصيدلي للحصول على المشورة قبل تناول أي دواء.

تأثير بريجاديكس على القيادة واستعمال الآلات:

قد يسبب تناول **بريجاديكس** حدوث دوخة، نعاس وقلة في التركيز. لذا يتوجب عليك تجنب القيادة، استعمال الآلات أوالقيام بأي عمل فيه خطورة إلى أن تتأكد من أن هذا الدواء لا يحدث مثل هذه التأثيرات عندك.

معلومة هامة حول بعض مكونات بريجاديكس :

يحتوي **بريجاديكس** على لاكتوز. امتنر طبيبك قبل تناول هذا الدواء، إذا كان قد أخبرك سابقا بأنك تعاني من مشكلة عدم التحمل لبعض أنواع السكر.

٣- طريقة استخدام بريجاديكس

دائما يتوجب عليك تناول **بريجاديكس** حسب الجرعة الموصوفة من قبل طبيبك، لذا يتوجب عليك استشارة طبيبك أو الصيدلي في حالة عدم تأكدك من الجرعة.

إن طبيبك سوف يقوم بتحديد الجرعة المناسبة لك.

ألم الاعتلال العصبي المركزي والطرفي، الصرع، اضطراب القلق المتعمم:

تناول عدد الكبسولات تماما كما وصفه الطبيب لك.

إن الجرعة سيتم تحديدها بما يتناسب مع حالتك وتتراوح عادة بين ١٥٠ ملجم و ٦٠٠ ملجم يوميا.

إن طبيبك سوف يخبرك أن تتناول **بريجاديكس** إما مرتين أو ثلاث مرات يوميا. في حالة أنه أخبرك أن تتناولها مرتين، تناول كبسولة **بريجاديكس** واحدة صباحا وواحدة مساء يوميا وفي نفس الوقت تقريبا. في حالة أنه قد وصفه لك ثلاث مرات يوميا تناول كبسولة **بريجاديكس** واحدة صباحا وواحدة بعد الظهر والثالثة عند المساء يوميا وفي نفس الوقت تقريبا.

إذا شعرت أن تأثير **بريجاديكس** أقوى أو أضعف من المطلوب، أخبر طبيبك أو الصيدلي.

إذا كنت مريضا كبير السن (أكبر من ٦٥ سنة)، تناول **بريجاديكس** بشكل اعتيادي إلا إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى.

في حالة المرضى الذين يعانون من مشاكل في الكلى قد يصف الطبيب هذا الدواء بنظام أو جرعة مختلفة عن الجرعات الاعتيادية.

إبلع الكبسولة كاملة كما هي مع كمية كافية من الماء.

استمر بتناول **بريجاديكس** كما وصف لك إلى أن يطلب منك الطبيب التوقف عن تناوله.

الجرعة الزائدة من بريجاديكس

اتصل بطبيبك أو إذهب إلى أقرب وحدة طوارئ في الحال. خذ علبة كبسولات **بريجاديكس** معك. قد تشعر بالنعاس، الارتباك، الهياج وعدم الارتياح عند تناولك جرعة زائدة من **بريجاديكس**.

نسيان تناول جرعة من بريجاديكس

من المهم جدا تناول كبسولات **بريجاديكس** بانتظام و في نفس الوقت يوميا. في حالة نسيان جرعة من **بريجاديكس** تناول هذه الجرعة فور تذكرها إلا إذا كان ذلك في وقت الجرعة التالية في هذه الحالة خذ الجرعة التالية فقط و أكمل كالمعتاد. لا تتناول جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة التي نسيتها.

التوقف عن تناول بريجاديكس

لا تتوقف عن تناول **بريجاديكس** ما لم يطلب طبيبك منك ذلك. وفي هذه الحالة يتوجب عليك التوقف عن تناول **بريجاديكس** بشكل تدريجي على مدى أسبوع واحد كحد أدنى. إذا كانت لديك أية استفسارات إضافية حول هذا الدواء فضلا استشر طبيبك أو الصيدلي.

بعد التوقف عن العلاج سواء أكان العلاج لفترات طويلة أو قصيرة بواسطة بريجابالين، قد تصاب ببعض الأعراض الجانبية التي تشتمل على: اضطراب في النوم، الصداع، الغثيان، الشعور بالتوتر، الإسهال، أعراض شبيهة بالزكام، التشنجات، العصبية، الاكتئاب، الألم، التعرق، و الدوخة. و لا توجد معلومات إلى الآن عما إذا كانت هذه الأعراض ستكون أكثرحدوثا أو شدة إذا كان المريض قد تناول بريجابالين لفترات طويلة.

٤- الأعراض الجانبية

كما هو الحال في جميع الأدوية، فإن تناول **بريجاديكس** قد يصاحبه ظهور بعض الأعراض الجانبية والتي ليس بالضرورة أن تظهر عند كل من يتناول **بريجاديكس**.

أعراض جانبية شائعة جدا (≤١/ ١٠):
- الدوخة، التعب.

أعراض جانبية شائعة (≤١/ ١٠ و ≤١/ ١٠٠):
- زيادة الشهية.
- الإحساس بالنشوة، الارتباك، التوهان، اضطربات في الاهتمام الجنسي، التهيج.
- اختلال في التركيز و المهارة، ضعف الذاكرة، الرعاش، صعوبة في الكلام، الإحساس بالوخز، التخدير والخمول، الأرق، التعب.
- ضبابية الرؤية، ازدواج الرؤية.
- الدوار، مشاكل في التوازن.
- جفاف الفم، الإمساك، القيء، و الانتفاخ.
- صعوبة الانتصاب.
- تورم الجسم يشمل ذلك الأطراف.
- شعور بالثمل، اختلال طريقة المشي.
- زيادة في الوزن.

أعراض جانبية غير شائعة (≤١/ ١٠٠ و ≤١/ ١٠٠٠):
- فقدان الشهية، انخفاض سكر الدم.
- تغير النظرة إلى الذات، عدم الارتياح، الاكتئاب، هياج، تأرجح المزاج، صعوبة إيجاد الكلمات، فقدان الذاكرة، هلوسة، أحلام غير طبيعية، الشعور بالهلع، خمول، الإحساس بالاختلال، اضطربات في الوظائف الجنسية تشمل عدم القدرة على الوصول إلى هزة الجماع، تأخر القذف.
- صعوبة في التفكير، تنمل، تغيرات في البصر، حركة غير طبيعية للعين، حركات نفضية، انخفاض المنعكسات، زيادة في النشاط، دوخة عند الوقوف، تحسس الجلد، فقدان حاسة التذوق، إحساس بالحرقان، رجفة في الحركة، انخفاض الوعي، إغماء، زيادة الحساسية تجاه الضوضاء.
- جفاف العينين، تورم العينين، ألم العينين، ضعف العينين، و التدمع.
- اضطراب نظم القلب، زيادة سرعة القلب، انخفاض ضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم.
- احمرار الوجه، نوردات ساخنة.
- صعوبة في التنفس، التهاب الحلق، جفاف الأنف.
- تورم البطن، زيادة إفراز اللعاب، حرقة الفؤاد، تخدر حول الفم.
- التعرق، طفح، القشعريرة.
- ارتعاص العضلات، تورم المفاصل، تشنج عضلي، تيبس عضلي، ألم يشمل ألم العضلات، ألم الظهر، ألم في الأطراف.
- صعوبة أو ألم عند التبول، عسر التبول.
- ضعف، سقوط، عطش، ضيق في الصدر.
- تغيرات في نتائج قيم اختبارات الدم ووظائف الكبد (زيادة فسفوكيناز كرياتين الدم، زيادة ألانين أمينو ترانسفيريز، زيادة أسبارتيت أمينو ترانسفيريز، نقص الصفيحات الدموية).

أعراض جانبية نادرة (≤١/ ١٠٠٠)
- تغيرات في ضربة القلب.
- برودة الأيدي والأقدام.
- السعال، احتقان الأنف، سيلان الأنف، الرعاف، شخير.
- اختلال في حاسة الشم، اضطراب في الإبصار بما في ذلك؛ الرؤية النفقية، تذبذب الإبصار، تحسس العمق البصري المتغير، وهج الضوء، بهر البصر.
- توسع الحدقة، حول إنسي، تهيج العينين.
- الحمى، العرق البارد، ضيق الحنجرة.
- التهاب البنكرياس.
- صعوبة في البلع.
- قلة النشاط أو ضعف الحركة.
- عسر الكتابة.
- شري.
- زيادة السوائل في البطن.
- انحلال العضلات.
- ألم عنقي.
- ألم الثدي، إفراز الثدي، تضخم الثدي، ألم أو اضطراب في الدورة الشهرية.
- ارتفاع مستوى سكر الدم.
- فقدان الوزن.
- ارتفاع المزاج.
- الفشل الكلوي، شح البول.
- تغيرات في نتائج قيم اختبارات الدم (نقص بوتاسيوم الدم، زيادة كرياتينين الدم، نقص عدد كريات الدم البيضاء بما في ذلك العدلات).
- اضطراب السلوك.

هذا وقد سجلت آثار جانبية أخرى بعد أن تم استخدام بريجابالين على المرضى تشمل هذه الآثار الجانبية قصور القلب، تغيرات في قيم التخطيط الكهربائي للقلب(EGG) مما يدل على حدوث اختلالات في نظم القلب، الاستسقاء الرئوي، فقدان الوعي، التشنجات، تفاعلات فرط التحسس التأق (قد تشتمل هذه التفاعلات على تورم الوجه، تورم اللسان، صعوبة التنفس، الحكة، تهيج العينين (التهاب القرنية)، فقدان الإبصار، و حدوث تفاعل جلدي خطير يتميز بحدوث طفح، نفط، تقشر الجلد وألم)، اعتلال عقلي، عنف، حصر بول، إسهال، صداع، غثيان، و إحساس بالمرض.

في حالة إصابتك بتورم في الوجه أو اللسان، أو تغير لون جلدك إلى الأحمر و ظهرت نفط عليه أو بدأ يتقشر يجب عليك مراجعة الطبيب فورا.

قد تزداد احتمالية ظهور بعض الأعراض الجانبية مثل النعاس في حالة المرضى الذين يعانون من إصابات في النخاع الشوكي بسبب تناولهم أدوية أخرى مثل مضادات الألم والتشنج، والتي تكون تأثيراتها الجانبية مثل تأثيرات بريجابالين، لذلك تزداد حدة هذه الأعراض عند تناول **بريجاديكس** مع هذه الأدوية بشكل متزامن.

إذا ازدادت شدة إحدى هذه الأعراض، أو أصبت بأية أعراض جانبية أخرى لم تذكر في هذه النشرة، أخبر طبيبك المعالج أو الصيدلي.

٥- ظروف تخزين بريجاديكس

لا يحفظ في درجة حرارة أعلى من ٣٠ درجة مئوية.

يحفظ بعيداً عن متناول ونظر الاطفال.

٦- معلومات إضافية

ما هي محتويات بريجاديكس؟

المادة الفعالة: بريجابالين. كل كبسولة صلبة تحتوي على ٧٥ ملجم، ١٥٠ ملجم، ٣٠٠ ملجم بريجابالين.

المكونات الأخرى: لاكتوز، نشاء، تالك نقي، جيلاتين.

ما هو الشكل الصيدلاني لمستحضر بريجاديكس ووصفه وحجم عبوته:

كبسولة **بريجاديكس** ٧٥ ملجم هى مقاس رقم ٣، كبسولة جيلاتينية صلبة لها غطاء معتم لونه أصفر إلى أصفر فاتح والجسم يحتوي على مسحوق أبيض إلى مائل للبياض. الكبسولة مطبوعة بـ «PREGADEX 75mg» على كلا الجزئين.

كبسولات **بريجاديكس** ١٥٠ ملجم هى مقاس رقم ٢، كبسولة جيلاتينية صلبة لها غطاء معتم لونه برتقالي والجسم يحتوي على مسحوق أبيض إلى مائل للبياض. الكبسولة مطبوعة بـ «PREGADEX 150mg» على كلا الجزئين.

كبسولات **بريجاديكس** ٣٠٠ ملجم هى مقاس رقم "0el"، كبسولة جيلاتينية صلبة لها غطاء معتم لونه بني فاتح والجسم يحتوي على مسحوق أبيض إلى مائل للبياض. الكبسولة مطبوعة بـ «PREGADEX 300mg» على كلا الجزئين.

تحتوي كل عبوة على ٣٠ كبسولة.

مالك الحقوق التسويقية و المصنع

الدوائية

مصنع الأدوية بالقصيم

المملكة العربية السعودية

تمت آخر مراجعة لهذه النشرة بتاريخ مايو ٢٠٢٢. **النسخة: ١.**

«بريجاديكس» علامة تجارية

34PGA36

للإبلاغ عن الأعراض الجانبية

المملكة العربية السعودية:
-المركز الوطني للتيقظ الدوائي:
مركز الإتصال الموحد: ١٩٩٩٩
البريد الإلكتروني: npc.drug@sfda.gov.sa
الموقع الإلكتروني: https://ade.sfda.gov.sa

الإمارات العربية المتحدة
- قسم التيقظ الدوائي والأجهزة الطبية
- الصندوق البريدي: ١٨٥٣
- هاتف: ٨٠٠١١١١١
- البريد الإلكتروني: pv@mohap.gov.ae

قسم الدواء، وزارة الصحة والوقاية دبي، الإمارات العربية المتحدة.

سلطنة عُمان
- دائرة التيقظ والمعلومات الدوائية
- المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية
- وزارة الصحة، سلطنة عمان
- هاتف: ٠٠٩٦٨٢٢٣٥٧٨٧/٠٠٩٦٨٢٢٣٥٧٦٨٦
- فاكس: ٠٠٩٦٨٥٢٢٣٥٨٤٨٩
- البريد الالكتروني: dg-padc@moh.gov.om
- الموقع الالكتروني: www.moh.gov.om

الأردن:
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية
- الموقع الالكتروني: Jfda.com
- البريد الالكتروني: jpc@jfda.jo
- هاتف: ٠٠٩٦٢-٦-٥٦٣٢٠٠٠+
- رابط الابلاغ : https://primaryreporting.who.umc.org/JO
- رمز الإستجابة السريع

إن هذا الدواء
- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- فالطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وبنفعه وضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال

مجلس وزراء الصحة العرب
واتحاد الصيادلة العرب