

كلافوكس[®]

نشرة العبوة: معلومات لمستخدم الدواء

كلافوكس

أقراص مغلفة بطبقة رقيقة 1 جم
أموكسيسيلين و حمض كلابيولاتيك

اقرأ كل ما يهذ الشرة مباعته قبل أن تتناول هذا الدواء.

* احتفظ بهذه الشرة، قد تحتاج إلى فرمها أخرى.

* إذا كان لديك أي أستلة إضافية، أسل طبيك المعالج أو الصيدلي الذي تعامل معه.

* هذا الدواء تم وصفه لك. لا تطعم الآخرين. قد يضرهم حتى لو كانت أعراضهم هي نفس

* أعراض.

* إذا لاحظت أن أيًّا من الأثار الجانبية لهذا الدواء أصبحت جسيمة، أو لاحظت ظهور أي أعراض

جسيمة تزيد عن هذه النشرة، فضلاً اخبر طبيك المعالج أو الصيدلي الذي تعامل معه.

هذه الشرة تحتوي على ما يلي:

1. ما هو كلافوكس وفيم يستخدم

2. ما يجب مراعاته قبل تناول كلافوكس

3. كيفية تناول أقراص كلافوكس

4. الأعراض الجانبية محتملة الخطورة

5. كيفية حفظ كلافوكس

6. معلومات إضافية

1. ما هو كلافوكس وفيما يستخدم

ما هو كلافوكس هو مضاد حيوى ويعمل عن طريق قتل البكتيريا التي تسبب العدوى. وهو يحتوى على

دواون خفيفين هما أموكسيسيلين وحمض كلابيولاتيك. أموكسيسيلين يتمي بجموعة من الأدوية تسمى (سيسللين) والتي قد تؤثر على أحد عملها في بعض الأوقات (تحول إلى غير فاعله). و

المكون الثاني (حمض كلابيولاتيك) يتمتع بحدوث هذه التغير.

يستخدم كلافوكس في البالغين والأطفال للعلاج المدوى التالية:

-التهاب الأذن الوسطى والتهاب الأغشية الأنفية البكتيرى.

-عدوى الجهاز التنفسى.

-عدوى المسالك البولية.

-عدوى الجلد والأنسجة الرخوة وتشمل عدوى الأنسان.

-عدوى العظام والغضارب.

2. ما يجب مراعاته قبل تناول كلافوكس

لتناول كلافوكس في الحالات التالية

• إذا كان لديك حساسية زائدة تجاه أموكسيسيلين أو حمض كلابيولاتيك أو بيسيللين أو أي مكون

آخر من مكونات كلافوكس (المذكورة في الفقرة 6).

• إذا تعرضت في أي وقت من الأوقات إلى تناول حساسية حاد تجاه أي مضاد حيوى آخر.

يجب ذلك على طبيبك أو أسر طفلك إلىوجه أرقه.

• إذا تعرضت في أي وقت من الأوقات إلى مشاكل في الكبد أو الصفراء (إفراجار الجلد) عند تناول

مضاد حيوى.

لاتناول كلافوكس إذا كان أي من السمات ذكره ينطبق عليك. إذا لم تكن متاكداً تحدث إلى طبيبك أو

الصيدلي قبل تناول كلافوكس.

يتحقق تجربة المدرن مع كلافوكس في الحالات التالية:

تحتوى على طبيبك أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء في الحالات التالية:

• إذا كان لديك تهاب في الكبد أو الكل.

• إذا كنت تناولت لصالح مشاكل في الكبد أو الكل.

تم رصد حالات نادرة من اطالة غير طبيعية في وقت البروثيرومبين (زيادة INR) في المرضى الذين

يستخدمون أموكسيسيلين ومضادات البكتيرى. ولذلك ينصح باستخدام ضروري لمواصلة المستوي المطلوب من معقول

مقدار المطلوب.

إذا لم تكن متاكداً أن أي من السمات ذكره ينطبق عليك من نوع التكبيرى السببه للعدوى، وبناء على النتائج قد

يتحقق تجربة المدرن مع كلافوكس في الحالات التالية:

في بعض الأحيان قد يتحقق الطبيب بالتحليل من نوع التكبيرى السببه للعدوى، وبناء على النتائج قد

يتحقق تجربة المدرن وفقاً لبيانات المختبر.

• إذا كنت سوف تقوم بعمل تحليل للدم (مثل حالة خلايا الدم الحمراء أو وظائف الكبد) أو تحليل البول

(المسكري مثلاً) أخبر طبيبك أو الممرضة أنت تتناول كلافوكس. فقد ينثر كلافوكس في نتائج هذه

الحالات.

الحالات التي تحتاج إلى مرأة مرتين

كلافوكس قد ينبع بعد الحالات السابقة من تناوله أو التعرض لها دون وصفة طبية.

• إذا كنت تتناول أدوية البروبيروبيون (العلاج الفموي) قد ينبع عليك مرأة بعض الأعراض عند تناول

حساسية جلدية.

• إذا كنت تناول دواء يساعد على وقف تجلط الدم مثل (أفاردين) مع كلافوكس فربما تحتاج إلى تناول

ماء إضافي.

• إذا كنت تناول كلافوكس في طريقة عمل ميثوتريكسات (دواء العلاج السرطان أو الأمراض الروماتيزمية).

• قد ينثر كلافوكس عن طريقة عمل ميكوفينولات موفييل (دواء يستخدم لمنع رفض الجسم

الحمل والولادة.

فضلأً أخبر طبيبك إذا كنت أو تعتقد أنك حامل أو ترضعن طفلك طبيعياً.

إسأل طبيبك أو الصيدلي التفصيلى قبل تناول أي دواء.

الحياة واستخدام الألات.

قد ينبع كلافوكس لأعراض جلدية أو أعراض تجعلك غير مؤهل للقيادة. لذلك لا تقدوا أو تستخدم

الآلات إلا إذا شعرت أنك بصحبة جيدة.

3. كيفية تناول أقراص كلافوكس

قم دائمًا بتناول أقراص كلافوكس تمامًا كما تأدى تجربتك الطبيب المعالج، إذا كنت غير قادر على تجربة

من خلال الطبيب أو الصيدلي.

البالغين والأطفال.

تجربة طبيبك هي

أقصى حد من تناول كلافوكس.

أبلغ القرص كاملاً مع كوب من الماء مع بداية الوجبة أو قبلها بقليل.

يمكنك كسر القرص عن طريق الحفاظ على زجاجة سهولة ابتساعه. ويجب أخذ النصفين في نفس

الوقت.

لا تتناول كلافوكس لأكثر من أسبوعين. إذا كنت لا زلت تشعر بأنك لست بصحة جيدة يجب

زيارة طبيبك.

إذا تناولت كلافوكس أكثر مما ينصح به

إذا تناولت كلافوكس أكثر مما ينصح به

الشعور بالإعياء أو الإسهال أو الشتفات. تحدث إلى طبيبك يناسع وقت ممكن.خذ عدوة

الدواء لتزويده طبيبك.

إذا تناولت كلافوكس حرجاً

إذا تناولت كلافوكس حرجاً

لا تتناول كلافوكس حتى تعاوده عندما تذكر.

• لا تتناول كلافوكس طرفة عين.

• لا تتناول كلافوكس طرفة عين.

إذا تناولت كلافوكس طرفة عين.

دام على تناول كلافوكس حتى نهاية العلاج حتى لو شعرت بحسن. لأنك تحتاج كل جرعة للمساعدة

في القضاء على العدوى. لأن بعض البكتيريا قد تسبب عدوة مرة أخرى.

إذا كان لديك أي أستلة إضافية عن استخدام هذا الدواء. اسأل طبيبك أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية محتملة الخطورة

مثل بآلام الأذن، كلافوكس قد يسبب أعراض جانبية، وإن لم تكن حدثت لكل من تناول هذا الدواء.

يتحقق تجربة المدرن عن تناولات الحساسية وال حالات المحسنة.

• طفح جلدي.

• التهاب الأذن والأنف.

أجزاء أخرى من الجسم.

• حمى أو ألم في المفاصل أو تورم الغدد في الرقبة أو الخد.

• تورم أعينا في الوجه أو العين مما يسبب صعوبة في التفسير.

• إعماق.

اتصل بطبيك فورا إذا لاحظت أي من هذه الأعراض وتوقف عن تناول كلافوكس.

التهاب الأمعاء الغليظة مما يسبب إسهال مائي عادة مع دم و مخاط وألم في المعدة مع / أو حمى.

التهاب الأمعاء الغليظة مما يسبب إسهال مائي عادة مع دم و مخاط وألم في المعدة مع / أو حمى.

أعراض جانبية شائعة جداً

قد تؤثر في أكثر من 1 في كل 10 أشخاص

• إسهال (في البالغين)

أعراض جانبية شائعة

قد تؤثر في حتى 1 في كل 100 شخص

• مرض جلدي - عدوى حبيرة في المهل أو الفم أو ثنيا الجلد)

• الشعور بالإعياء (غثيان) خصوصا عند تناول جرعات عالية

إذا تناولت كلافوكس قبل الأكل

• قيء

• إسهال (في الأطفال)

أعراض جانبية غير شائعة

قد تؤثر في حتى 1 في كل 1000 شخص

• زيادة في بعض إنزيمات الكبد.

أعراض جانبية نادرة

قد تؤثر في حتى 1 في كل 1000 شخص

• تغاثيات حادة

أعراض جانبية حدثت في عدد قليل جداً من الأشخاص ولكن تردها غير معروفة.

• تفاعلات حساسية

أعراض جانبية شديدة

أعراض جانبية تؤثر في الكبد

أعراض جانبية تؤثر في المعدة

أعراض جانبية تؤثر في العين

• إطالة وقت التزيف و وقت بروثرومبين (الفقرة 2 ما يجب مراعاته قبل تناول كلافوكس)

• تفاعلات حساسية

• تغاثيات حادة

أنت الأدوية في متاجر أيدي الأطفال

شكلي وذرا الصحة العرب

وأحادي الصيادة العرب

أعلان العبوة: معلومات الأدوية