

xefo 8 mg
Comprimés pelliculés

Principe actif: Lornoxicam

Composition

1 comprimé pelliculé contient 8 mg de lornoxicam ainsi que les principes suivants: stéarate de magnésium, polyvidone K 25, croscarmellose sodique, cellulose, lactose, macrogol, dioxyde de titane, talc, hypromellose.

Forme pharmaceutique

Comprimés pelliculés

Conditionnement

10, 20, 30, 50, 100, 250 comprimés

Effets thérapeutiques

« Les comprimés pelliculés XEFO 8 mg ont quel effet? »

XEFO est un médicament analgésique et anti-inflammatoire.

Détenteur de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant

NYCOMED Austria GmbH, Linz

Indications thérapeutiques

« Quand utilise-t-on les comprimés pelliculés XEFO 8 mg? »

Traitement de courte durée de douleurs d'intensité légère à modérée associées à des inflammations.

Traitement de maladies articulaires rhumatismales et d'inflammation des articulations.

Contre-indications

« Ne pas prendre les comprimés pelliculés XEFO 8 mg dans les cas suivants: »

- hypersensibilité / allergie connues aux composants de la préparation, à l'acétylsalicylique acide (aspirine) et à d'autres médicaments analgésiques ou anti-inflammatoires,
- saignements gastro-intestinaux aigus, ulcères de l'estomac et de l'intestin grêle actifs,
- perturbations de l'hématopoïèse,
- états avec diathèse hémorragique élevée,
- cirrhose du foie
- insuffisances cardiaques graves,
- affectations des reins graves,
- grossesse,
- allaitement,
- patients de moins de 18 ans.

Précautions d'emploi

« Mise en garde: ce médicament peut altérer la réactivité et l'aptitude à participer à la circulation. » 

Ceci est valable en particulier lorsque XEFO est pris avec de l'alcool. Il est donc recommandé d'éviter la prise de boissons alcoolisées pendant le traitement au XEFO.

Signaler une grossesse immédiatement au médecin traitant. Ne pas laisser à la portée des enfants!

Les comprimés pelliculés XEFO 8 mg ne peuvent être administrés qu'avec des précautions particulières dans les cas suivants:

- maladie hépatique
- affection des reins ou fonction rénale limitée,
- saignements gastro-intestinaux ou ulcères de l'estomac et de l'intestin grêle antécédents,
- patients ayant une faiblesse cardiaque légère à modérée,
- « lupus érythémateux systématisque » (maladie de la peau congénitale).

Comme pour les autres médicaments anti-inflammatoires, le traitement au XEFO

cardiaques et insuffisance cardiaque), - traitement avec des bêtabloquants (médicament pour le traitement de l'hypertension ou de maux cardiaques), - traitement à la cyclosporine (médicament pour empêcher le rejet d'organes transplantés), - traitement avec inhibiteurs de l'ECA (médicament antihypertenseur).

Posologie, mode d'administration et durée du traitement

Posologie:

« Combien prendre de comprimés pelliculés XEFO 8 mg? »

Douleurs d'intensité légère à modérée associées à des inflammations:

La posologie quotidienne recommandée est de 8 – 16 mg, soit de préférence 1 comprimé pelliculé XEFO 8 mg 1 – 2 fois par jour.

La dose quotidienne maximale s'élève à 16 mg.

Respecter exactement la dose prescrite par votre médecin.

Traitement des maladies articulatoires rhumatismales et des inflammations des articulations:

La posologie quotidienne recommandée est de 12 – 16 mg/jour, soit de préférence 1 comprimé pelliculé XEFO 8 mg 2 fois par jour. Pour les traitements prolongés, la dose quotidienne maximale recommandée est de 16 mg.

Respecter exactement la dose prescrite par le médecin.

Posologie pour les personnes âgées:

Il n'est pas nécessaire d'ajuster la dose pour les personnes âgées pour autant que les fonctions rénale ou hépatique ne soient pas insuffisantes. Si c'est le cas, réduire la dose quotidienne. Respecter exactement la dose prescrite par le médecin.

Posologie pour les patients aux fonctions rénale ou hépatite insuffisantes:

Pour les patients ayant une fonction rénale ou hépatique insuffisante, la posologie quotidienne recommandée maximale est de 12 mg, soit de préférence 1 comprimé pelliculé XEFO 4 mg 3 fois par jour.

Mode d'emploi:

Avaler les comprimés pelliculés XEFO 8 mg avec un verre de liquide avant les repas.

Durée du traitement:

« Combien de temps prendre les comprimés pelliculés XEFO 8 mg? »

Votre médecin se charge de vous l'indiquer. Demandez régulièrement à votre médecin et suivez exactement ses consignes en matière de régime, mode de vie et exercice physique.

Surdosage: si vous avez pris accidentellement trop de comprimés pelliculés XEFO 8 mg:

Bien que nous n'ayons pas connaissance d'intoxication aiguë au Lornoxicam, on peut s'attendre à ce que les symptômes et douleurs évoqués dans les « effets secondaires » apparaissent amplifiés.

En cas de surdosage réel ou supposé, il faut arrêter de prendre le médicament et consulter immédiatement un médecin.

Que devez-vous faire si vous avez oublié accidentellement de prendre votre médicament:

Si vous avez oublié accidentellement de prendre votre médicament, ne prenez en aucun cas une double dose la fois suivante, mais poursuivez le traitement comme prescrit.

Immunitaires, le traitement au XEFO peut entraîner des ulcères et saignements de l'estomac et de l'intestin grêle. En cas de saignements gastro-intestinaux, arrêter le traitement au XEFO.

Il est important de faire aussi attention dans le cas de patients à maladies gastro-intestinales qui reçoivent pour la première fois un traitement au XEFO. Informez votre médecin si vous ressentez des douleurs dans l'estomac et l'intestin.

Pour l'utilisation du XEFO, pensez que les patients sujets à des infections chroniques des voies respiratoires, à de l'asthme bronchique, à un gonflement des muqueuses nasales ou au rhume des foins peuvent développer plus facilement des réactions d'hypersensibilité.

En cas de traitement prolongé au XEFO, il est recommandé de faire régulièrement contrôler l'hémogramme ainsi que les fonctions hépatique et rénale.

Veuillez respecter le contrôle prescrit par votre médecin.

Interactions

« Quels médicaments peuvent avoir une influence sur leurs effets ou effets secondaires mutuels? »

Il peut y avoir une interaction médicamenteuse entre les comprimés pelliculés XEFO 8 mg et d'autres médicaments. Si vous deviez consulter un autre médecin (généraliste ou spécialiste), pensez que vous deviez lui indiquer que vous prenez du XEFO.

Evitez les associations suivantes avec le XEFO:

- traitement avec des substances anti-coagulantes,
 - traitement au méthotrexate (médicament inhibant la multiplication des cellules),
- Faites particulièrement attention si vous suivez parallèlement les traitements suivants:
- traitement avec des médicaments anticoagulants ou pour l'hémodilution,
 - traitement du diabète par comprimés,
 - traitement avec d'autres médicaments analgésiques ou anti-inflammatoires,
 - traitement avec des médicaments diurétiques,
 - traitement au lithium de maladies psychiques,
 - traitement à la cimétidine (médicament diminuant la production d'acide gastrique),
 - traitement au digoxin (médicament pour le traitement de certaines arythmies

comme prescrit.

Effets secondaires

« Quels effets indésirables, ne touchant certes pas tous les patients, peuvent avoir les comprimés pelliculés XEFO 8 mg? » Les effets secondaires les plus fréquents sont les maux de ventre et les troubles digestifs.

Effets secondaires rares:

Mauvaise tête, vertiges, modification de l'appétit, somnolence, transpiration, perte de poids, œdèmes, anémie, saignements cutanés, palpitations cardiaques, diarrhée, nausées, vomissements, dysphagie, flatulence, constipation, sécheresse buccale, inflammation des muqueuses buccales, régurgitations acides, ulcères gastriques avec ou sans saignement, réactions cutanées allergiques, démangeaisons de la peau, chute des cheveux, dyspnée, crampes musculaires, douleurs musculaires, migraines, troubles sensitifs (picotements, fourmillements), modifications gustatives, bourdonnements d'oreille, tremblements, dépression, troubles du sommeil, conjonctivite, troubles oculaires.

Effets secondaires isolés:

Réactions allergiques, faiblesse, prise de poids, saignements prolongés, modifications de la tension artérielle, inflammation de l'œsophage, saignements hémorroïdaux ou saignements rectaux, irritations des voies respiratoires supérieures, troubles de la miction.

Remarque concernant la date de péremption et le stockage

« Comment conserver les comprimés pelliculés XEFO 8 mg? »

Pour les emballages de 10, 20, 30, 50 et 100 comprimés (en emballage thermoformé)

Conserver à moins de 25° C! Conserver à l'abri de l'humidité!

Pour les emballages de 250 comprimés (en flacon)

Conserver à moins de 25° C! Conserver à l'abri de l'humidité!

Garder bien fermé!

Voir la date de péremption indiquée sur l'étiquette. Une fois cette date dépassée, ne plus prendre les comprimés pelliculés XEFO 8 mg.

En cas d'incertitudes, consulter un spécialiste.

7815353
990177 ①
Code 1332

 **NYCOMED**