

سابوفين

توقف عن تناول سابوفين - **جنيور معلق** واطلب المساعدة الطبية الفورية إذا واجهت:

- علامات التهاب السحايا الممثل مع الصداع الشديد، وارتفاع درجة الحرارة، وتصلب الرقبة أو عدم تحلل الضوء

• علامات تليف معوي مثل:

- مروركل براز سوداء.
- مروركل براز سواد.

- في أي كمية من الدم أو الكتل الدائكة والتي تشبه لون قاع القهوة.

فضلاً أخبر طبيبك وتوقف عن تناول سابوفين - **جنيور معلق إذا واجهت:**

- آلم غير مبرر في المعدة (آلم في البطن) أو غيرها من الأعراض غير الطبيعية في المعدة، وعسر الهضم، وحرقة المعدة، والشعور بالإعياء و / أو التقيؤ.
- الضفير غير المبرور، وضيق في التنفس، قطع جلدي، حكة أو كدمات (وهذه قد تكون أعراض تحسسية).
- اضفرار العينين و / أو الجلد (اليرقان).
- التهاب حاد في الحلق مع ارتفاع في درجة الحرارة (وهذه قد تكون أعراض حالة تعرف باسم نذرة السحايا).
- عدم وضوح الرؤية أو اضطرابها (ضعف البصر) أو رؤية / سماع أشياء غريبة (الهولوسة).
- احساس السوائل مثل تورم الكاحلين (وهذا قد يكون علامة على مشاكل في الكلى).
- قطع جلدي شديد مستمر (متلازمة ستيفنز جونسون وحمامية عديدة الأشكال، وتشمل أعراض الطفح الجلدي الشديد، ظهور تقرحات في الجلد، بما في ذلك داخل الفم والألف والأعضاء التناسلية، وكذلك تقشير الجلد الذي يمكن أن يصاحب أعراض مثل الآلام، والصداع، وارتفاع حرارة الجسم).

تصاحب الأدوية المسماة ل سابوفين - جنيور معلق زيادة صغيرة في خطورة الإصابة بنوبة قلبية (احتشاء عضلة القلب) أو السكتة الدماغية
تصاحب الأدوية المسماة ل سابوفين - جنيور معلق في حالات استثنائية مشاكل جلدية خطيرة للمرضى الذين يعانون من الجلدي أو الفواق المنطقي.
قد تحدث نادراً مع إيبوبروفين اضطرابات في الدم، ومشاكل في الكلى ومشاكل في الكبد أو رودة فعل تحسسية جلدية شديدة
نادراً جداً ما يسبب سابوفين - جنيور معلق التهاب السحايا المعقم (التهاب الغشاء الوائي المحيط بالمخ)
ظهر أيضاً أن سابوفين -جنيور قد يزيد أحياناً من سوء أعراض مرض كرون أو التهاب القولون.
قد يحدث شعور بحرقه في الحلق أو الفم لفترة وجيزة بعد تناول هذا الدواء.

الأثار الجانبية الأخرى

شائعة (تؤثر على ما يصل إلى 1 من كل 10 أشخاص):

- الطفح الجلدي.
- الشعور بالدوار أو التعب.

- آلام في المعدة، وعسر الهضم، الإسهال، الشعور بالغثاء، الإعياء، الغازات، والإسкак.
- الصداع - وإذا حدث ذلك أثناء تناولك هذا الدواء من المهم عدم تناول أي أدوية أخرى للألم للمساعدة في ذلك.
- مرور كل براز سوداء.
- مرور الدم في البراز الخاص بك.
- في أي كمية من الدم.

غير شائعة (تؤثر على ما يصل إلى 1 من كل 100 شخص):

- الشعور بالغثاس.
- الشعور بالقلق.
- الشعور بحر أو "بدياسي أو ابر".

صعوبة في النوم

شكل خلايا النحل، والحكة.

أن يصبح الجلد حساساً للضوء.

لاضطرابات البصر، ومشاكل في السمع.

التهاب الكبد، واضفرار الجلد أو العينين، انخفاض وظائف الكبد.

انخفاض وظائف الكلى، والتهاب الكلى والفشل الكلوي.

الغثاس، والصداع، حكة أو سيلان الأنف (التهاب الأنف).

قرحة المعدة أو الأمعاء، تقب في جدار الجهاز الهضمي.

التهاب بطانة المعدة.

كدمات صغيرة على الجلد أو داخل الفم والأنف أو الأذنين.

صعوبة في التنفس الضفير عند التنفس أو السعال، والربو أو تقام الربو.

زنين في الأذنين (الطنين).

الإحساس والشعور بالدوار أو الدوران (الدوخة).

فرح الفم.

رد فعل تحسسي خطير يؤدي إلى تورم في الوجه أو الحلق.

نادرة (تؤثر على ما يصل إلى 1 من كل 1000 شخص):

الشعور بالالتباس أو الاضطراب.

احساس السوائل (رودة).

التهاب الدماغ تسمى "التهاب السحايا غير الجرثومي".

قدفقد الرؤية.

التغيرات في تعاد خلايا الدم - العلامات الأولى هي: ارتفاع درجة الحرارة والتهاب الحلق وتقرحات الفم، وأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، والشعور بالتعب الشديد، وتزيف من الأنف والجلد.

صعوبة في خاليا الدم (الأنيميا).

رد فعل تحسسي خطير مما يسبب صعوبة في التنفس أو دوار.

التهاب الحلق الحاد مع ارتفاع في درجة الحرارة (نذرة السحايا).

نادرة جدا (تؤثر على ما يصل إلى 1 من كل 10,000 شخص):

تليف كبدى.

شلل القلب.

نوبة قلبية.

التهاب البنكرياس.

مشاكل الجلد (والتي يمكن أن تؤثر أيضاً داخل الفم أو الأنف أو الأذنين) مثل "متلازمة ستيفنز جونسون"، انحلال البشرة السام" أو "حمامي عديدة الأشكال".

ضعف دم مرمغ.

غير معروفة (لا يمكن تقدير عددها من البيانات المتاحة):

تقادم التهاب القولون التقرحي أو مرض كرون (التهاب القولون).

الإبلاغ عن الأثار الجانبية

إذا ظهرت عليك أي آثار جانبية، قم بالتحدث مع طبيبك أو الصيدلي أو الممرضة. ويشمل ذلك أي آثار جانبية محتملة غير الشُدْرجة في هذه النشرة. يمكنك أيضاً الإبلاغ عن الآثار الجانبية مباشرة عبر نظم الإبلاغ الوطنية.

5. كيفية حفظ سابوفين - جنيور

- لا يحفظ في درجة حرارة أعلى من 30 درجة مئوية.
- يحفظ هذا الدواء في مكان جاف، بعيداً عن نظر ومتناول الأطفال، من الأفضل في خزانة مغلقة.
- لا تستخدم هذا الدواء بعد انتهاء تاريخ الصلاحية المدون على العبوة. علماً بأن تاريخ الصلاحية يشير إلى آخر يوم في الشهر المذكور.
- تنتهي صلاحية هذا الدواء بعد 30 يوم من فتح الخزانة الزجاجية.
- يُنهي عدم التخلص من الأدوية عبر مياه الصرف الصحي أو الغثاء المنزلية. أسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد مطلوبة. وسوف تساعد هذه التدابير في حماية البيئة.

6. معلومات إضافية.

علام يحتوي هذا الدواء:

تحتوي كل 5 مل من معلق هذا الدواء على 100 ملجم من مادة إيبوبروفين كمادة فعالة.

مكونات أخرى: بوليوسيرات 80، سكروز حبيبي، محلول سويتول 70؛ 70 فير ميلور، جلسرين، بنزوات الصوديوم، إيديتات الصوديوم، حمض ستريك لاماني، إيسيل RQ، كترول صمغ زنتان PF، لون أصفر فروب الشمس، مكسبات طعم عصير البرتقال، نكهة الأناناس، سترات الصوديوم اللامائية ومياه منقاة.

شكل سابوفين - جنيور:

شراب معلق سيك بترقالي ذو طعم حلو ورائحة ذكية.

مالك الحقوق التسويقية والمصنع

الدوائية

مصنع الأدوية للقصيم

الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.

المملكة العربية السعودية

تمت الموافقة على هذه النشرة بتاريخ ديسمبر 2016.

سابوفين ، علامة تجارية 34SA707	
الإبلاغ عن الأعراض الجانبية	
– المركز الوطني للنبذغ والسلامة الدوائية: <p>فاكس: +966 11 2057662</p> – للاتصال بالإدارة التنفيذية للنبذغ وإدارة الأزمات. <p>هاتف: +966 11 2038222 عنوان: 2340-2353-2317-2345-2334</p> – اخطاف المجاني: 8002490000 – البريد الإلكتروني: npc.drug@fda.gov.sa – الموقع الإلكتروني: www.sfda.gov.sa/npc	
إن هذا الدواء	
– الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً لتعليمات عرضك للحظر. <p>– التعيب بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك. – لا تطعمه والصيدلاني مما أخرجنا بالدواء ويتغير دوره. – لا تقطع مبدأ العلاج المجددة لك من تلقا نفسك. – لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.</p>	
لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال	
– اجلس وزراء الصحة العرب <p>– واتخاذ الصيدلية العرب</p>	

نشرة معلومات المريض

سابوفين - جنيور معلق

إيبوبروفين 100 ملجم/ 5 مل

اقرأ كل ما يهذه النشرة بعناية، نظراً لاحتوائها على معلومات هامة بالنسبة لك.

- احتفظ بهذه النشرة. فقد تحتاج إلى قراءتها مرة أخرى.
- تقدم هذه النشرة لمخصاً للمعلومات المتوفرة حالياً حول سابوفين - جنيور.
- للمزيد من المعلومات أو المشورة، فضلاً استشر طبيبك أو الصيدلي.
- هذا الدواء تم وصفه خصيصاً لك. فلا تعطيه للآخرين، حتى وإن كانت أعراضهم تشبه أعراضك.
- فضلاً أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا واجهت أي آثار جانبية.

هذه النشرة تحتوي على ما يلي:

- ما هو سابوفين - جنيور وفيم بستيندم.**
- ما يجب مراعاته قبل إعطاء سابوفين - جنيور.**
- كيفية إعطاء ساباه أفين - جنيور.**
- الأعراض الجانبية المحتملة.**
- كيفية حفظ سابوفين - جنيور.**
- معلومات إضافية.**

1. ما هو سابوفين - جنيور وفيم بستيندم

سابوفين - جنيور يمثل ينتمي إلى مجموعة من الأدوية تسمى مسكنات الألم المضادة للالتهابات. ويمكن استخدامه لتخفيف الألم والالتهاب في حالات مثل المفاصل، والتهاب المفاصل الروماتويدي (بما في ذلك التهاب المفاصل الروماتويدي المبكر أو من داء ستيل)، والتهاب مفاصل العمود الفقري، التهاب الفقار اللاصق، تورم المفاصل، الكتف المتجمدة، التهاب الكيسي، التهاب الأوتار، التهاب غمد الوتر، آلام أسفل الظهر، التواءات الكاحل والإجهاض. يمكن أن يستخد سابوفين - جنيور معلق لعلاج الحالات المؤلمة الأخرى مثل آلام الأسنان، وآلام ما بعد العمليات، آلام الدورة الشهرية والصداع، بما في ذلك الصداع النصفي. ويمكن أن يستخد أيضاً لعلاج الحمى على المدى القصير لدى الأطفال فوق عمر ستة.

المادة الفعالة في سابوفين -جنيور معلق هي إيبوبروفين. كل 5 ملي من سابوفين - جنيور معلق تحتوي علي 100 ملجم إيبوبروفين.

2. ما يجب مراعاته قبل إعطاء سابوفين - جنيور

إذا كانت الإصابة على أي من الألسنة التالية أي "نعم" فضلاً قم بإخبار طبيبك أو الصيدلي قبل تناول سابوفين - جنيور معلق:

- هل أنت حاملًا أو تخططين لتصبحي حاملًا ، أو إذا كنتي تقومين بالرضاعة الطبيعية ؟ من الممكن أن يتسبب سابوفين - جنيور معلق في جمل الأمر أكثر صعوبة لتصبحي حاملًا . يجب عليك إبلاغ الطبيب إذا كنتي تخططين لتصبحي حاملًا أو إذا كانت لديك مشاكل في أن تصبحي حاملًا .
- هل لديك حساسية ضد أي من المكونات الموجودة في المعلق؟ قد تركز هذه المكونات في الفقرة 6. إذا ظهر عليك طفح جلدي غير متوقع، في العمود، التهاب في الفم أو صعوبة في التنفس أثناء تناول هذا الدواء، توقف عن تناول الدواء واتصل بطبيبك للحصول على المشورة.
- هل لديك مشاكل أو من قبل قرحة في المعدة أو أي مشاكل في المعدة؟
- هل سابوفين - جنيور معلق إذا كانت لديك حالياً قرحة في الجهاز الهضمي (قرحة في المعدة أو في منطقة الإثني عشر) أو تزيف في المعدة، أو أصبت مرتين أو أكثر من قبل بأعراض القرح الهضمية، تزيف أو تقيء المعدة.
- هل لديك حالة قد تزيد إمكانية التزيف لديك؟
- هل تعاني من الربو أو كان لديك في أي وقت مضى رد فعل تحسسي أوعدمانة في التنفس بعد تناول الإيبوبروفين، والأمين أو غيرها من مسكنات الألم المضادة للالتهابات؟
- هل تعاني من التوروم والاحمرار داخل الأنف؟
- هل تعاني من أمراض الكبد أو الكلى؟
- هل تعاني من أمراض القلب؟
- الممكن أن تصاحب الأدوية مثل سابوفين - جنيور معلق زيادة صغيرة في خطورة الإصابة بنوبة قلبية (احتشاء عضلة القلب) أو السكتة الدماغية. من المرجح أن تكون أي خطورة مرتبطة بالجرعات العالية والعلاج لفترات طويلة. لا تتجاوز الإثني عشر) أو تزيف في المعدة، أو أصبت مرتين أو أكثر من قبل بأعراض القرح الهضمية، تزيف أو تقيء المعدة.
- هل جرعة الدواء بها أو مدة العلاج، يجب عليك مناقشة العلاج مع طبيبك أو الصيدلي قبل تناول سابوفين - جنيور معلق إذا كانت لديك:

- مشاكل في القلب بما في ذلك شلل القلب، والذبحة الصدرية (آلم في الصدر) أو كانت لديك نوبة قلبية، أو سوف تخضع لعملية جراحية أو مرض الشريان المحيطي (ضعف الدورة الدموية في السابقين أو القديمين نتيجة لضيق أو انسداد الشرايين).

- أي نوع من السكتة الدماغية أو متفقد أنك قد تكون في خطورة من هذه الحالات (على سبيل المثال، إذا كان لديك تاريخ عائلي من الإصابة بأمراض القلب، أو السكتة الدماغية، وارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وارتفاع الكوليستيرول أو كنت مدخنًا).

هل أنت مصاب بالداء الحمامية الههازية (التي تعرف أحياناً باسم اللدبة) أو أمراض التسبب الغضام (أمراض المناعة الذاتية التي تؤثر على التسبب الغضام)؟

هل أنت مصاب بداء الجلدي أو الفواق المنطقي؟

هل أنت أعرج طبيك من قبل بأن لديك عدم قدرة على تحمل تناول بعض السكريات؟ نظرا لما يحتويه الدواء من سوزيتول وسكرروز، فمن غير المفضل تناول هذا الدواء لأولئك الذين يعانون وراثياً من عدم القدرة على تحمل

تناول الفركتوز، متلازمة سوء امتصاص الجلوكوز أو نقص إنزيم السكريز إيزومازيتيز.

هل هل يعاني طفلك من الحساسية؟ لأنه هناك خطورة من حدوث تليف في الكلى لدى الأطفال والمراهقين المصابين بالحساسية.

هل يمكنك تناول سابوفين - جنيور مع أدوية أخرى؟

بعض الأدوية المضادة لتخثر الدم (والتي تعمل على ترقيق الدم لمنع التجلط مثل الأسبرين/ حمض أسيتيل ساليسيليك والوارفارين وتكوفيتين)، والأدوية التي تعمل على خفض ضغط الدم المرتفع (مثل مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين مثل كابتوبريل، أو مثبطات بيتا مثل ليفتولر، أو مضادات مستقبل أنجيوتنسين II مثل لوسارتان) وبعض الأدوية الأخرى التي قد تؤثر على أو تتأثر بإيبوبروفين. لذلك، ينبغي على المرضى استشارة الطبيب المعالج أو الصيدلي قبل البدء في استخدام إيبوبروفين مع أدوية أخرى.

بالإضافة إلى الأدوية المذكورة أعلاه فإن الأدوية التالية قد تتفاعل مع إيبوبروفين:

- مدرات البول (أقراص الماء)،
- جليكوسيدات القلب مثل الديجوكسين، وتستخدم لعلاج أمراض القلب،
- الليثيوم،

زيروفونين (عقار مضاد للفيروسات)،

الستيرويدات (الستخدام في علاج حالات الالتهابات)،

الميثوتريكسيت (الذي يستخدم لعلاج بعض أنواع السرطان)،

الأدوية المعروفة باسم مثبطات المناعة مثل السيكلوسبورين وتاكروليموس (والتي تستخدم لتهادة الاستجابة المناعية للمرضى)،

الأدوية المعروفة باسم مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRI). وتستخدم لعلاج الاكتئاب،

المضادات الحيوية من مجموعة التيكولونات مثل ميروفلوكساسمين،

الأمينوجليكوزايد (وهو نوع من المضادات الحيوية)،

المضغيبات،

أي تحضيرات أخرى لإيبوبروفين، مثل تلك التي يمكن شراؤها بدون وصفة طبية،

أي مسكنات أخرى للألم ومضادات للالتهاب، بما فيها الأسبرين،

كوليستيرامين (وهو دواء يستخدم لخفض الكوليستيرول)،

الأدوية المعروفة باسم سفليويد يوريا مثل جليستيفلدي (التي تستخدم لعلاج مرض السكري)،

فوريكوزارول أو فلوكوزاترول (النوع من العقاقير المضادة للطفريات)،

جنكو بيلوبا وهو من الأدوية العشبية (مماثل احتمالية أن تزيف بسهولة أكبر إذا كنت تتناول هذا العشب مع إيبوبروفين).

إذا كنت غير متأكد من التفاعلات مع أي أدوية أخرى، تواصل مع الصيدلي. ويشمل ذلك الأدوية التي حصلت عليها بوصفة طبية والأدوية التي حصلت عليها لتطبخ بما فيها الأدوية العشبية والعلاجات البشائية.

معلومات إضافية هامة

يحتوي المعلق على كميات صغيرة من الجلوسرين (الجليسرول). في الجرعات العالية، من الممكن أن يتسبب الجلوسرين في حدوث صداع، اضطراب في المعدة وإسهال. على هذا النحو، يجب أن لا تتناول أكثر من الجرعة المذكورة ما لم يوصفك الطبيب غير ذلك. يحتوي المعلق على السكروز، وبالتالي قد يكون ضاراً لأسنانك.

الحمل والاستخدام الطبيعي: يجب تجنب استخدام سابوفين - جنيور معلق في حالات الحمل والرضاعة. لا يجب استخدام سابوفين - جنيور معلق في الفترة الأخيرة من (في الأشهر الثلاثة الأخيرة) من الحمل ويجب أن يتم تناوله في الأشهر الستة الأولى من الحمل بناء على استشارة الطبيب فقط.

القيادة واستخدام الآلات

قد يجعلك سابوفين - جنيور معلق تشعر بالدوار أو التماس. إذا كان يؤثر عليك بهذه الطريقة لا تقم بالقيادة، وتشغيل الآلات أو يقبل أي شيء يتطلب منك أن تكون في حالة تأهب.

3. كيفية إعطاء سابوفين - جنيور

دائماً تناول سابوفين - جنيور معلق تماماً كما أوصرك طبيبك. إذا كنت غير متأكد بوجه مراجعة الإرشادات الموجودة على كل زرونة الدواء أو استشر طبيبك أو الصيدلي. فضلاً تأكد من رج الزجاجية جيداً قبل الاستعمال. تناول هذا الدواء على أو بعد الطعام.

الجرعة:

البالغين والأطفال فوق 12 سنة: الجرعة المعتادة هي 4-6 ملاعق (5 مل) تؤخذ ثلاث مرات يوميا. قد يفرطبيك زيادة أو تقليل هذه الجرعة اعتماداً على الغرض من العلاج، ولكن لا يجب تناول أكثر من 24 ملامعة (120 مل) 2400 ملجم) في اليوم الواحد.

الأطفال: لا يجب تناول سابوفين - جنيور معلق من قبل الأطفال التي تزأ أقل من 7. كجم. عند استخدام هذا الدواء لعلاج الحمى، لا يجب استخدام هذا الدواء بطريقة أو إعطاءه للأطفال أقل من ستة.

الجرعة المعتادة للطفل من 20 ملجم لكل كيلوجرام من وزن الجسم يومياً، مقسمة على جرعات. يمكن أن تعطي هذه الجرعات على النحو التالي:

2-1 سنة: جرعة واحدة 2.5 مل (50 ملجم) ثلاث / أربع مرات في اليوم

3-2 سنوات: جرعة واحدة 5 مل (100 ملجم) ثلاث/ أربع مرات في اليوم

7-3 سنة: جرعتين اثنتين 5 مل (200 ملجم) ثلاث / أربع مرات في اليوم

قد يحتاج الأطفال لزيادة هذه الجرعة في الأطفال الذين يعانون من التهاب المفاصل الروثاني الشباهي. يجب أن لا تتجاوز هذه الجرعة 40 ملجم/ 400 ملجم من وزن الجسم يوميا مقسمة على جرعات.

يجب تجنب الاستخدام المفرط للمسكنات. إذا كنت متعاد على تناول المسكنات، خاصة تناول مجموعة من المسكنات المختلفة من الممكن أن يتسبب في تدمير كليتك، أخبر طبيبك إذا كنت تتناول بالفعل مسكن آخر قبل تناول هذا الدواء، وسوف يفر طبيبك ما إذا كان يجب عليك أن تتناول هذا الدواء. ويمكن زيادة هذه المخاطر إذا كنت تعاني من الجفاف.

إذا تناولت سابوفين - جنيور معلق أكثر مما ينبغي (جرعة مفرطة) يجب عليك التواصل مع الطبيب أو الذهاب إلى قسم الطوارئ في أقرب مستشفى فوراً واصطحب معك المعلق المستخدم.

إذا نسيت تناول سابوفين - جنيور معلق

قد يتناول الجرعة عندما تذكر، إذا لم يكن هذا توقيت الجرعة التالية. إذا كان كذلك، لا تقم بتناول الجرعة الثالثة نهائياً. لا تقم مطلقاً بمضاعفة الجرعة لتعويض الجرعة الفائتة.

4. الأعراض الجانبية المحتملة

كما هو الحال مع جميع الأدوية، فإن سابوفين - جنيور معلق قد يتسبب في آثار جانبية، على الرغم من أنه عادة ما تكون خفيفة وليس من الضروري أن يعاني منها الجميع. إذا أصبحت أي آثار جانبية خطيرة أو إذا لاحظت أي آثار جانبية أخرى لم ترد في هذه النشرة، فضلاً قم بإخبار طبيبك أو الصيدلي. يمكنك تقليل خطر الآثار الجانبية بتناول أقل كمية ممكنة من المعلق لأقصر فترة ممكنة والتي تلتزم للسيطرة على الأعراض الخاصة بك.