لـورين®

نشرة العبوة: معلومات لمستخدم الدواء
لورين 10 ملجم أقراص
لورين 1 ملجم/ ملليلتر شراب
لوراتادين

قم بقراءة كل ما في هذه النشرة جيداً قبل البدء بتناول هذا الدواء نظراً لاحتوائها على معلومات هامة بالنسبة لك.
قم دائماً بتناول الدواء الخاص بك تماماً كما هو مذكور في هذه النشرة أو كما أخبرك طبيبك المعالج أو الصيدلي أو الممرضة.
- احتفظ بهذه النشرة. فقد تحتاج إلى قراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أية أسئلة اضافية، استشر طبيبك أو الصيدلي.
- يجب عليك التحدث إلى طبيبك المعالج في حالة عدم شعورك بتحسن أو في حالة شعورك بتدهور حالتك أو في حالة تغير الأعراض لديك.
- إذا تعرضت لأي أعراض جانبية، تواصل مع طبيبك المعالج أو الصيدلي أو الممرضة. ويشتمل ذلك على أي أعراض جانبية لم تذكر بهذه النشرة.

تحتوي هذه النشرة على:

1. **ما هو لورين وفيم يستخدم**
2. **ما يجب مراعاته قبل تناول لورين**
3. **كيفية تناول لورين**
4. **الأعراض الجانبية المحتملة**
5. **ظروف تخزين لورين**
6. **معلومات إضافية**

1. ما هو لورين وفيم يستخدم

ينتمي لورين إلى مجموعة من الأدوية التي تعرف باسم مضادات الهستامين. مضادات الهستامين تساعد على تقليل أعراض الحساسية من خلال منع تأثير مادة تسمى الهستامين والتي يتم إنتاجها في الجسم.
لورين يخفف من الأعراض المرتبطة بالتهاب الأنف التحسسي (على سبيل المثال، حمى القش)، مثل العطس وسيلان أو حكة الأنف وحرقة أو حكة العيون.
ويمكن أيضا استخدام لورين في المساعدة على تخفيف أعراض الشرى (الحكة والاحمرار) والذي يعرف في كثير من الأحيان بالشرى أو الطفح القراصي.

2. ما يجب مراعاته قبل تناول لورين

لا تقم بتناول لورين في الحالات الآتية:
- إذا كنت تعاني من فرط التحسس تجاه مادة لوراتادين أو أي من المكونات الأخرى لهذا الدواء (والمذكورة في الفقرة 6).
- إذا كنت حاملاً أو ترضعين طفلك طبيعياً.

ينبغي توخي الحذر عند تناول لورين
قبل البدء في تناول لورين، يجب عليك إخبار طبيبك المعالج أو الصيدلي في الحالات الآتية:
- إذا كنت مصاباً بمرض بالكبد.
- إذا كان من المقرر أن تخضع لأي اختبارات لحساسية الجلد يجب أن لا تأخذ هذا الدواء لمدة يومين قبل إجراء هذه الاختبارات، وذلك لأن هذا الدواء قد يؤثر على نتائج الاختبار.

الأطفال:
لا تعطي قرص لورين للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات أو للأطفال الذين يزنون 30 كجم أو أقل. هناك تركيبات أخرى (شراب) أكثر ملاءمة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات أو يوزن الجسم 30 كجم أو أقل .

الأطفال أقل من سنتين:
لم تثبت سلامة وفعالية لورين. لا توجد بيانات متاحة.

تناول أدوية أخرى:
إذا كنت تتناول أي أدوية أخرى بما فيها تلك التي حصلت عليها بدون وصفة طبية، فضلاً استشر طبيبك المعالج أو الصيدلي قبل استخدام هذا الدواء.

الحمل والرضاعة:
لا ينصح باستخدام لورين في حالة الحمل.
لا ينصح باستخدام لورين في حالة الرضاعة. حيث أن مادة لوراتادين تفرز مع اللبن.
لذلك إذا كنت حاملاً أو تعتقدين بأنك حامل أو تخططين للحمل أو تقومين بإرضاع طفلك طبيعياً، يجب عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي أو الممرضة قبل البدء في تناول هذا الدواء.

تناول لورين مع الطعام والشراب
يمكن تناول لورين مع الطعام أو بدونه.

القيادة واستخدام الآلات
في الجرعات الموصى بها، ليس من المتوقع أن يسبب لك لورين نعاساً أو يقلل من التنبيه. ومع ذلك، في حالات نادرة جدا بعض الناس تتعرض للنعاس، مما قد يؤثر على قدرتهم على القيادة أو استخدام الآلات.

معلومات هامة حول بعض مكونات لورين
أقراص لورين تحتوي على سكر اللاكتوز ولورين شراب يحتوي على سكروز. لذلك، إذا أخبرك طبيبك المعالج بعدم تحملك لبعض أنواع السكريات، فضلا تواصل مع طبيبك المعالج أو الصيدلي قبل البدء في تناول هذا الدواء.

3. كيفية تناول لورين

تناول هذا الدواء دائما تماما كما هو موضح في هذه النشرة أو كما أخبرك طبيبك أو الصيدلي .
لا تعطي هذا الدواء للأطفال الأقل في العمر من عامين .

لأقراص لورين:

العمر	الجرعة	عدد المرات
في حالة البالغون والأطفال من سن 6 سنوات فما فوق ويبلغ وزنهم أكثر من 30 كجم.	قرص واحد من لورين أقراص	مرة واحدة يومياً.

في حالة وزن الجسم 30 كجم أو أقل : لا تعط قرص لورين. هناك تركيبات أخرى (شراب) أكثر ملاءمة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات أو الذين يزنون 30 كجم أو أقل .
إذا كانت لديك مشاكل حادة في الكبد ، فقد ينصحك طبيبك أو الصيدلي بتناول الكمية الموصى بها كل يومين. إذا كان هذا ينطبق عليك اتبع تعليماتهم.

بالنسبة للورين شراب:

العمر	الجرعة	عدد المرات
في حالة البالغون والأطفال فوق 12 سنة.	معلقتين 5 مللي من لورين شراب.	مرة واحدة يومياً.
في حالة الأطفال في سن ما بين 2 إلى 12 سنة من العمر والذين يزنون أكثر من 30 كجم	معلقتين 5 مللي من لورين شراب.	مرة واحدة يومياً.
في حالة الأطفال في سن ما بين 2 إلى 12 سنة من العمر الذين يزنون 30 كجم أو أقل.	ملعقة واحدة 5 مللي من لورين شراب.	مرة واحدة يومياً.
المرضى الذين يعانون من مشاكل خطيرة في الكبد: للبالغين والأطفال الذين يزيد وزنهم عن 30 كجم: خذ ملعقتين 5 مللي من الشراب مرة كل يومين. للبالغين والأطفال الذين يبلغ وزنهم 30 كجم أو أقل: خذ معلقة 5 مللي من الشراب مرة كل يومين.		

مدة العلاج
من المفترض أن يعمل لورين على تحسين الأعراض لديك، ولكن كما هو الحال في جميع الأدوية قد يجد بعض الناس أنه لا يوجد تأثير للدواء عليهم. لذلك في حالة عدم تحسن الأعراض لديك بعد ثلاثة أيام من تناول لورين، تواصل مع طبيبك المعالج أو الصيدلي.

في حالة تناولك لجرعة أكثر مما ينبغي
في حالة قيامك (أو قيام أي شخص آخر) بتناول لورين بشكل مفرط، توجه إلى قسم الإصابات بأقرب مستشفى أو أخبر طبيبك المعالج فورا. خذ معك علبة الدواء وأي أقراص متبقية لتعرضها على طبيبك المعالج. علامات الجرعة الزائدة تشمل النعاس، تسارع ضربات القلب وصداع.

في حالة نسيان تناول الدواء الخاص بك
لا تقم بمضاعفة الجرعة لتعويض الجرعة المفقودة. إذا نسيت تناول الجرعة، قم بتناولها حالما تتذكر ثم قم بتناول الجرعة التالية في وقتها المعتاد.

4. الأعراض الجانبية المحتملة

مثل جميع الأدوية، لورين قد يسبب أعراضاً جانبية وإن لم تحدث لكل من يتناول هذا الدواء.
توقف عن تناول لورين واتصل بطبيبك المعالج في الحال عند ملاحظتك لأي من العلامات الآتية:
- تفاعلات تحسسية: تورم الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق، تضيق في مسالك الهواء مما يسبب ضيق في التنفس، أو صدمة أو انهيار أوطفح جلدي أو حكة.

أخبر طبيبك المعالج عند ملاحظتك لأي من الأعراض الجانبية الآتية أو أي أعراض جانبية أخرى لم تذكر في هذه النشرة:
- الجهاز العصبي: تعب أو نعاس أوعدم القدرة على النوم أو صداع أو عصبية أو دوار.
- القلب: تسارع أو عدم انتظام في ضربات القلب.
- المعدة والأمعاء: زيادة الشهية، الشعور بالغثيان أو الإعياء، إسهال، عسر هضم، جفاف الحلق.
- الكبد: خلل في وظائف الكبد (والذي يتضح من خلال اختبارات الدم).
- الجلد: تساقط الشعر (الصلع).

عند ملاحظتك لأي أعراض جانبية أو ملاحظتك لتدهور الأعراض الجانبية لديك أو ملاحظتك لأي أعراض جانبية لم يتم ذكرها في هذه النشرة، فضلاً أخبر طبيبك المعالج أو الصيدلي.

5. ظروف تخزين لورين

يحفظ بعيدا عن متناول و نظر الأطفال.
لا يحفظ في درجة حرارة اعلى من 30 درجة مئوية.
لا تستخدم لورين بعد انتهاء تاريخ الصلاحية المدون على العبوة. علماً بأن تاريخ الصلاحية يشير إلى آخر يوم في الشهر المذكور على العبوة.
لورين شراب : تنتهي صلاحية هذا الدواء بعد 30 يوم من تاريخ فتح الزجاجة.
لا يجب التخلص من الأدوية عبر مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. اسأل الصيدل عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد بحاجة إليها. حيث تساعد هذه التدابير على حماية البيئة

6. معلومات إضافية

محتويات لورين:
- لورين أقراص: يحتوي كل قرص لورين على 10 ملجم من مادة لوراتادين كمادة فعالة.
- لورين شراب: كل 5 ملي من لورين شراب تحتوي على 5 ملجم من مادة لوراتادين كمادة فعالة.

مكونات أخرى:
- لورين أقراص: نشاء الذرة، واللاكتوز وسترات المغنيسيوم.
- لورين شراب: حامض ستريك أحادي التميه، نكهة الخوخ، جلسرين، بروبيلين جلايكول، بنزوات الصوديوم، حبيبات سكروز ومياه نقية.

شكل لورين ومحتويات العبوة:
- لورين أقراص: أقراص بيضاوية الشكل، ثنائية التحدب لونها من أبيض إلى أبيض فاتح، عليها شعار الهلال من جانب واحد ومن الجانب الآخر قابلة للقسمة وعليها حروف «SP» ورقم «136».

أحجام العبوات:
- أقراص لورين :

تحتوي العبوة على شريط واحد به 10 أقراص.
تحتوي العبوة على 20 قرص مقسمة على شريطين.
تحتوي العبوة على 30 قرص مقسمة على ثلاثة شرائط.
- لورين شراب: شراب شفاف لونه من عديم اللون إلى أصفر فاتح، خالي من المواد الغريبة.

لورين شراب : 100 ملي معبأة بزجاجة العنبر المزودة بغطاء مقاوم للأطفال.

مالك الحقوق التسويقية والمصنع
الدوائية
مصنع الأدوية بالقصيم
المملكة العربية السعودية

تمت الموافقة على هذه النشرة بتاريخ: يوليو 2020 **النسخة: 2.**

« **لـورين** » علامة تجارية
34LR875

للإبلاغ عن الأعراض الجانبية

بالنسبة للمملكة العربية السعودية:
- المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية:
- فاكس: 966+11-2057662
- للإتصال بالإدارة التنفيذية للتيقظ و إدارة الأزمات.
- هاتف: 966+11-2038222 تحويلة: 2340-2356-2317
- مركز اتصال هيئة الغذاء والدواء: 19999
- البريد الالكتروني: npc.drug@sfda.gov.sa
- الموقع الالكتروني: https://ade.sfda.gov.sa

للإمارات:	عمان :
• قسم اليقظة الدوائية والأجهزة الطبية	• دائرة التيقظ والمعلومات الدوائية
• صندوق البريد: 1853	• المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية
• هاتف: 80011111	• وزارة الصحة، سلطنة عمان
• البريد الالكتروني: pv@moh.gov.ae	• هاتف: 0096822357686 /0096822357687
• قسم الأدوية، وزارة الصحة والوقاية، دبي.	• فاكس: 00968522358489
	• البريد الالكتروني: dg-padc@moh.gov.om
	• الموقع الالكتروني: www.moh.gov.om

إن هذا الدواء
- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- الطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وبنفعه وضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال

مجلس وزراء الصحة العرب
واتحاد الصيادلة العرب