

نشرة العبوة: معلومات تستخدم الدواء لورين 10 ملجم اقراص لورين 1 ملجم/مليتر شراب لورنادين

تم كتابة كل ما في هذه النشرة جيداً قبل البدء بتناول هذا الدواء نظراً لإحتياجنا من معلومات هامة بالنسبة لك. قد بدأنا بتناول الدواء والاضطراب تماماً كما هو مكتوب في هذه النشرة أو كما أخبرك طبيبك المانح أو الصيدلي أو الممرضة. احفظ هذه النشرة، فقد تحتاج إلى قرائتها مرة أخرى.

- احفظ هذه النشرة أيضاً، لاستشارة أخصائى طبيبك أو الصيدلي.
- إذا كان لديك أية أسئلة إضافية، استشر طبيبك أو الصيدلي.
- يجب عليك التحدث إلى طبيبك المانح في حالة عدم شعورك بتحسن أو في حالة شعورك بتدهور حالتك أو في حالة تغير الأعراض لديك.
- إذا تعرضت لأي أعراض جانبية، تواصل مع طبيبك المانح أو الصيدلي أو الممرضة. ويشمل ذلك كل أي أعراض جانبية لم تذكر بهذه النشرة.

- يحتوي هذه النشرة على:
1. ما هو لورين وشم تستخدم
 2. ما يجب مراعاته قبل تناول لورين
 3. كيفية تناول لورين
 4. الأعراض الجانبية الشائعة
 5. ظروف تخزين لورين
 6. معلومات إضافية

1. ما هو لورين وشم تستخدم
يتشبه لورين إلى مجموعة من الأدوية التي تعرف باسم مضادات استهتام. مضادات استهتام تساعد على تقليل أعراض الحساسية من خلال منع تأثير عامل تسمى استهتام والتي تمنع انفتاح الجسم.
لورين يخفف من الأعراض المرتبطة بالتهاب الأنف الحساسية (على سبيل المثال، حكة العين، مثل العطس وسيلان أو حكة الأنف وحرقه أو حكة العين).
ويمكن أيضاً استخدام لورين في المساعدة على تخفيف أعراض الشرى (الحكة والاحمرار) والذي يعرف في كثير من الأحيان بالشرى أو الطفح الجلدي.
2. ما يجب مراعاته قبل تناول لورين
لا تم تناول لورين في الحالات الآتية:

 - إذا كنت تعاني من فرط الحساسية تجاه مادة لورنادين أو أي من المكونات الأخرى لهذا الدواء (المذكورة في الفقرة 6).
 - إذا كنت حاملاً أو ترضعين طفلك رضياً.

ينبغي توخي الحذر عند تناول لورين
قبل البدء في تناول لورين، يجب عليك إخبار طبيبك المانح أو الصيدلي في الحالات الآتية:

 - إذا كنت مصاباً بمرض بالكبد.
 - إذا كان من المقرر أن تصفح لأي اختبارات حساسية الجلد يجب أن تأخذ هذا الدواء لمدة يومين قبل إجراء هذه الاختبارات، وذلك لأن هذا الدواء يؤثر على نتائج الاختبار.

الاحتياطات:
لا تعطي قرص لورين للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات أو للأطفال الذين يزيدون 30 كجم أو أقل. هناك توكيدات أخرى (شراب) أكثر ملاءمة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات أو بوزن الجسم 30 كجم أو أقل.

الأطفال أقل من سنتين:
لم تثبت سلامة وفعالية لورين. لا توجد بيانات متاحة.
تناول أدوية أخرى:
إذا كنت تتناول أي أدوية أخرى ما فيها تلك التي حصلت عليها بدون وصفة طبية، فضلاً عن استشر طبيبك المانح أو الصيدلي قبل استخدام هذا الدواء.
الحمل والرضاعة:
لا ينصح باستخدام لورين في حالة الحمل.
لا ينصح باستخدام لورين في حالة الرضاعة. حيث أن مادة لورنادين تفرز مع اللبن.
لذلك إذا كنت حاملاً أو تعتقدين بأنك حاملاً أو تعتقدن للحمل أو تقومين بإرضاع طفلك طبيعياً، يجب عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي أو الممرضة قبل البدء في تناول هذا الدواء.
تناول لورين مع الطعام والشراب
يمكن تناول لورين مع الطعام أو بدونه.

التفاعلات واستخدام الألات:
في الجرعات الموصى بها ليس من المتوقع أن يسبب لك لورين تعاماً أو يقلل من التنبه. ومع ذلك، في حالات نادرة جدا بعض الناس تعرض لبعض التفاعلات، كما قد يؤثر على قدرتهم على القيادة أو استخدام الآلات.
معلومات هامة حول بعض مكونات لورين
اقراص لورين تحتوي على سكر الالكتوز ولورين شراب يحتوي على سكر وز. لذلك إذا أخبرك طبيبك المانح بعدم تحمّلك لبعض أنواع السكريات، فضلاً عن تواصل مع طبيبك المانح أو الصيدلي قبل البدء في تناول هذا الدواء.

3. كيفية تناول لورين
تناول هذا الدواء داخل أو خارج ما تأكله هو موضع في هذه النشرة أو كما أخبرك طبيبك أو الصيدلي .
لا تعطي هذا الدواء للأطفال الأقل من العمر من عامين .
لأقراص لورين

العمر	الجرعة	عدد المرات
في حالة البالغين والأطفال من سن 6 سنوات فما فوق	قرص واحد من لورين اقراص	مرة واحدة يومياً.
توفي ويبلغ وزنه من أكثر من 30 كجم		
في حالة وزن الجسم 30 كجم أو أقل	لا تعط قرص لورين	هناك توكيدات أخرى (شراب) أكثر ملاءمة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات أو الذين يزيدون 30 كجم أو أقل.
إذا كانت لديك مشاكل حادة في الكبد، فقد يصبح طبيبك أو الصيدلي تناول الكمية الموصى بها كل يومين. إذا كان هذا ينطبق عليك عليك تعليمات طبيبك.		

العمر	الجرعة	عدد المرات
في حالة البالغين والأطفال فوق 12 سنة	معلقين 5 مللى من لورين شراب.	مرة واحدة يومياً.
في حالة الأطفال في سن ما بين 2 إلى 12 سنة من العمر والذين يزيدون أكثر من 30 كجم	معلقين 5 مللى من لورين شراب.	مرة واحدة يومياً.
في حالة الأطفال في سن ما بين 2 إلى 12 سنة من العمر والذين يزيدون أكثر من 30 كجم	معلقة واحدة 5 مللى من لورين شراب.	مرة واحدة يومياً.
المراهق الذين يعانون من مشاكل خطيرة في الكبد:		
للبالغين والأطفال الذين يزيد وزهم عن 30 كجم: خذ معلقين 5 مللى من الشراب مرة كل يومين.		
للبنين والأطفال الذين يبلغ وزهم 30 كجم أو أقل: خذ معلقة 5 مللى من الشراب مرة كل يومين.		

مدة العلاج

من المفترض أن يعمل لورين على تحسين الأعراض لديك، ولكن كما هو الحال في جميع الأدوية قد يجد بعض الناس أنه لا يوجد تأثير للدواء عليهم. لذلك في حالة عدم تحسن الأعراض لديك بعد ثلاثة أيام من تناول لورين، تواصل مع طبيبك المانح أو الصيدلي.
في حالة تناولك جرعة أكثر مما ينبغي
في حالة قيامك (أو قيامي أو قيامها) بشخص آخر بتناول لورين بشكل مفرط، توجه إلى قسم الإسعافات أقرب مستشفى أو أخبر طبيبك المانح فوراً. كما يجب عليك إبلاغ واثي اقراص شقيقة تعرضها على طبيبك المانح. علامات الجرعة الزائدة تشمل: التشنج، تشنجات عضلات القلب وضيق.
في حالة تناولك الدواء الهلاليك
لا يتم مضادة الجرعة لتعويض الجرعة الفائتة. إذا نسيت تناول الجرعة، قم بتناولها لاحقاً تماماً كما تم تناول الجرعة التالية في وقتها المعتاد.

4. الأعراض الجانبية الشائعة

لا يجب علاج الأعراض الجانبية قد يسبب أعراضاً جانبية وإن لم تحدث لكل من يتناول هذا الدواء. تتوفر في تناول الدواء والحصول على نصيحة طبيبك المانح في حال عدم ملاحظتك لأي من العلامات الآتية:
• تقلبات مزاجية، توم الوجع أو الصداع أو اللسان أو الحلق، تضيق في مسالك الهواء مما يسبب ضيق في التنفس، أو صدمة أو إعياء أو طفح جلدي أو حكة.
أخبر طبيبك المانح عند ملاحظتك لأي من الأعراض الجانبية الآتية أو أي أعراض جانبية أخرى لم تذكر في هذه النشرة:
• الجهاز العصبي: تعب أو نعاس أو وعدم القدرة على النوم أو صداع أو غصبة أو دوام.
• القلب: تسارع أو عدم انتظام في ضربات القلب.
• المعدة والأمعاء: زيادة الشهية، القيء، الغثيث أو الإعياء، إسهال، عسر هضم، جفاف الحلق.
• الكبد: خذل في وظائف الكبد (والذي يكيد) يتضح من خلال اختبارات الدم).
• الجلد: طفح الحزم (الطفح).
عدد ملاحظته لأي أعراض جانبية أو ملاحظتك لتدهور الأعراض الجانبية لديك أو ملاحظتك لأي أعراض جانبية لم يتم ذكرها في هذه النشرة، فضلاً عن أخبر طبيبك المانح أو الصيدلي.

5. ظروف تخزين لورين

يحفظ بعيداً عن متناول يدي الأطفال.
لا يخضع لدرجة حرارة أعلى من 30 درجة مئوية.
تناول لورين بعد انتهاء تاريخ الصلاحية المدون على العبوة. علمياً بأن تاريخ الصلاحية يشير إلى آخر يوم في الشهر المذكور على العبوة.
لشرب شراب: تنتهي صلاحية هذا الدواء بعد 30 يوم من تاريخ فتح الزجاجه.
لا يجب التخلص من شراب عبر مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. أسأل الصيدل عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد بحاجة إليها. حيث تساعد هذه التدابير على حماية البيئة.

6. معلومات إضافية

عبوات لورين:
• 30 قرصاً اقراص يحتوي كل قرص لورين على 10 ملجم من مادة لورنادين كإدوية فعالة.
• 30 مل من شراب. كل 5 مللى من لورين شراب تحتوي على 5 ملجم من مادة لورنادين كإدوية فعالة.
• مكونات أخرى:
• لورين اقراص: نشاء الدوا، والالكتوز وسيترات المغنسيوم.
• لورين شراب: حامض سترات احادي الصبي، نكهة الخوخ، جلسرين، ويوبيلين جلايكول، بنزوات الصوديوم، حبيبات سكر وز، وياه نقيه.
شكل لورين وعبواته العبوة:
• لورين اقراص: أيضاً مصنوعة بالشكل، النحيد لونها من أبيض إلى أبيض فاتح، عليها شعار الخلال من جانب واحد ومن الجانب الأخرى للقسمة وعليها حروف "SP" ورقم "136".
• أمحام العبوات:
• اقراص وياه نقيه.
• تحتوي العبوة على شرط واحد به 10 اقراص.
• تحتوي العبوة على 20 قرص مقسمة على شرطين.
• تحتوي العبوة على 30 قرص مقسمة على ثلاثة شرائط.
• لورين شراب: شراب شفافة لونه من عديم اللون إلى أصفر فاتح، خال من المواد الغريبة.
• لورين شراب: 100 مللى عبوة بزجاجه العتير لزودة بمقاييم نظام للأطفال.

مالك الحقوق التسويقية والمصنع
الوالية:
مصنعة الأدوية بالقصيم
المفاداة العربية السعودية

تمت الموافقة على هذه النشرة بتاريخ: يوليو 2020

المنسخة: 2.
« لورين »
34LR875

الإبلاغ عن الأعراض الجانبية

بالنسبة للمشكلة العربية السعودية:

- المركز الوطني للتحفظ والسلامة الدوائية: +966-11-2057662
- للاتصال بالأدوية التطبيقية للتحفظ وإدارة الأزمات، هاتف: +966-11-2038222
- مركز اتصال هيئة الغذاء والدواء: 19999
- البريد الإلكتروني: npc.drug@sfdga.gov.sa
- الموقع الإلكتروني: <https://ade.sfdga.gov.sa>

الإبارات:

- دائرة التحفظ والدوائية والأجهزة الطبية
- مندوبي البريد: 1853
- هاتف: 80011111
- البريد الإلكتروني: pv@moh.gov.ae
- هاتف: 0096822357687 / 0096822357687
- هاتف: 00968522358489
- البريد الإلكتروني: dg-paed@moh.gov.om
- الموقع الإلكتروني: www.moh.gov.om

إن هذا الدواء

- الدواء مستحضر يؤثر على حسنتك واستهلاكه خلافاً لتعليمات بحرك لخطر.
- أنت بحاجة وصفة طبيبك بطريقة الاستعمال المخصص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- الطبيب والصيدلاني هما الحريان بالدواء وينبغي وخبره.
- لا تعطيه هذه العلاج المحمداً لك من تلقاء نفسك.
- لا تكون صرف الدواء بدون وصفة طبية.
- لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال

جلس وزراء الصحة العرب
والمحاد الصيادلة العرب