بانادول كولد + فلو الأعراض الأولى

أقراص فوّارة بنكهة البرتقال

وصف المنتج:
كل قرص فوار يحتوي على:
- الباراسيتامول ٥٠٠ ملغم
- الكافيين ٦٥ ملغم

المكوّنات الأخرى:
حمض الأسكوربيك (فيتامين ج) ١٢٥ ملغم، حمض السيتريك اللامائي، نكهة البرتقال الطبيعية والاصطناعية، أسبارتام E951، بوتاسيوم الأسيسولفام E950، كربونات الصوديوم اللامائي، لوريل سلفات الصوديوم، سوربيتول، كربونات هيدروجين الصوديوم، بوفيدون، إيثانول ٩٦٪، ديمتيكون، كارمين E120، ديبوفلافين فوسفات الصوديوم (E 101 A)، ومياه منقّاه.

ما هو بانادول كولد + فلو الأعراض الأولى وما هي دواعي استخدامه؟
بانادول كولد + فلو الأعراض الأولى أقراص فوّارة بنكهة البرتقال. كل قرص يحتوي على الباراسيتامول الذي يسكّن الألم ويخفّض الحرارة، بالإضافة إلى الكافيين الذي يضيف للتأثير المسكن للباراسيتامول ويحتوي أيضاً على حمض الأسكوربيك (فيتامين ج).

تستخدم الأقراص الفوّارة من بانادول كولد + فلو الأعراض الأولى لعلاج الأعراض الناتجة عن نزلات البرد والإنفلونزا، مثل الصداع، والحرارة، والتهاب الحلق، وألم العضلات.

كما أن بانادول كولد + فلو الأعراض الأولى يحتوي على الكافيين الذي يساعد على تحسين قلّة اليقظة، وعدم الانتباه، والصعوبة في التركيز، والنعاس والتعب المرتبط غالباً بنزلات البرد والإنفلونزا.

كيفية تناول ألا قراص الفوّارة لبانادول كولد + فلو الأعراض الأولى:
- تناول قرصين من بانادول كولد + فلو الأعراض الأولى، ذوّبهما في نصف كوب من الماء.

للتناول عن طريق الفم فقط.

البالغين (بما في ذلك كبار السن) والأطفال الذين يزيد عمرهم عن ١٢ سنة:
- تناول قرصين حتى أربع مرات في اليوم
- لا يجوز تناول أكثر من ٨ أقراص خلال ٢٤ ساعة.
- الجرعة اليومية القصوى ٤٠٠٠ ملغم باراسيتامول/ ٥٢٠ ملغم كافيين
- أدنى فترة بين الجرعة والأخرى هي ٤ ساعات
- لا تتناول لأكثر من ٧ أيام من دون استشارة الطبيب

الأطفال:
- لا يجوز إعطاؤه للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ١٢ سنة.

قبل تناول ألا قراص الفوّارة لبانادول كولد + فلو الأعراض الأولى:

أ. لا تتناول بانادول كولد+ فلو الأعراض الأولى في حال:
- **إذا تعاني أو كنت تعاني من حساسية** للباراسيتامول، الكافيين أو لأي من مكوّنات المستحضر.
- المرضى الذين يعانون من مشاكل وراثية نادرة لعدم تحمّل الفراكتوز، عليهم عدم استخدام هذا الدواء.

ب. تناول بانادول كولد+ فلو الأعراض الأولى بحذر في حال:
- المرضى الذين تم تشخيصهم بقصور في الكلى أو الكبد، عليهم استشارة الطبيب قبل تناول هذا الدواء. إن مخاطر الجرعة المفرطة هي أعلى عند الذين يعانون من أمراض الكبد الكحولية الغير متليفه
- يجب الامتناع عن تناول الكافيين المفرط (مثل القهوة، الشاي والبعض من المشروبات المعبّأة) عند استخدام هذا المستحضر.
- لا تتجاوز الجرعة المذكورة.
- هذا المستحضر يحتوي على الباراسيتامول. لا تستعمله مع منتجات أخرى تحتوي على الباراسيتامول في الوقت نفسه.
- يحتوي كل قرص من هذا المنتج على ٤٢٧ ملغم من الصوديوم. على المرضى الملزمين بالإقلال من الصوديوم في نظامهم الغذائي أن يأخذوا ذلك بعين الاعتبار.
- يحتوي كل قرص من هذا المنتج على الأسبارتام (E951) كمصدر للفينايلالانين. على المرضى الذين يعانون من الفينايلكيتونوريا عدم استخدام هذا الدواء.
- يحتوي كل قرص من هذا المنتج على ٥٨,٦ ملغم من مسحوق السوربيتول (E 420). على المرضى الذين يعانون من مشاكل وراثية نادرة لعدم تحمّل الفراكتوز عليهم عدم استخدام هذا الدواء.
- استشر الطبيب في حال استمرار الأعراض لأكثر من ٧ أيام، أو تفاقمها أو ظهور أعراض جديدة.
- احفظ هذا المنتج وجميع الأدوية بعيداً عن متناول ونظر الأطفال.

ج. تناول أدوية أخرى:
- إن سرعة امتصاص الباراسيتامول قد تزداد بسبب الميتوكلوبرامد أو الدومبريدون وتنخفض بسبب الكولیستیرامین. يمكن تعزيز تأثير الأدوية المضادة للتجلط والوارفارين وغيرها من الكومارينز إثر الاستعمال اليومي الطويل المنتظم للباراسيتامول مع زيادة في خطر النزيف؛ الجرعات العرضية ليس لها أي تأثير ملحوظ.
- قد تزداد الآثار السامة للباراسيتامول على الكبد مع تناول الكحول.

د. الحمل والرضاعة:
بسبب الكافيين الذي يحتوي عليه هذا المستحضر، لا يجوز استخدامه أثناء الحمل أو الرضاعة.

الحمل: لا يوصى باستخدام الباراسيتامول-الكافيين أثناء الحمل بسبب المخاطر المتزايدة لانخفاض وزن الرضيع والإجهاض العفوي المرتبط باستهلاك الكافيين.

الرضاعة: إن إفراز الكافيين في حليب الأم قد يكون له تأثيراً محفزّاً عند الرضع الذين يتناولون حليب الأم.

هـ. القيادة والعمل على الآلات:
- ليس له أي تأثير ملحوظ.

التأثيرات الجانبية المحتملة:

الباراسيتامول:
هذه التأثيرات نادرة جداً.

توقّف عن استعمال بانادول كولد + فلو الأعراض الأولى وراجع فوراً طبيبك في حال:
- ردود فعل حساسية مثل الطفح الجلدي أو الحكة، وأحياناً مع مشاكل في التنفس أو تورّم في الشفتين، واللسان، والحلق أو الوجه.
- حدوث طفح جلدي أو تقشر أو تقرّحات في الفم.
- حالات نادرة من الوذمة الوعائية أو متلازمة ستيفنز جونسن
- واجهتَ مسبقاً مشاكل في التنفس أو تشنّج قصبي مع الأسبرين أو مضادات الالتهاب غير الاستيرويدية، وأصبت بردة فعل مشابهة مع هذا المنتج.
- ظهور كدمات غير مبررة أو نزيف أو نقص في عدد كرات الدم البيضاء.
- قصور في وظائف الكبد أو أي أعراض أو علامات مرتبطة بذلك.

الكافيين:
- العصبية، الدوخة

(عندما يتم تناول الجرعة الموصى بها من الباراسيتامول والكافيين بالتزامن مع استهلاك الكافيين في الغذاء فإن جرعة الكافيين التي تنتج عن ذلك قد تزيد من امكانية حدوث تأثيرات سلبية مرتبطة بالكافيين مثل الأرق، القلق، التهيّج، الصداع، واضطراب الجهاز الهضمي والخفقان).

الجرعة المفرطة:
يجب الحصول على تدابير طبية فورية في حال الجرعة المفرطة، حتى وإن لم تظهر أعراض الجرعة المفرطة.

الباراسيتامول:
الجرعة المفرطة من الباراسيتامول قد تسبب فشل الكبد. يتطلب اتخاذ تدابير طبية فورية في حالة الجرعة المفرطة، حتى وإن لم تظهر أعراض الجرعة المفرطة.

تناول جرعات مفرطة عالية تتجاوز ١٠ غراماً من باراسيتامول قد يسبب تلف الكبد. إن ابتلاع ٥ غرام أو أكثر من الباراسيتامول قد يسبب تلف الكبد إذا كان المريض يتناول علاجاً طويل المدى بالكاربامازيبين، الفينوباربيتون، الفينيتوين، البيميدون، الريفامبيسين، نبتة سانت جون أو أدوية أخرى تحفز إنزيمات الكبد، أو المرضى الذين يستهلكون بانتظام كميات تتجاوز الجرعة الموصى بها من الإيثانول، أو المرضى المعرّضين لنفاذ الغلوتاثيون مثل الذين يعانون من اضطرابات في الأكل، النّليف الكيسي، فيروس نقص المناعة البشرية الجوع، والدنف.

إن أعراض الجرعة المفرطة للباراسيتامول التي تظهر في ال٢٤ ساعة الأولى هي: الشحوب، الغثيان، التقيؤ، فقدان الشهية، والألم في البطن. ولا يكون تلف الكبد واضحاً إلا بعد ١٢ إلى ٤٨ ساعة عقب الابتلاع. قد تحدث شذوذ في أيض الغلوكوز والأيض الحمضي. في حالات التسمّم الحادّ، قد يتطوّر الفشل الكبدي إلى الاعتلال الدماغي، والنزف، ونقص سكر الدم، والوذمة الدماغية والوفاة. حتى في غياب تلف الكبد الحاد، فقد تؤدي الجرعة المفرطة أيضاً إلى فشل كلوي حاد مع نخر أنبوبي حاد ما يؤدي إلى ألم في الخاصرة وبيلة دموية وبروتينية. وتم الإبلاغ أيضاً عن عدم انتظام ضربات القلب والتهاب البنكرياس.

العلاج
ينبغي أن تعالج الجرعة المفرطة فوراً عن طريق غسل المعدة يليها إعطاء الترياق إن- أسيتيل سيستايين أو ميثيونين بالوريد دون انتظار نتائج مستويات الباراسيتامول في البلازما.

عادةً يجب إعطاء ترياق إضافي لتفادي مستويات الباراسيتامول المرتفعة في البلازما والوقت المنقضي بعد التسمم في جميع الحالات التي يشتبه فيها تناول جرعة مفرطة، تكون العناية الطبية العاجلة أمراً حاسماً للكبار وكذلك للأطفال، حتى وإن لم تلاحظ أية علامات أو أعراض.

الكافيين:
إن الجرعة المفرطة من الكافيين قد تؤدي إلى ألم في محيط المعدة، التقيؤ، إدرار البول، عدم انتظام ضربات القلب أو زيادة ضربات القلب، تحفيز الجهاز العصبي المركزي (مثل الأرق، التهيّج، العصبية، الارتعاش والتشنّج).

ولا بد من الإشارة إلى أنه بالنسبة للأعراض الإكلينيكية الهامة من الجرعة الزائدة من الكافيين كي تحدث هذا المنتج، فإن الكمية المتناولة تكون مصاحبة لسمية خطيرة على الكبد من الباراسيتامول.

العلاج
ليس هناك أي ترياق خاص ، لكنه يجب اتخاذ تدابير داعمة مثل استخدام مضادات المستقبلات بيتا لانعكاسا آثار السمية على القلب.

بيكربونات الصوديوم
من المتوقع أن جرعات عالية من بيكربونات الصوديوم قد تؤدي إلى أعراض في الجهاز الهضمي مثل ا - ٠٫٥ والغثيان. كما أن جرعات عالية من بيكربونات الصوديوم قد تسبب ارتفاع مستوى الصوديوم في الدم، فيجب مراقبة الشوارد وعلاج المريض وفقاً لذلك.

كيفية تخزين بانادول كولد + فلو الأعراض الأولى:
يحفظ في درجة حرارة أقل من ٣٠ درجة مئوية.
الأقراص حساسة للرطوبة. احفظ الأقراص في الأنبوب واغلق الأنبوب بإحكام

هذا منتج دوائي
- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافا للتعليمات يعرّضك للخطر.
- اتبع بدقة وصف الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- فالطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وبنفعه وضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال
مجلس وزراء الصحة العرب
واتحاد الصيادلة العرب

بانادول™ علامة مسجلة لمجموعة شركات جلاكسوسميث كلاين.
صُنع من قبل: هيرميس أرزنيبيتيل جي إم بي إتش أنانيا - لجلاكسوسميث كلاين.
تم التحديث على أساس GDS-V2، تاريخ مراجعة النشرة:١١ فبراير ٢٠١٤
للإبلاغ عن أي تأثيرات سلبية أو جانبية مرتبطة بأي منتج من منتجات جلاكسوسميث كلاين، يُرجى اتصا بنا على
"contactus-me@gsk.com"