

نشرة دوائية : معلومات للمستهمل

في الحالات التالية قد تتخلّب إدارة داء السكري الذي تعاني منه عناية كبيرة:

- إذا كنت مريضاً أو مصاباً بإصابة كبيرة من الممكن أن يرتفع معدّل السكر

في دمك (فرط سكر الدم).

- إذا كنت لا تتناول كمية كافية من الطعام، قد ينخفض كثيراً معدل السكر

في دمك (تدنّي سكر الدم).

استحتاج إلى طبيب في أكثرية الحالات، **إحرص على الاتصال بسرعة كبيرة بطبيب**، إذا كنت تعاني من داء السكري من النوع 1 (داء السكري المعتمد على الأنسولين)، لا توقفت أبداً لأشخاص الذين يعشون بك أو بماحولك إنك تحتاج إلى الأنسولين. دائماً لأشخاص الذين يعانون من داء السكري من النوع الثاني منذ أمد طويل ومن مرض في القلب أو عاونا من سكتة سابقة وعلوجوا بالبيوغلبتازون والأنسولين يقصرو في القلب، أعلم الطبيب في أسرع وقت ممكن إذا أصبت بعارض قصور القلب مثل ضيق نفس غير اعتيادي أو زيادة سريعة في الوزن أو تورّم موضعي (أودما).

الأدوية الأخرى وإنسومان رايبد

يسبّب بعض الأدوية تغييراً في معدل سكر الدم (انخفاض أو ارتفاع أو الاثنان معاً حسب الحالة). في كل حالة، من الضروري ضبط عيار الأنسولين الذي تأخذه لتفادي معدلات السكر المرتفعة جداً أو المنخفضة جداً.
هكذا فحداً عندما تبدأ بتناول دواء

آخر وعندما تؤقفه كذلك.

أعلم طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً أي أدوية أخرى.

قبل أن تتناول أي دواء، أسأل طبيبك إن كان يمكن أن يؤثّر هذا الدواء على معدل السكر في دمك وعن أي إجراءعليك اتخاذه، في حال وجوده.

- الأدوية التي قد تسبب بتدنّي في معدل السكر في دمك (نقص سكر الدم) تتضمّن،**
 - كافة الأدوية الأخرى لعلاج السكري،
 - مُثبّطات الأّزيم للمحوّل للألجوبوتنسين ACE (التي تُستعمل لعلاج بعض أمراض القلب و ضغط الدم المرتفع)،
 - الديزويبيراميد (الذي يُستعمل لعلاج بعض أمراض القلب)،
 - الفلوكسيتين (الذي يُستعمل لعلاج الاكتئاب)،
 - الفايريمت (الذي يُستعمل لتخفيض المستويات العالية من شحوم الدم)،
 - مُثبّطات الأكسيداز الأحادي الأمين (التي تُستعمل لعلاج الاكتئاب)،
 - البنّيوكسيفيلين والبريوكسيفين والسالييسيلات (مثل الأسبيرين المستعمل لتخفيف الألم وتخفيض الحمّى)،
 - المضادات الحيويّة من السلفوناميد.

- الأدوية التي قد تسبب بارتفاع في معدل السكر في دمك (فرط سكر الدم)تتضمّن،**
 - الستيرويدات القشرية (مثل "الكورتيزون" الذي يُستعمل لعلاج التهاب)،
 - الدايازوليم (دواء يعمل على الإياضة)
 - الديازوكسيد (الذي يُستعمل لعلاج ضغط الدم المرتفع)،
 - مدرات البول (التي تُستعمل لعلاج ضغط الدم المرتفع أو احتباس السوائل المفرط)،
 - الفلوكازون (هورمون بتركياسي يُستعمل لعلاج نقص سكر الدم الحاد)،
 - الإيزونيازيد (الذي يُستعمل لعلاج السلّ)،
 - الاستروجين والبروجستوجين (مثلاً حبة منع الحمل)،
 - مشتقات الفينوثايزين (التي تُستعمل لعلاج الاضطرابات النفسية)،
 - السوماتروبين (هرمون النموّ)،
 - أدوية مقفّد الودي (مثلاً إبيبنفرين [أدرينالين] أوساليتامول أو تريوتالين المستعمل لعلاج الربو)،
 - الهورمونات الدرقية (التي تُستعمل لعلاج الاضطرابات الغدّة الدرقية)،
 - مُثبّطات البروتياز (التي تُستعمل لعلاج فيروس نقص المناعة البشري)،
 - الأدوية المضادة للذهان اللاانمطيّة (مثل الألتريزين والكليزابين).

قد ينخفض معدّل السكر في دمك أو يرتفع إذا أخذت،

- حاصرات بيتا (تُستعمل لعلاج ضغط الدم المرتفع)،
- الكولويدين (الذي يُستعمل لعلاج ضغط الدم المرتفع)،
- أملح الليثيوم (التي تُستعمل لعلاج الاضطرابات النفسية)،
- قد يسبب البيتاامينين (التي يُستعمل لعلاج بعض حالات الحمل مثل الطفيليات)نقص سكر الدم وقد يتبهم أحياناً فرط سكر الدم.
- إن حاصرات البيتا مثل أدوية مقفّد الودي الأخرى (كالكلويدين والفونايثيدين والرّازبين) قد تضغط عوارض التحذير الأولى التي تساعد على التصرّف إلى نقص سكر الدم أو قد تضغطها تماما.
- إن لم تكن واتقاً مما إذا كنت تتناول أحد هذه الأدوية أو لا، إسأل طبيبك أو الصيدلي.

دواعي الاستعمال العلاجيّة

يُستعمل إنسومان رايبد لتخفيض معدّل السكر العالي في الدم لدى المرضى الذين يعانون من داء السكري ويحتاجون إلى علاج بالأنسولين.
السكري هو مرض لا يفرّز فيه جسمك ما يكفي من الأنسولين للتحكّم بمعدل السكر في الدم، ومن الممكن استعمال إنسومان رايبد كذلك لعلاج الغيبوبة الناتجة عن فرط سكر الدم (غيبوبة تسببها نسبة كبيرة جدًا من السكر في الدم) والحمّاض الكيتوني (تراكم الحمض في الدم لأنّ الجسم يحلّل بدن السكر) وللتحكّم بسكر الدم قبل الجراحة وخلالها وبعدها.

- ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال إنسومان رايبد**

موانع الاستعمال

لا تستعمل إنسومان رايبد

إذا كان لديك حساسية تجاه الأنسولين أو تجاه أحد مكّنات هذا الدواء الأخرى (المذكورة في القسم 6).

محاذير الاستعمال: تحذيرات خاصة

تحذيرات ومحاذير

تحدّث إلى الطبيب أو الصيدلي أو الممرّض (ة) قبل استعمال إنسومان رايبد.

الرجاء أن تتدبّب بدقة بتعليمات الطبيب المتعلقة بمقدار الجرعة والمراقبة (فحوصات الدم والبول) والنظام الغذائي والنشاط البدني (العمل والتمارين الرياضية).
إذا كنت تعاني من حساسية تجاه هذا الدواء أو تجاه الأنسوليات الحيوانية، تحدّث إلى طبيبك.

المجموعات الخاصة من المرضى

إذا كنت تعاني من مشاكل في الكبد أو الكليتين أو إذا كنت متقدماً في السن، تحدّث إلى طبيبك لأنك قد تحتاج إلى جرعات أدنى من الأنسولين.

السفر

قبل أن تسافر، استشر طبيبك ليعطيك معلومات حول الأمور التالية:

- توافر الأنسولين الذي ستعمله في البلد الذي تزوره،

- التزوّد بالأنسولين، بالحقن، إلخ..

- الطريقة الصحيحة لحفظ الأنسولين خلال السفر،

- توقيت الوجبات وأخذ الأنسولين خلال السفر.

-الأثار الممكنة الناتجة عن التغيير إلى مناطق زمنية مختلفة.

- المخاطر الصحية الممكنة الجديدة في البلدان التي ستزورها.

- إذا عليك أن تفعل في الحالات الطارئة عندما تشعر بتوقّف أو عندما تمرض.

- يقول لك متى عليك التحقق من معدل السكر في دمك وإن كنت تحتاج

إلى إجراء فحوصات بول؛

- يقول لك متى قد تحتاج إلى حقن جرعة أعلى أو أدنى من إنسومان رايبد.

قد تؤثر عوامل كثيرة على معدل السكر في دمك، يجب عليك أن تعرف هذه العوامل

كي تكون قادراً على التصرف بطريقة صحيحة حيال التغييرات في معدل السكر في دمك فتقول دون ارتفاعه أو تدنّيه كثيراً.
راجع الإطاز في نهاية هذه النشرة لمزيد من المعلومات.

عدد مرّات الاستعمال

يُحقن إنسومان رايبد تحت الجلد قبل الطعام بـ 15 إلى 20 دقيقة.

طريقة الاستعمال

إنسومان رايبد هو محلول للحقن تحت الجلد أو في ظروف استثنائية داخل وريد (وعاء دموي). سوف يريك طبيبك المكان في الجلد حيث عليك أن تحقن الأنسولين. مع كل حقنة، يُغبر موقع الوخز ضمن المنطقة المحددة من الجلد التي تستعملها.

يتطلّب حقن الأنسولين في الوريد لمعالجة فرط سكر الدم الحاد والحماض الكيتوني مثلاً، خبرة وتدابير سلامة خاصة، لهذه الأسباب، يجب أن يتمّ ذلك في عيادة أو في مكان مناسب.

لا تستعمل إنسومان رايبد في مضخات أنسولين – فمستحضرات خاصة من الأنسولين متوافرة للاستعمال في هذه الأجهزة. لا تستعمله كذلك في مضخات معجيّة مع أنابيب من السيليكون.

كيفية استعمال الخراطيش

تُستعمل خراطيش إنسومان رايبد مع أقلام أوبتيبين أو كليكستار أو تاكيتين أو أوتوبين 24 أو أولستار للتأكد من أنك تحصل على الجرعة الصحيحة. قد لا تكون كل الأقلام هذه مسوّقة في بلدك. يجب استعمال القلم حسب التوصيات الواردة في المعلومات المرزّدة من مصنعّ القلم. يجب اتباع تعليمات استعمال القلم التي يزوّدها مصنعّ بدقة لتحميل التحميل وتعليق إبرة الحقن وحقن الأنسولين.
إحفظ الخروطشة في حرارة الغرفة لساعة أو ساعتين قبل إحداها قبل الحقن. أنظر إلى الخروطشة قبل أن تستعملها. استعمالها فقط إذا كان المحلول صافياً وبيون لون ولا يحتوي على جزيئات صلبة ظاهرة وله تماسك المياه.

عناية خاصة قبل الحقن

قبل الحقن، أزل أي فقاعات هواء (راجع تعليمات استعمال القلم). وتأكد من أن لا الكحول ولا أي مطهرات أو مواد أخرى تطوّث الأنسولين.

- لا تعد تعبئة أو استعمال الخراطيش الفارغة.

- لا تضف أي أنسولين آخر إلى الخروطشة.

- لا تمزج إنسومان رايبد مع أي أدوية أخرى.

مشاكل مع قلم الحقن

الرجاء مراعاة تعليمات المصنّع للاستعمال القلم.

إن كان قلم حقن الانسولين متضرراً أو لا يعمل بطريقة مناسبة (بسبب عيوب ميكانيكية) يجب أن يرمى، ويجب استعمال قلم أنسولين جديد.

إن كان قلم الحقن لا يعمل جيداً، يمكنك سحب الأنسولين من الخروطشة إلى داخل محقنة. لذلك، أبق معك محاقن وإبراً كذلك. ولكن لا تستعمل إلا المحاقن المخصصة لتركيز أنسولين من 100 وحدة دولية في المليلتر الواحد.

إذا استعملت كمية إنسومان رايبد أكبر من التي عليك استعمالها

- إذا **حقت كمية كبيرة من إنسومان رايبد**، قد تصاب بتدنّي سكر الدم، إفحص السكر في دمك تكراراً. بصودرة عامة، لتفادي تدنّي سكر الدم، يجب عليك أن تأكل أكثر وتراقب السكر في دمك. للمعلومات حول معالجة تدنّي سكر الدم، راجع الإطاز في نهاية هذه النشرة.

- لا تأخذ جرعة مزوجة للتعويض عن الجرعة التي سبقتها.

إذا نسيت استعمال إنسومان رايبد

- إذا **فوت جرعة إنسومان رايبد أولم تحقن ما يكفي من الأنسولين**.

قد يرتفع كثيراً معدل السكر في دمك (فرط سكر الدم). إفحص معدّل

السكر في دمك تكراراً. لمزيد من المعلومات حول فرط سكر الدم،

راجع الإطاز في نهاية هذه النشرة.

- لا تأخذ جرعة مزوجة للتعويض عن الجرعة التي سبقتها.

إذا توقفت عن استعمال إنسومان رايبد

قد يؤدّي هذا إلى إصابتك بفرط حاد في سكرّ الدم (معدّل مرتفع جداً من سكرّ الدم) وبالحماض الكيتوني (تراكم الحمض في الدم لأنّ الجسم يفتّت الشحوم بدل السكر). لا تتوقّف عن استعمال إنسومان رايبد بدون استشارة الطبيب الذي يسبقول لك ما عليك فعله.

إذا كان لديك أيّ أسئلة إضافية حول استعمال هذا الدواء، اطرحها على الطبيب أو الصيدلي أو الممرّض (ة).

الخلط بين الأنسوليات

يجب عليك دائماً التحقق من صافطة الأنسولين قبل كلّ عمليّة حقن لتفادي الخلط بين إنسومان رايبد وأنسوليات أخرى.

4. التأثيرات الجانبية المحتملة

مثل الأدوية كلّها، يمكن أن يسبّب هذا الدواء تأثيرات جانبية لا تصيب المرضى كلّهم.

التأثيرات الجانبية الأكثر خطورة

التأثيرات الجانبية غير الشائعة (قد تصيب حتّى مريض واحد من أصل 100)

- ارتكاس تحسسي حاد مع انخفاض في ضغط الدم** (صدمة)

التأثيرات الجانبية غير المعروف معدّل حصولها

(لا يمكن تقدير معدّل حصولها استناداً إلى البيانات المتوافرة)

- إنّ التأثير الجانبي الأكثر شيوعاً هو **توقف نقص سكر الدم (انخفاض معدّل السكر في الدم)**، قد يسبب نقص سكر الدم الحاد نوبة قلبية أو ضرراً في الدماغ وقد يهدّد الحياة. لمزيد من المعلومات حول التأثيرات الجانبية

لانخفاض سكرّ الدم أو لارتفاع سكرّ الدم راجع الإطاز في نهاية هذه النشرة.

- يمكن حصول **ارتكاسات تحسسية حادة** تجاه الأنسولين وقد تهدّد الحياة. يمكن أن تسبّب الارتكاسات هذه تجاه الأنسولين أو الأوسفة

ارتكاسات جلدية واسعة النطاق (ملتح وحكّة في أنحاء الجسم كلّه) وتورّماً حاداً في الجلد أو الأغشية العاطية (خزب وعائي) وضيق نفس ومبوماً في ضغط الدم مع تسارع في دقّات القلب وتعرّقاً.

التأثيرات الجانبية الأخرى

التأثيرات الجانبية الشائعة (قد تصيب حتّى مريض واحد من أصل 10)

الأودما

يمكن أن يسبّب العلاج بالأنسولين تراكمًا مؤقتًا للماء في الجسم مع تورّم في بطن الساقين والكاحلين.

- ارتكاسات في موقع الحقن

التأثيرات الجانبية غير الشائعة

- شرى في موقع الحقن (طفح يسبّب الحكّة)

التأثيرات الجانبية الأخرى غير المعروف معدّل حصولها

احتباس الصوديوم

- ارتكاسات بصريّة

يمكن أن يسبّب تغيير كبير (تحسّن أو تدهور) في التحكّم بمعدّل السكر في دمك تدهوراً مؤقتاً في بصرك. إذا كنت تعاني من اعتلال الشبكية الكاثري (مرض في العين سببه داء السكري)، قد تسبب نوبات نقص سكر الدم الحادة فقداً مؤقتاً في البصر.

- تغييرات جلديّة في موقع الحقن (الحثل الشحمي)

إذا حقنت الأنسولين لمزّات كثيرة في الموقع نفسه من الجلد، قد يتكسّف النسيج الدهنيّ تحت الجلد أو يصبح سميكاً. والأنسولين الذي تحقنّه في هذا الموقع قد لا يعطي مفعوله بشكل جيد. فتغيير الموقع مع كل عمليّة حقن قد يساعد على تفادي هذه التغييرات في الجلد.

الارتكاسات الجلديّة والتحسسية

قد تحصل زّدات قبل معدّلة أخرى في موقع الحقن (مثل احمرار موقع الحقن وبشكل

غير اعتيادي الألم الشديد في موقع الحقن والحكّة وتورّم موقع الحقنأو التهابه).

ويمكنها أيضاً أن تنتشر حول موقع الحقن. عادة ما تزول أكثرية ردّات الفعل الخفيفة تجاه الأنسولين في فترة تتراوح بين بضعة أيام وبضعة أسابيع.

- الاستعمال المضاد للأنسولين

قد يدفع العلاج بالأنسولين بالجسم إلى إنتاج أجسام مضادة للأنسولين (مواد مضادة للأنسولين). ولكن نادراً ما يتطلّب هذا تغييراً في جرعة الأنسولين التي تأخذها.

الإبلاغ عن التأثيرات الجانبية

إذا تعرّضت لأيّ تأثيرات جانبية تحدث إلى الطبيب أو الصيدلي أو الممرّضة. ويتضمّن هذا أيّ

تأثيرات جانبية محتملة غير مذكورة في هذه النشرة.

إن التبليغ عن التأثيرات الجانبية قد يساعد على تأمين معلومات اكبر حول سلامة هذا الدواء .

- كيف يُحفظ إنسومان رايبد**

إحفظ الدواء بعيداً عن نظر الأطفال ومتناولهم.

لا تستعمل هذا الدواء بعد تاريخ انقضاء تاريخ الصلاحية المدوّن على عبلة الكرتون وعلى الصفاقة على الخروطشة بعد كلمة "EXP". يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من الشهر المذكور.

الخراطيش غير المفتوحة

إحفظ الدواء في البرّاد بين درجتين مئويتين و 8 درجات مئوية. لا تتجمّعه. لا تضع إنسومان رايبد قرب الثلاجة أو حجرة تجميد.
إحفظ الخروطشة في عبليتها الخارجية لحمايتها من النور.

الخراطيش قيد الاستعمال

عندما تصبح الخروطشة قيد الاستعمال (في قلم الأنسولين) أو عندما تُحمل كخروطشة جديدة، يمكن حفظها حتى 4 أسابيع كحدّ أقصى وفي حرارة لا تتعدى 25 درجة مئوية وبعيداً عن مصدر حرارة مباشر (مثلاً قرب وحدة تدفئة) أو النور المباشر (نور الشمس المباشر أو قرب مصباح). يجب عدم حفظ الخروطشة قيد الاستعمال في البراد. لا تستعمل الخروطشة بعد المدة الزمّنية هذه. لا ينبيّه رمز الأدوية في مجاري الصرف الصحيّ أو مع النفايات المنزليّة العادية.
إسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد بحاجة إليها، ضمن شأن هذه الإجراءات لحماية البيئة.

- محتوى العبوة ومعلومات أخرى**

ماذا يحتوي إنسومان رايبد

المادة الفاعلة هي الأنسولين البشري. يحتوي ميليلتر واحد من إنسومان رايبد

على 100 وحدة دولية من المادة الفاعلة الأنسولين البشري.

- المكونات الأخرى هي: ميثاكريلول، فوسفات أحادي الصوديوم ذو جزئيّي الماء، غليسيرول، هيدروكسيد الصوديوم (راجع القسم 2 "معلومات مهمّة حول بعض مكّنات إنسومان رايبد"، حامض الهيدروكلوريك (لضبط الرقم الهيدروجيني) وماء للحقن.

كيف هو شكل إنسومان رايبد ومحتويات العبوة الخارجيّة

إنسومان رايبد هو محلول صاف وديم اللون للحقن ولا يحتوي على جزيئات صلبة ظاهرة وله تماسك الماء.

فرط سكرّ الدم ونقص سكرّ الدم

إحمل معك دائماً بعض السكر (20 غراماً على الأقلّ). ! إحمل معك بعض المعلومات التي تُظهر أنّك مصاب بداء السكّري.

فرط سكرّ الدم (مستويات عالية من سكرّ الدم)

إذا كان معدل السكر في دمك مرتفعاً جداً (فرط سكر الدم)، قد لا تكون حقنت

كميّة كافية من الأنسولين.

لماذا يحصل فرط سكرّ الدم؟

- إذا لم تحقن الأنسولين أو لم تحقن كمية كافية منه أو إذا أصبح الأنسولين أقلّ فعالية، بسبب طريقة حفظ خاطئة مثلاً؛

- لا يعمل قلم الأنسولين بشكل جيد.

- إذا كنت تمارس الرياضة أقلّ من العادة، أو كنت تعاني ضغطاً (ضيق إنفعالي، إثارة) أو

إذا تعرّضت لإصابة أو خضعت لجراحة أو أصبت بجمخ أو أصبت بالحمى؛

- إذا كنت تتناول أو تناولت بعض الأدوية الأخرى (راجع في القسم 2 "الأدوية الأخرى وإنسومان بازال")،

- إذا عبّرت المنطقة من الجلد التي تحقن فيها الأنسولين (مثلاً من الفخذ

إلى أعلى الذراع)؛

- إذا كنت تعاني من مرض حاد في الكليتين أو الكبد أو من مرض آخر

عوارض التحذير الخاصة بفرط سكرّ الدم

الشعور بالثمأ والحاجة المتزايدة للتبول والتعب وجفاف البشرة واحمرار الوجه وفقدان الشهية وضغط الدم المنخفض وضربات القلب السريعة ووجود غلوكوز

وأجسام كيتون في البول، وقد يكون ألم المعدة والنفس السريع والعميق والتماس السكر). لا تتوقّف عن استعمال إنسومان رايبد بدون استشارة الطبيب الذي يسبقول لك ما عليك فعله.

ما الذي يجب عليك فعله إذا واجهت فرط سكرّ الدم

إفحص معدل السكر في دمك ووجود الكيتون في بولك حالما يظهر أيّ من العوارض أعلاه، ويجب دائماً أن يعالج طبيب، في المستشفى عادة، فرط سكر الدم الحاد أو الحماض الكيتوني.

نقص سكرّ الدم (مستويات منخفضة من سكرّ الدم)

إذا انخفض معدّل السكر في دمك كثيراً قد تفقد الوعي. قد يسبّب نقص سكرّ الدم الخطير نوبة قلبية أو ضرراً في الدماغ وقد يهدّد الحياة. عادة يجب عليك أن تعرف متى ينخفض السكر في دمك كثيراً لكي تأخذ الإجراءات الصحيحة.

لماذا يحصل نقص سكرّ الدم؟

- تتضمّن الأمثلة:

- إذا حقنت كمية كبيرة من الأنسولين؛
- إذا فوتت وجبات أو آخرتها؛
- إذا كنت لا تأكل كمية كافية من الطعام أو إذا تناولت طعاماً يحتوي على كمية من هدرات الكربون أقلّ من الكمية العادية (السكر والمواد المماثلة له تُسمّى هدرات الكربون؛ لكنّ المحلّيات الاصطناعية ليست من هدرات الكربون)؛

الشركة حاملة رخصة التسويق والشركة المصنّعة

يأتي إنسومان رايبد في خراطيش تحتوي على 3 مل من المحلول (300 وحدة دولية).

تتوافر علب من 3 و 4 و 5 و 6 و 9 و 10 خراطيش من 3 مل. قد لا تكون أحجام العلب كلّها مسوّقة.

شركة حاملة رخصة التسويق والشركة المصنّعة <p>Sanofi-Aventis Deutschland GmbH D-65926 Frankfurt am Main Germany</p>
--

تاريخ المراجعة الأخيرة لهذه النشرة فيول 2013.

رقم التسجيل: 03/14B153/230

إن هذا الدواء

مستحضر يولثر على صحتك و استهلاكه خلافا لتعليمات يعرضك للخطر.

اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها و تعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.

- الطبيب و الصيدلي هما الخبيران في الدواء و في نفعه و ضرره

- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك

- لا تترك صرف الدواء بدون استشارة الطبيب

- لا تردّ الأدوية في متناول الأطفال

مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيدالة العرب.

THIS MEDICAMENT

Is a product, which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.

Follow strictly the doctor’s prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament.

- The doctor and the pharmacist are the experts in medicines, their benefits and risks.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
- Keep all medicaments out of reach of children.

Council of Arab Health Ministers, Union of Arab Pharmacists.