

النشرة الداخلية:
نشرة معلومات المستخدم
أقراص ديفال 30 ملغ
ديفلازاكورت

اقرأ هذه النشرة بالكامل بعناية قبل أن تبدأ استعمال هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة.

- احتفظ بهذه النشرة وقد تحتاج إلى قراءتها مرة أخرى.
- إذا كنت لديك أية أسئلة إضافية ، اسأل طبيبك أو الصيدلاني الخاص بك.
- تم وصف هذا المنتج الدوائي لك فقط فلا تعطيه لأشخاص آخرين لأنه قد يضرهم ، حتى وإن كانت أعراض مرضهم مماثلة لأعراضك.
- إذا تعرضت لأيّة آثار جانبية، تحدث بشأنها مع طبيبك أو الصيدلاني الخاص بك.
- ويشمل ذلك أيّة آثار جانبية محتملة غير واردة في هذه النشرة.

ما الذي تتضمنه هذه النشرة:

1. ما هو ديفال وما هي دواعي استخدامه
2. ما الذي تحتاج لمعرفة قبل تناول ديفال
3. كيف تتناول ديفال
4. الآثار الجانبية المحتملة
5. كيف تخزن ديفال
6. محتويات العبوة ومعلومات أخرى

1. ما هو ديفال وما هي دواعي استخدامه

ينتمي ديفال إلى فئة من الأدوية تعرف باسم الكورتيكوستيرويد، وهي ذات خواص مضادة للالتهاب ومضادة للحساسية.

وهو ذا مستوى أمان مختلف حيث أن تقاطعه مع الأيض الكريوهرتالي وتأثيره الكورتيكومعني يقل عن أدوية الكورتيكوستيرويد الأخرى.

- يوصف ديفال لعلاج ما يلي:
- الأمراض الروماتيزمية والكلو لاجينية.
 - الأمراض الجلدية.
 - أمراض الحساسية: الربو الشعبي الذي لا يستجيب للعلاج التقليدي.
 - أمراض الجهاز التنفسي .
 - أمراض العيون.
 - أمراض الدم.
 - أمراض الجهاز الهضمي.
 - أمراض الكبد.
 - أمراض الثدي.

2. ما الذي تحتاج لمعرفته قبل تناول ديفال

- لا تستعمل ديفال في الحالات التالية:
- إذا كنت تعاني من حساسية (مفرط التحسس) تجاه ديفلازاكورت أو أي من المكونات الأخرى في هذا الدواء (انظر القسم 6).
 - إذا كنت تعاني من قرحة بالمعدة.
 - إذا كنت تعاني من عدوى بكتيرية (مثل نشط) أو فيروسية (إصابة العين بالهربس البسيط، الهربس النطاقي، الجدري) أو من العدوى العامة التي يسببها الفطريات.
 - إذا كنت على وشك تلقي لقاح أو إذا تلقيت لقاحاً بالفعل مؤخراً.

التحذيرات والاحتياطات

احترس بشكل خاص عند تناول ديفال

- أخبر طبيبك إذا كنت تعاني من أي مرض قلبي، أو فشل القلب الاحتقاني، ارتفاع ضغط الدم، أو أمراض الانسداد التجديدي (أي تحدث بسبب الجلطات الدموية)، أو أمراض المريء، أو المعدة أو الأمعاء، أو أداء السكري، أو الاضطرابات العاطفية، أو اضطرابات الأذن، أو الصرع، أو الغلوكوما في العين (المياه الزرقاء)، أو قصور الدرقية (قصور الغدة الدرقية) و/أو تلف الكبد.
- يجب تعديل جرعة أدوية الكورتيكوستيرويد في حالات خاصة (الجراحة، والتهابات، وغيرها).
- وإذا يجب أن يعرف الطبيب ما إذا كان المريض يعاني من أي مرض.
- بالنسبة للأطفال، قد يتسبب استعمال هذا الدواء لفترات طويلة في إيقاف نموه وتطورهم.
- بعد العلاج الطويل الامد باستعمال ديفال، يجب تخفيض الجرعة تدريجياً.
- لا تتوقف عن تناول هذا الدواء دون التحدث مع طبيبك أولاً.

تحدث مع طبيبك قبل تناول هذا الدواء.

الاستعمال مع اليرباضيين

يجب تحذير المرضى بأن هذا الدواء يحتوي على ديفلازاكورت، وهو مركب قد يعطي نتائج إيجابية في اختبارات مكافحة المنطحات.

الأدوية الأخرى و ديفال

- أخبر طبيبك أو الصيدلاني الخاص بك إذا كنت تتناول حالياً أو تناولت مؤخراً أو قد تتناول أية أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية التي تصرف دون وصفة طبية.
- على وجه الخصوص، يجب أن تخبر طبيبك أو الصيدلاني الخاص بك إذا كنت تتناول أيًا من الأدوية المذكورة أدناه، لأن ديفال قد يتفاعل معها.
- الأدوية السكرية: لأنك قد تحتاج إلى تغيير الجرعة الجركة.
 - المضادات الحيوية (ريفامبيسين): لأنها قد تخفف من تأثير ديفال.
 - مركبات الكورتكوجين أو موانع الحمل الفموية: لأنها قد ترفع من تأثير ديفال.
 - الأدوية التي تسبب ارتخاء العضلات: لأن تأثير الاسترخاء قد يصبح أطول.
 - مضادات الكوليسترول: التي تستخدم في حالات الوهن العصلي.
 - اللقاحات وتكسين الموهن: لأن أدوية الكورتيكوستيرويد تقلل من الاستجابة المناعية.
 - أدوية الصرع والأدوية التي تستخدم في علاج الأمراض النفسية (فينوبارين، فينوباربیتال): لأنها قد تقلل من تأثير ديفال.

الحمل والرضاعة الطبيعية و الخصوية:

يجب عدم استخدام ديفال في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل ما لم يرى الطبيب أن الفوائد المرجوة تفوق المخاطر المحتملة.

ملحوظة مهمة للنساء:

إذا كنت حاملاً أو ترضعين طفلاً، أو إذا اعتقدت أنك قد تكونين حاملاً، أو إذا كنت تخططين للإنجاب، اطلبي المشورة من طبيبك أو الصيدلي قبل استعمال هذا الدواء.

وقد يكون استعمال الأدوية أثناء الحمل خطراً على الجنين ويجب مراقبته لذلك من قبل طبيبك.

ينتقل ديفال عبر لبن الأم، وبالتالي، لا ينصح باستعماله أثناء الرضاعة الطبيعية.

القيادة واستخدام الآلات

على الرغم من عدم وجود معلومات حول ذلك، إلى أن تتأكد من أن الاستجابة للدواء مقبولة، ننصح بعدم القيام بأعمال تتطلب انتباهاً خاصاً، مثل قيادة السيارات واستعمال المعدات الخطرة، وغيرها.

يحتوي هذا الدواء على اللاكتوز:

تحتوي أقراص ديفال 30 ملغ على اللاكتوز. إذا أشار طبيبك أنك تعاني من عدم تحمل أنواع معينة من السكريات، ينبغي أن نسأله قبل استعمال هذا الدواء.

3. كيف تتناول ديفال

تناول هذا الدواء تماماً بالطريقة التي أخبرك بها طبيبك. واستشر طبيبك أو الصيدلاني إذا لم تكن متأكدًا. يعطى هذا الدواء عن طريق الفم. سوف يخبرك طبيبك بعدد الأقراص التي يجب عليك تناولها وعدد المرات. ويتم تحديد الجرعة بصورة فردية لكل مريض وقد يقوم الطبيب بتغييرها حسب استجاباتك للعلاج.

في حالة تناول ديفال بكمية تزيد عن المطلوب يجب:

في حالة تناول جرعة زائدة أو ابتلاع الدواء بالخطأ، اتصل بخدمة معلومات السموم، ذاكرة اسم الدواء والكمية التي تم تناولها ثم اذهب فوراً إلى المستشفى للحصول على العلاج الملائم.

إذا نسيت تناول ديفال

لا تتناول جرعة مضاعفة لتعويض الجرعات التي نسيتها.

إذا توقفت عن استعمال ديفال

إذا كنت لديك أية أسئلة أخرى بخصوص استعمال هذا الدواء، اطرحها على طبيبك أو الصيدلاني الخاص بك.

الآثار الجانبية المحتملة

مثل جميع الأدوية، قد يسبب ديفال آثار جانبية، علماً أنها لا تحدث عند الجميع. فيما يلي هي الآثار الجانبية الأساسية لديفال التي لوحظت بشكل عند استعمال العلاج لفترة طويل توهي

- اضطراب آبات الجهاز الهضمي: قرحة الجهاز الهضمي.
 - اضطراب آبات الجهاز العصبي: الصداع، الدوار، الأرق، اضطرابات في النوم.
 - اضطراب آبات الجلد والأمسجة تحت الجلدية: مشاكل الالتئام، تضمر البشرة.
 - الاضطرابات القلبية والوعائية: ارتفاع ضغط الدم، احتباس الماء في الأنسجة (الوذمة).
 - اضطراب آبات الغدد الصماء: زيادة الوزن، تقادم مرض السكري، اختفاء الطمث.
 - الاضطرابات العضلية الهيكلية واضطرابات التنسج الضام والعظام: ضعف العضلات، هشاشة العظام.
 - اضطراب آبات العيون: مشاكل العيون.
- قد يؤدي استعمال ديفال مع الأدوية الأخرى التي تنتج استرخاء العضلات، خاصة عند تناول جرعات عالية لفترة طويلة، إلى اضطرابات عضلية حادة.
- وإذا تعرضت لأيّة آثار جانبية، تحدث مع طبيبك أو الصيدلاني الخاص بك.
- ويشمل ذلك أيّة آثار جانبية محتملة غير واردة في هذه النشرة.

5. كيف تخزن ديفال

يحفظ في درجة حرارة أقل من 30 مئوية.

يحفظ بعيداً عن متناول وأعين الأطفال.

لا تستعمل هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على العبوة.

وتاريخ انتهاء الصلاحية هو آخر يوم في الشهر المذكور.

لا تتخلص من أية أدوية عن طريق مياه الصرف أو الفضلات المنزلية.

ضيم العوات والأدوية التي لم تعد بحاجة إليها في المكان المخصص لإعادة تدوير الأدوية في الصيدلية.

وإذا كنت غير متأكد، اسأل الصيدلاني الخاص بك عن كيفية التخلص من العبوات والأدوية التي لم تعد بحاجة إليها.

وسوف تساعدك هذه التوجيهات في حماية البيئة.

6. محتويات العبوة ومعلومات أخرى

ما الذي تحتوي عليه أقراص ديفال 30 ملغ

المادة الفعالة هي ديفلازاكورت. ويحتوي كل قرص على 30 ملغ من الديفلازاكورت. المكونات الأخرى هي أحادي هيدرات اللاكتوز ونشا الذرة والسيولوز دقيق التبلور وستيرات المنسويوم.

ما هو شكل أقراص ديفال 30 ملغ وما هي محتويات العبوة:

أقراص مستديرة بيضاء غير المصقولة، على أحد جانبيها علامة الصليب وعلى الجانب الآخر رقم 30.

يمكن تقسيم القرص إلى جزأين متساويين.

يتم تعبئة أقراص ديفال 30 ملغ في شرائط ألومنيوم وكلوريد متعدد الفينيل (PVC)

ويتم توفيرها في عبوات تحتوي كل منها على 10 قرصاً.

أشكال أخرى لتقديم الدواء

أقراص ديفال 6 ملغ: عبوة تحتوي على 20 أقراص من ديفلازاكورت 6 ملغ.

ديفال فطرات فمية 22.75 ملغ/مل، مستعلق: زجاجة تحتوي على 13 مل مستعلق وفطارة.

حامل ترخيص التسويق والشركة المصنعة

فايس فارما، شركة مساهمة

ماكسيمو أجيري، 14

48940 ليوا. إسبانيا

آخر مراجعة للنشرة كانت في: نوفمبر/ كانون الثاني 1999

هذا منتج دوائي

الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات

يعرضك للخطر

اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها

وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك

الطبيب والصيدلاني هما الخياران بالدواء وينفعه وضرره

لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك

لا تكرر صرف الدواء بدون وصف طبيب

لا تترك الادوية في متناول ايدي الاطفال

مجلس وزراء الصحة العرب

واتحاد الصيدلة العرب