

النشرة الداخلية:

نشرة معلومات المستخدم

ديفال قطرات محلول عن طريق الفم 22.75 مل/مل
ديفلازاكورت

- اقرأ هذه النشرة بالكامل بعناية قبل أن تبدأ استعمال هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة.
- احتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج إلى قراءتها مرة أخرى.
- إذا كانت لديك أية أسئلة إضافية، اسأل طبيبك أو الصيدلاني الخاص بك.
- تم وصف هذا المنتج الدوائي لك فقط فلا تعطيه لأشخاص آخرين لأنه قد يضرهم، حتى وإن كانت أعراض مرضهم مماثلة لأعراضك.
- إذا تعرضت لأيّة آثار جانبية، تحدث بشأنها مع طبيبك أو الصيدلاني الخاص بك.
- ويشمل ذلك أية آثار جانبية محتملة غير وأردة في هذه النشرة.

ما الذي تتضمنه هذه النشرة:

1. ما هو ديفال وما هي دواعي استخدامه
2. ما الذي تحتاج معرفته قبل تناول ديفال
3. كيف تتناول ديفال
4. الآثار الجانبية المحتملة
5. كيف تخزن ديفال
6. محتويات العبوة ومعلومات أخرى

1. ما هو ديفال وما هي دواعي استخدامه

ينتمي ديفال إلى فئة من الأدوية تعرف باسم الكورتيكوستيرويد، وهي ذات خواص مضادة للالتهاب ومضادة للحساسية.

وهو ذا مستوى أمان مختلف حيث أن تفاعله مع الأرض الكروميهيدراتي وتأثيره الكورتيكومعدي يقل عن أدوية الكورتيكوستيرويد الأخرى.

يوصف ديفال لعلاج ما يلي:

- الأمراض الروماتيزمية والكلوجينية.
- الأمراض الجلدية.
- أمراض الحساسية: الربو الشعبي الذي لا يستجيب للعلاج التقليدي.
- أمراض الجهاز التنفسي .
- أمراض العيون.
- أمراض الدم.
- أمراض الجهاز الهضمي.
- أمراض الكلى.
- أمراض الكبد.

2. ما الذي تحتاج معرفته قبل تناول ديفال

لا تستعمل ديفال في الحالات التالية:

- إذا كنت تعاني من حساسية (مفرط الحس) تجاه ديفلازاكورت أو أي من المكونات الأخرى في هذا الدواء (انظر القسم 6).
- إذا كنت تعاني من قرحة بالمعدة.
- إذا كنت تعاني من عدوى بكتيرية (سل نشط) أو فيروسية (إصابة العين بالهربس البسيط، الهربس النطاقي، الجدري) أو من العدوى العامة التي سببها الفطريات.
- إذا كنت على وشك تلقي لقاح أو إذا تلقيت لقاحاً بالفعل مؤخراً.

التحذيرات والاحتياطات

احترس بشكل خاص عند تناول ديفال

- أخير طبيبك إذا كنت تعاني من أي مرض قلبي، أو فشل القلب الاحتقاني، ارتفاع ضغط الدم، أو أمراض الاستسداد التجدي (التي تحدث بسبب الجلطات الدموية)، أو أمراض المريء، أو المعدة أو الأمعاء، أوداء السكري، أو الاضطرابات العاطفية، أو اضطرابات الذهان، أو الصرع، أو الغلوكوما في العين (الياه الزرقاء)، أو قصور الدرقية (قصور الغدة الدرقية) و/أو تلف الكبد.
- يجب تعديل جرعة أدوية الكورتيكوستيرويد في حالات خاصة (الجراحة، والالتهابات، وغيرها)، ولذا يجب أن يعرف الطبيب ما إذا كان المريض يعاني من أي مرض.
- بالتمسك للأطفال، قد يستبب استعمال هذا الدواء لفترات طويلة في إيقاف نموه وتطوره .
- بعد العلاج الطويل الامد باستعمال ديفال، يجب تخفيض الجرعة تدريجياً.
- لا تتوقف عن تناول هذا الدواء دون التحدث مع طبيبك أو لا.

تحدث مع طبيبك قبل تناول هذا الدواء.

الاستعمال مع الرياضيين

يجب تحذير المرضى بأن هذا الدواء يحتوي على ديفلازاكورت، وهو مركب قد يعطي نتائج إيجابية في اختبارات مكافحة المنشطات.

الأدوية الأخرى و ديفال

- أخير طبيبك الصيدلاني الخاص بك إذا كنت تتناول حالياً أو تناولت مؤخراً أو قد تتناول أية أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية التي تصرف دون وصفة طبية.
- على وجه الخصوص، يجب أن تخبر طبيبك أو الصيدلاني الخاص بك إذا كنت تتناول أيًا من الأدوية المذكورة أدناه، لأن ديفال قد يتفاعل معها.
- أدوية السكري: لذلك قد تحتاج إلى تغيير الجرعة الجرة.
- المضادات الحيوية (ريفامبيسين): لأنها قد تخفف من تأثير ديفال.
- مركبات الأستروجين أو موانع الحمل الفموية: لأنها قد ترفع من تأثير ديفال.
- الأدوية التي تسبب ارتخاء العضلات: لأن تأثير الاسترخاء قد يصبح أطول.
- مضادات الكولينستراز التي تستخدم في حالات الزهن العضلي.
- اللقاحات وتكسين الموه: لأن أدوية الكورتيكوستيرويد تقلل من الاستجابة المناعية.
- أدوية الصرع والأدوية التي تستخدم في علاج الأمراض النفسية (فينيتوين، فينوباربيتال): لأنها قد تقلل من تأثير ديفال.

الحمل والرضاعة الطبيعية والخصوبة:

يجب عدم استخدام ديفال في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل ما لم يرى الطبيب أن الفوائد المرجوة تفوق المخاطر المحتملة.

ملحوظة مهمة للنساء:

إذا كنت حاملاً أو ترضعين طفلاً، أو إذا اعتقدت أنك قد تكونين حاملاً، أو إذا كنت تخططين للإجهاض، اطلبي المشورة من طبيبك أو الصيدلي قبل استعمال هذا الدواء. وقد يكون استعمال الأدوية أثناء الحمل خطراً على الجنين ويجب مراقبته ذلك من قبل طبيبك. ينتقل ديفال عبر لبن الأم، وبالتالي، لا ينصح باستعماله أثناء الرضاعة الطبيعية.

القيادة واستخدام الآلات

على الرغم من عدم وجود معلومات حول ذلك، إلى أن تتأكد من أن الاستجابة للدواء مقبولة، ننصح بعدم القيام بأعمال تتطلب انتباهاً خاصاً، مثل قيادة السيارات واستعمال المعدات الخطرة، وغيرها.

يحتوي هذا الدواء على السوربيتول.

تحتوي ديفال قطرات محلول عن طريق الفم 22.75 مل/مل و على السوربيتول (E-420) هذا الدواء يحتوي على السوربيتول. إذا كنت تعاني من عدم تحمل بعض السكريات، إستشر طبيبك قبل تناول هذا الدواء.

كيف تتناول ديفال

تناول هذا الدواء تماماً بالطريقة التي أخبرك بها طبيبك. واستشر طبيبك أو الصيدلاني إذا لم تكن متأكداً. يعطى هذا الدواء عن طريق الفم. سوف يخبرك طبيبك بعدد الجرعات التي يجب عليك تناولها وعدد المرات. ويتم تحديد الجرعة بصورة فردية لكل مريض وقد يقوم الطبيب بتغييرها حسب استجابتك للعلاج.

في حالة تناول ديفال بكمية تزيد عن المطلوب يجب:

في حالة تناول جرعة زائدة أو ابتلاع الدواء بالخطأ، اتصل بخدمة معلومات السموم، ذاكرة اسم الدواء والكمية التي تم تناولها لم اذهب فوراً إلى المستشفى للحصول على العلاج اللازم.

إذا نسيت تناول ديفال

إذا كنت قد نسيت تناول جرعة مضاعفة لتعويض الجرعات التي نسيتها.

إذا توقفت عن استعمال ديفال

إذا كانت لديك أية أسئلة أخرى بخصوص استعمال هذا الدواء، اطرحها على طبيبك أو الصيدلاني الخاص بك.

4. الآثار الجانبية المحتملة

مثل جميع الأدوية، قد يسبب ديفال آثار جانبية، علماً أنها لا تحدث عند الميع. فيما يلي هي الآثار الجانبية الأساسية لديفال التي لوحظت بشكل عند استعمال العلاج لفترة طويلة فهي:

- اضطرابات الجهاز الهضمي: قرحة الجهاز الهضمي.
 - اضطرابات الجهاز العصبي: الصداع، الدوار، الأرق، اضطرابات في النوم.
 - اضطرابات الجلد والأمسجة تحت الجلدية: مشاكل الانتئام، تضمر البشرة.
 - الاضطرابات القلبية والوعائية: ارتفاع ضغط الدم، احتباس الماء في الأنسجة (الوذمة).
 - اضطرابات الغدد الصماء: زيادة الوزن، تقادم مرض السكري، اختفاء الطمث.
 - الاضطرابات العائية الهيكلية والاضطرابات النسيج الضام والعظام: ضعف العضلات، هشاشة العظام.
 - اضطرابات العيون: مشاكل العيون.
- قد يؤدي استعمال ديفال مع الأدوية الأخرى التي تنتج استرخاء العضلات، خاصة عند تناول جرعات عالية لفترة طويلة، إلى اضطرابات عضلية حادة. وإذا تعرضت لأيّة آثار جانبية، تحدث مع طبيبك أو الصيدلاني الخاص بك. ويشمل ذلك أية آثار جانبية محتملة غير وأردة في هذه النشرة.

5. كيف تخزن ديفال

يخفظ في درجة حرارة أقل من 30 مئوية.

يخفظ بعيداً عن متناول وأعين الأطفال.

لا تستعمل هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على العبوة.

وتاريخ انتهاء الصلاحية هو آخر يوم في الشهر المذكور.

لا تتناول من أية أدوية عن طريق مياة الصرف أو الفضلات المنزلية.

ضع العبوات والأدوية التي لم تعد بحاجة إليها في المكان المخصص لإعادة تدوير الأدوية في الصيدلية.

وإذا كنت غير متأكد، اسأل الصيدلاني الخاص بك عن كيفية التخلص من العبوات والأدوية التي لم تعد بحاجة إليها.

وسوف تساعد هذه التدابير في حماية البيئة.

6. محتويات العبوة ومعلومات أخرى

ما الذي يحتوي عليه ديفال قطرات محلول عن طريق الفم 22.75 مل/مل المادة الفعالة هي ديفلازاكورت. ويحتوي كل 1 مل من المحلول على 22.75 ملغ من ديفلازاكورت أو كل قطرة من المحلول تحتوي على 1ملغ من ديفلازاكورت. المكونات الأخرى هي سوربيتول الحل 70٪ والصوديوم كاربوكسيميثيل السليلوز، الغثسييوم وسيليكات الألمونيوم، بوليوسوربات 80، كحول البنزيل، حامض الأسيتيك والماء النقي.

ما هو ديفال قطرات محلول عن طريق الفم 22.75 مل/مل وما هي محتويات العبوة:

ديفال قطرات محلول عن طريق الفم 22.75مل/مل هومحلول متجانس أبيض. هذا الدواء متاح في قوارير من الزجاج العنبري من حجم 20 مل مع غطاء من الألمنيوم. القارورة تحتوي على 13 مل من المحلول. كما يتم تضمين قطارة.

أشكال أخرى لتتبع الدواء

أقراص ديفال 30 ملغ: عبوة تحتوي على 10 أقراص من ديفلازاكورت 30 ملغ. أقراص ديفال 6 ملغ: عبوة تحتوي على 20 قرص من ديفلازاكورت 6 ملغ.

حامل ترخيص التسويق والشركة المصنعة

فاين فارما، شركة مساهمة

ماكسيمو أجيري، 14

48940 لنوا. إسبانيا

آخر مراجعة للنشرة كانت في: نوفمبر/ كانون الثاني 1999

هذا منتج دوائي

الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات

يعرضك للخطر

اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها

وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك

- الطبيب والصيدلاني هما الخياران بالدواء وينفعه وضرره
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصف طبيب
- لا تترك الادوية في متناول ايدي الاطفال

مجلس وزراء الصحة العرب

واتحاد الصيدلة العرب