

نشرة العبوة، معلومات للمريض

**إكسفيرا ٢٥٠ ملغم أقراص مغلفة بغيرلم**
داسابوفير

▼ هذا الدواء يخضع لمراقبة إضافية. سيسمح هذا الأمر بالتعرّف السريع على معلومات السلامة الجديدة. يمكنك المساعدة عن طريق الاحتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها مرة ثانية. الإبلاغ عن أي تأثيرات جانبية قد تصيبك. راجع نهاية القسم ٤ للاطلاع على طريقة الإبلاغ عن التأثيرات الجانبية.

**اقرأ هذه النشرة بعناية قبل البدء بتناول هذا الدواء، فهي تحتوي على معلومات هامة من أجلك.**
•احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها مرة ثانية.
•إذا كانت لديك أسئلة، فاطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو من الصيدلاني.
•لقد وصف هذا الدواء لك أنت فقط، لاتعطه للآخرين، فقد يسبب لهم الأذى حتى ولو كانت الأعراض التي يشكون منها هي نفس أعراضك.
•إذا أصبت بأي تأثير جانبي، فالرجاء إبلاغ طبيبك أو الصيدلاني. هذا يشمل أيضا أي تأثيرات جانبية محتملة وإن لم يرد ذكرها في هذه النشرة. راجع القسم ٤.

**ماذا يوجد في هذه النشرة**

١- ماهو إكسفيرا ولماذا يستعمل
٢- ما الذي يجب أن تعرفه قبل تناول إكسفيرا
٣- كيف تتناول إكسفيرا
٤- التأثيرات الجانبية المحتملة
٥- كيف تحتفظ ب إكسفيرا
٦- محتويات العبوة ومعلومات أخرى

## ١- ماهو إكسفيرا ولماذا يستعمل

إكسفيرا دواء مضاد للفيروسات يستعمل لعلاج البالغين المصابين بالتهاب الكبد الزمن (طويل الأمد) بالفيروس سي (وهو مرض مُعدّ يؤثر على الكبد، ويحدث بسبب فيروس التهاب الكبد سي). وهو يحتوي على المادة الفعالة داسابوفير.

يعمل إكسفيرا عن طريق إيقاف فيروس التهاب الكبد سي عن التكاثر وإصابة خلايا جديدة بالعدوى، وهكذا يبقى دمك من الفيروس لفترة من الزمن.

لا تعمل أقراص إكسفيرا لوحدها، وهي تؤخذ دوما مع دواء آخر مضاد للفيروسات يحتوي على أومبيتاسفير/ باريتابريفير/ ريتونافير. قد يتناول بعض المرضى أيضا دواء مضادا للفيروسات يدعى ريبافيرين. سيخبرك طبيبك أيًا من هذه الأدوية تتناول مع إكسفيرا. من المهم جدا أن تقرأ أيضا نشرات العبوات الخاصة بالأدوية الأخرى المضادة للفيروسات التي ستتناولها مع إكسفيرا. إذا كانت لديك أية أسئلة تتعلق بأدويةك، فالرجاء التحدث إلى طبيبك أو الصيدلاني.

### ٢- ما الذي يجب أن تعرفه قبل تناول إكسفيرا

**لا تتناول إكسفيرا؛**

•إذا كنت تعاني من حساسية تجاه داسابوفير أو أي من مكونات هذا الدواء الأخرى (المذكورة في القسم ٦).
•إذا كنت تعاني من مشاكل كبدية شديدة بخلاف التهاب الكبد سي.
•إذا كنت تتناول أيًا من الأدوية المذكورة في الجدول التالي. وهذا يرجع لإمكانية حدوث تأثيرات خطيرة أو مهددة للحياة عند تناول إكسفيرا وأومبيتاسفير/ باريتابريفير/ ريتونافير مع هذه الأدوية. يمكن لهذه الأدوية أن تؤثر على طريقة عمل إكسفيرا وأومبيتاسفير/ باريتابريفير/ ريتونافير كما يمكن ل إكسفيرا وأومبيتاسفير/ باريتابريفير/ ريتونافير أن تؤثر على طريقة عمل هذه الأدوية.

الأدوية التي يجب أن تمتنع عن تناولها مع إكسفير	
الدواء أو المادة الفعالة	سبب تناول الدواء
كاربامازين، فنتيتون، فينوباربيتال	لعلاج الصرع
إيفاغيفينز، إترافيرين، نيفيرابين	لعلاج عدوى فيروس العوز المناعي البشري
إنزألوتاميد	لعلاج سرطان البروستات
الأدوية التي تحتوي على إثنيل إسترادول	من أجل منع الحمل
مثل تلك الموجودة في معظم أقراص منع الحمل والحلقات المهبلية المستخدمة لمنع الحمل	
جصفيروزيل	لإنقاص معدل الكوليسترول
ميتوتين	سواء من شحوم الدم من أجل بعض أورام الغدد فوق الكلوية
ريفاميسين	لحالات العدوى البكتيرية
عشبية سانت جون (العرن المثقوب)	دواء عشبي لعلاج القلق والاكتئاب متوسط الشد. يتوفر هذا الدواء دون وصفة طبية.

لا تتناول إكسفيرا إذا كانت أي من الحالات المذكورة أعلاه تنطبق عليك. إذا لم تكن متأكدًا، فتحدث إلى طبيبك أو الصيدلاني قبل تناول إكسفيرا .

إكسفيرا

**تحذيرات واحتياطات**
تحدث إلى طبيبك أو الصيدلاني قبل تناول إكسفيرا إذا كنت تعاني من أمراض كبدية بخلاف التهاب الكبد سي.
عند تناول إكسفيرا وأومبيتاسفير/ باريتابريفير/ ريتونافير، أخبر طبيبك إذا ظهرت لديك أي من الأعراض التالية لأنها قد تكون علامة على تفاقم مشاكل الكبد،

- عند الشعور بالغثبان، التقيؤ أو فقد الشهية.
-إذا لاحظت اصفرار جلدك أو عينيك.
-إذا كان لون بولك أغرق من الطبيعي.

إذا كانت أي من الحالات المذكورة أعلاه تنطبق عليك (أو إذا لم تكن متأكدًا)، فتحدث إلى طبيبك أو الصيدلاني قبل تناول إكسفيرا .

**اختبارات الدم**
سيقوم طبيبك بإجراء اختبار للدم قبل وأثناء وبعد علاجك بواسطة إكسفيرا. وهذا لكي يتمكن طبيبك من،
•اتخاذ الأقرار المتعلق بالأدوية الأخرى التي يجب أن تتناولها مع إكسفيرا ومدة تناولها.
•التأكد من نجاح علاجك ومن تخلكم من فيروس التهاب الكبد سي.
•البحث عن التأثيرات الجانبية لإكسفيرا أو الأدوية الأخرى المضادة للفيروسات التي وصفها لك طبيبك لاستعمال مع إكسفيرا (مثل "أومبيتاسفير/ باريتابريفير/ ريتونافير" و"ريبافيرين").

**الأطفال والمراهقون**

لا تعط إكسفيرا للأطفال والمراهقين الذين يقل عمرهم عن 18 عاما. لم يُدرَس استعمال إكسفيرا للأطفال والمراهقين بعد.

**الأدوية الأخرى وإكسفيرا**

أخبر طبيبك أو الصيدلاني إذا كنت تتناول حاليا، أو تناولت مؤخرا أو قد تتناول أي أدوية أخرى.

هناك بعض الأدوية التي **يجب عدم تناولها** مع إكسفيرا – أنظر الجدول السابق "الأدوية التي يجب أن تمتنع عن تناولها مع إكسفيرا".

**أخبر طبيبك أو الصيدلاني** قبل تناول إكسفيرا، إذا كنت تتناول أيًا من الأدوية المذكورة في الجدول أدناه. فقد يحتاج الطبيب إلى تغيير جرعتك من هذه الأدوية. أخيري طبيبك أو الصيدلاني قبل تناول إكسفيرا، إذا كنت تستعملين أيضا مانعات الحمل الهرمونية. راجعي القسم المتعلق بمانعات الحمل أدناه.

الدواء أو المادة الفعالة	سبب تناول الدواء
ألبرزولام	لعلاج القلق، نوبات الهلع وصعوبة النوم
سيكلوسبورين، تاكروليموس	لتنشيط الجهاز المناعي
دابيغاتران، وارفرين	لترقيق الدم
ديفيرازيروكس	للمساعدة على إنقاص معدل الحديد في الدم
ديجوكسين، أملوديبين	لعلاج مشاكل القلب
فيوروسماید	أو ارتفاع ضغط الدم
إيمانتينيب	لعلاج بعض أنواع سرطان الدم
ليفوثيروكسين	لعلاج مشاكل الدرق
دارونافير/ ريتونافير، أتازانافير	لعلاج عدوى فيروس
يتونافير، ريليفيرين	العوز المناعي البشري
أومبیرازول، لانزوبرازول، إيزوميبرازول	لعلاج قرحات المعدة وغيرها من مشاكل المعدة
روسوفاستاتين، برافاستاتين، فلوفاستاتين، بيتافاستاتين	لإنقاص معدل الكوليسترول في الدم
إس-ميفينيتوتين	لعلاج الصرع
تيريفلوتوميد	لعلاج التصلب المتعدد
سلفاسلازين	لعلاج وتديبر مرض الأمعاء الالتهابي أو لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي

إذا كانت أي من الحالات المذكورة أعلاه تنطبق عليك (أو إذا لم تكن متأكدًا)، فتحدث إلى طبيبك أو الصيدلاني قبل تناول إكسفيرا .

**الحمل**

يجب أن تمتنع النساء عن الحمل أثناء فترة علاجهن أو علاج شركائهن بواسطة إكسفيرا وأومبيتاسفير/ باريتابريفير/ ريتونافير مع ريبافيرين. وهذا لأن الريبافيرين يمكنه أن يسبب عيوبًا ولادية أو وفاة طلفك الذي لم يولد بعد.
•لا تبدئي العلاج إذا كنت حاملا.
•لا تحملي أثناء فترة العلاج.
•إذا أصبحت أنت وشريكك تنتظران طفلا أثناء فترة العلاج أو خلال الشهرين الستة التالية للعلاج، فاتصل بطبيبك على الفور.

اطلب نصيحة طبيبك أو الصيدلاني إذا كنت تتناول إكسفيرا أوومبيتاسفير/ باريتابريفير/ ريتونافير مع أو بدون ريبافيرين، وكنت أنت وشريكك تخططان للإنجاب.
اقرأ قسم "الحمل" في نشرات العبوات الخاصة بالأدوية الأخرى المضادة للفيروسات التي تتناولها مع إكسفيرا (مثل "أومبيتاسفير/ باريتابريفير/ ريتونافير" و"ريبافيرين"). من المهم أن يقرأ الرجال والنساء على حد سواء هذه المعلومات.

**منع الحمل**

•إذا كنت تتناولين إكسفيرا وأومبيتاسفير/ باريتابريفير/ ريتونافير مع ريبافيرين، فيجب أن تستخدمي أنت وشريكك وسيلة فعالة لمنع الحمل أثناء العلاج وبعد مرور 6 أشهر على انتهاء العلاج. اسألي طبيبك عن أفضل وسيلة منع حمل من أجلك.
•تحديثي إلى طبيبك قبل تناول إكسفيرا وأومبيتاسفير/ باريتابريفير/ ريتونافير إذا كنت تستخدمين دواء لمنع الحمل يحتوي على إثنيل إسترادول. سيطلب منك طبيبك التوقف والتغيير إلى نوع آخر من أدوية منع الحمل أثناء فترة العلاج بواسطة إكسفيرا.
اقرني قسم "منع الحمل" في نشرات العبوات الخاصة بالأدوية الأخرى المضادة للفيروسات التي تتناولينها مع إكسفيرا (مثل "أومبيتاسفير/ باريتابريفير/ ريتونافير" و"ريبافيرين"). من المهم أن يقرأ الرجال والنساء على حد سواء هذه المعلومات.

**الإرضاع**

يجب أن تمتنعي عن الإرضاع أثناء العلاج بواسطة إكسفيرا. من غير المعلوم ما إذا كانت المادة الفعالة في إكسفيرا (داسابوفير) تفرز في حليب الثدي.

**قيادة السيارات واستخدام الآليات**

ذكر بعض المرضى شعورهم بالتعب الشديد عند تناول إكسفيرا مع أدوية أخرى لعلاج حالة عدوى التهاب الكبد سي لديهم. إذا شعرت بالتعب، فامتنع عن قيادة السيارة أو استعمال أي آلية.

**إكسفيرا يحتوي على اللكتوز**
إذا كان طبيبك قد أخبرك بأنك مصاب بعدم تحمل بعض أنواع السكر، فالرجاء الاتصال بطبيبك قبل تناول هذا الدواء.

**٣- كيف تتناول إكسفيرا**

تناول هذا الدواء دوما حسب الطريقة التي أوصى بها الطبيب تماما. اسأل طبيبك أو الصيدلاني إذا لم تكن متأكدًا.

لا تعمل أقراص إكسفيرا لوحدها، وهي تؤخذ دوما مع دواء آخر مضاد للفيروسات مثل أومبيتاسفير/ باريتابريفير/ ريتونافير. قد يعطيك طبيبك أيضا دواء مضادا للفيروسات يدعى ريبافيرين.

**كم يجب أن تتناول**

الجرعة الموصى بها هي قرص واحد، مرتين يوميا. تناول قرصا واحدا في الصباح وقرصا واحدا في المساء.

**كيف تتناولوه**

•تناول الأقراص مع الطعام. نوع الطعام غير مهم.
•ابتلع الأقراص كاملة.
•لا تمضغ الأقراص أو تسحقها أو تكسرها لأن طعمها قد يكون مرًا.

**كم يجب أن تستمر بتناول إكسفيرا**

ستتناول إكسفيرا لمدة ١٢ أسبوعا أو ٢٤ أسبوعا. سيخبرك طبيبك كم ستستمر فترة علاجك. لا تتوقف عن تناول إكسفيرا إلا إذا أخبرك طبيبك بذلك. من المهم جدا أن تكمل الدورة العلاجية الكاملة. فهذه الطريقة ستعطي الأدوية أفضل الفرص للتخلص من عدوى التهاب الكبد بالفيروس سي.

**إذا تناولت أكثر مما ينبغي من إكسفيرا**

إذا تناولت عن طريق الخطأ أكثر من الجرعة الموصى بها، فيجب أن تتصل بطبيبك أو أن تتوجه إلى أقرب مستشفى على الفور. احتفظ بعبوة الدواء معك لتتمكن من وصف ما تناولته بسهولة.

**إذا نسيت أن تتناول إكسفيرا**

من المهم عدم نسيان أي جرعة من هذا الدواء. إذا نسيت تناول إحدى الجرعات وكان هنالك،
•أكثر من ست ساعات قبل موعد الجرعة التالية - تناول الجرعة التي نسيتها مع الطعام بأقصى سرعة ممكنة.
•أقل من ست ساعات قبل موعد الجرعة التالية – لا تتناول الجرعة المنسية وتناول الجرعة التالية كالعتماد مع الطعام.

لا تتناول جرعة مضاعفة للتعويض عن جرعة منسية.
إذا كانت لديك أي أسئلة إضافية عن طريقة استعمال هذا الدواء، فاسأل طبيبك أو الصيدلاني.

**٤- التأثيرات الجانبية المحتملة**

كما هي الحال مع كافة الأدوية، يمكن لهذا الدواء أن يسبب آثارا جانبية، وإن كانت لا تصيب كافة الأفراد.

**أخبر طبيبك أو الصيدلاني إذا لاحظت حدوث أي من التأثيرات الجانبية التالية؛**

**التأثيرات الجانبية التي تحدث عند تناول إكسفيرا مع أوومبيتاسفير/ باريتابريفير/ ريتونافير:**
**شائعة:** قد تصيب حتى ١ من ١٠ أفراد
•حكة

**التأثيرات الجانبية التي تحدث عند تناول إكسفيرا وأومبيتاسفير/ باريتابريفير/ ريتونافير مع ريبافيرين:**
**شائعة جدا:** قد تصيب أكثر من ١ من ١٠ أفراد

•الشعور بالتعب الشديد (الإرهاق)
•الشعور بالغثبان
•حكة
•صعوبة النوم (الأرق)
•الشعور بالضعف أو نقص الطاقة (الوهن).
**شائعة:** قد تصيب حتى ١ من ١٠ أفراد
•فقر الدم (انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء).

**الإبلاغ عن التأثيرات الجانبية**

إذا أصبت بأي تأثير جانبي، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلاني. وهذا يشمل التأثيرات الجانبية الممكنة الحدوث غير المذكورة في هذه النشرة.
يطلب من المهنيين الصحيين الإبلاغ عن أي تأثيرات عكسية مشتبه بها عن طريق نظام الإبلاغ المحلي.
بإبلاغك عن التأثيرات الجانبية يمكنك المساعدة في توفير مزيد من المعلومات عن سلامة هذا الدواء.

**المملكة العربية السعودية:**

فاكس: +966-11-205-7662
للإتصال بالإدارة التنفيذية للتيقظ وإدارة الأزمات. هاتف
120382222-966-11-2356-2340
تحويلة
2317-2356-2354-2334-2340
الهاتف المجاني: 8002490000
البريد الإلكتروني، npc.drug@sfd​a.gov.sa
الموقع الإلكتروني، www.sfd​a.gov.sa/npc

**الدول الأخرى،**

**البحرين ، الإمارات العربية المتحدة، اليمن، الكويت، عمان، قطر،**

فاكس: +97144241313
البريد الإلكتروني، pv.gulf@abbvie.com

**العراق ، الأردن، لبنان، سوريا، إيران،**

الخط الساخن: +96170122946
البريد الإلكتروني، Pharmacovigilance\_levant@abbvie.com

**البحرين ، الإمارات العربية المتحدة، اليمن، الكويت، عمان، قطر،**

فاكس: +97144241313
البريد الإلكتروني، pv.gulf@abbvie.com

**العراق ، الأردن، لبنان، سوريا، إيران،**

الخط الساخن: +96170122946
البريد الإلكتروني، Pharmacovigilance\_levant@abbvie.com

**البحرين ، الإمارات العربية المتحدة، اليمن، الكويت، عمان، قطر،**

**العراق ، الأردن، لبنان، سوريا، إيران،**

**البحرين ، الإمارات العربية المتحدة، اليمن، الكويت، عمان، قطر،**

**العراق ، الأردن، لبنان، سوريا، إيران،**

**البحرين ، الإمارات العربية المتحدة، اليمن، الكويت، عمان، قطر،**

**العراق ، الأردن، لبنان، سوريا، إيران،**

**البحرين ، الإمارات العربية المتحدة، اليمن، الكويت، عمان، قطر،**

**العراق ، الأردن، لبنان، سوريا، إيران،**

**البحرين ، الإمارات العربية المتحدة، اليمن، الكويت، عمان، قطر،**

**العراق ، الأردن، لبنان، سوريا، إيران،**

**البحرين ، الإمارات العربية المتحدة، اليمن، الكويت، عمان، قطر،**

**العراق ، الأردن، لبنان، سوريا، إيران،**

**البحرين ، الإمارات العربية المتحدة، اليمن، الكويت، عمان، قطر،**

**العراق ، الأردن، لبنان، سوريا، إيران،**

**البحرين ، الإمارات العربية المتحدة، اليمن، الكويت، عمان، قطر،**

**٥- كيف تحتفظ ب إكسفيرا**

احتفظ بهذا الدواء بعيدا عن مرأى الأطفال وعن متناول أيديهم.

لا تستعمل هذا الدواء بعد انقضاء تاريخ الصلاحية المذكور على العلبة بعد EXP. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى آخر يوم من ذلك الشهر.

احتفظ به ضمن درجة حرارة أقل من ٣٠ درجة مئوية.

يجب عدم التخلّص من الأدوية في مياه الصرف الصحي العامة أو مع النفايات المنزلية. استشر الصيدلاني عن طريقة التخلص من الأدوية التي لم تعد تستعملها. هذه الإجراءات تساعد على حماية البيئة.

**٦- محتويات العبوة ومعلومات أخرى**

**ما هي محتويات إكسفيرا**

•يحتوي كل قرص على ٢٥٠ ملغم من داسابوفير (على شكل صوديوم أحادي الإمאה).
•المكونات الأخرى هي:

- داخل القرص، مكروكريستالين سللوز (إي ٤٦٠ (أي))، لكتوز أحادي الإمאה، كيووفيدون، كروسكربولوز صوديوم، السيليكيا الغروانية اللامائية (إي ٥٥١)، مغنيزيوم ستيارات (إي ٤٧٠ بي).
- الفيلم المغلف للقرص، كحول البولي فنيل (إي ١٢٠٣)، ثاني أكسيد التيتانيوم (إي ١٧١)، بولي إيثيلين غليكول ٢٣٥٠. تالك (إي ٥٥٣ بي)، أصفر أكسيد الحديد (إي ١٧٢)، أحمر أكسيد الحديد (إي ١٧٢) وأسود أكسيد الحديد (إي ١٧٢).

**كيف تبدو إكسفيرا ومحتويات العبوة**

أقراص إكسفيرا هي أقراص شبه بيضوية لونها بيج ومغلفة بفلم، أبعادها ١٤٠ x ملم ٨٠ x ملم، ممهورة بـ "AV2". توجد أقراص إكسفيرا معبأة في نقاطات ألنيوم تحتوي على قرصين. تحتوي كل علبة على ٥٦ قرصا (علبة متعددة العبوات تحتوي على ٤ علب داخلية في كل منها ١٤ قرصا).

**أقراص إكسفيرا**
•يحتوي كل قرص على ٢٥٠ ملغم من داسابوفير (على شكل صوديوم أحادي الإمאה).
•المكونات الأخرى هي:

- داخل القرص، مكروكريستالين سللوز (إي ٤٦٠ (أي))، لكتوز أحادي الإمאה، كيووفيدون، كروسكربولوز صوديوم، السيليكيا الغروانية اللامائية (إي ٥٥١)، مغنيزيوم ستيارات (إي ٤٧٠ بي).
- الفيلم المغلف للقرص، كحول البولي فنيل (إي ١٢٠٣)، ثاني أكسيد التيتانيوم (إي ١٧١)، بولي إيثيلين غليكول ٢٣٥٠. تالك (إي ٥٥٣ بي)، أصفر أكسيد الحديد (إي ١٧٢)، أحمر أكسيد الحديد (إي ١٧٢) وأسود أكسيد الحديد (إي ١٧٢).

**كيف تبدو إكسفيرا ومحتويات العبوة**
أقراص إكسفيرا هي أقراص شبه بيضوية لونها بيج ومغلفة بفلم، أبعادها ١٤٠ x ملم ٨٠ x ملم، ممهورة بـ "AV2". توجد أقراص إكسفيرا معبأة في نقاطات ألنيوم تحتوي على قرصين. تحتوي كل علبة على ٥٦ قرصا (علبة متعددة العبوات تحتوي على ٤ علب داخلية في كل منها ١٤ قرصا).

**أقراص إكسفيرا**
•يحتوي كل قرص على ٢٥٠ ملغم من داسابوفير (على شكل صوديوم أحادي الإمאה).
•المكونات الأخرى هي:

- داخل القرص، مكروكريستالين سللوز (إي ٤٦٠ (أي))، لكتوز أحادي الإمאה، كيووفيدون، كروسكربولوز صوديوم، السيليكيا الغروانية اللامائية (إي ٥٥١)، مغنيزيوم ستيارات (إي ٤٧٠ بي).
- الفيلم المغلف للقرص، كحول البولي فنيل (إي ١٢٠٣)، ثاني أكسيد التيتانيوم (إي ١٧١)، بولي إيثيلين غليكول ٢٣٥٠. تالك (إي ٥٥٣ بي)، أصفر أكسيد الحديد (إي ١٧٢)، أحمر أكسيد الحديد (إي ١٧٢) وأسود أكسيد الحديد (إي ١٧٢).

**أقراص إكسفيرا**
•يحتوي كل قرص على ٢٥٠ ملغم من داسابوفير (على شكل صوديوم أحادي الإمאה).
•المكونات الأخرى هي:

- داخل القرص، مكروكريستالين سللوز (إي ٤٦٠ (أي))، لكتوز أحادي الإمאה، كيووفيدون، كروسكربولوز صوديوم، السيليكيا الغروانية اللامائية (إي ٥٥١)، مغنيزيوم ستيارات (إي ٤٧٠ بي).
- الفيلم المغلف للقرص، كحول البولي فنيل (إي ١٢٠٣)، ثاني أكسيد التيتانيوم (إي ١٧١)، بولي إيثيلين غليكول ٢٣٥٠. تالك (إي ٥٥٣ بي)، أصفر أكسيد الحديد (إي ١٧٢)، أحمر أكسيد الحديد (إي ١٧٢) وأسود أكسيد الحديد (إي ١٧٢).

**أقراص إكسفيرا**
•يحتوي كل قرص على ٢٥٠ ملغم من داسابوفير (على شكل صوديوم أحادي الإمאה).
•المكونات الأخرى هي:

- داخل القرص، مكروكريستالين سللوز (إي ٤٦٠ (أي))، لكتوز أحادي الإمאה، كيووفيدون، كروسكربولوز صوديوم، السيليكيا الغروانية اللامائية (إي ٥٥١)، مغنيزيوم ستيارات (إي ٤٧٠ بي).
- الفيلم المغلف للقرص، كحول البولي فنيل (إي ١٢٠٣)، ثاني أكسيد التيتانيوم (إي ١٧١)، بولي إيثيلين غليكول ٢٣٥٠. تالك (إي ٥٥٣ بي)، أصفر أكسيد الحديد (إي ١٧٢)، أحمر أكسيد الحديد (إي ١٧٢) وأسود أكسيد الحديد (إي ١٧٢).

**أقراص إكسفيرا**
•يحتوي كل قرص على ٢٥٠ ملغم من داسابوفير (على شكل صوديوم أحادي الإمאה).
•المكونات الأخرى هي:

- داخل القرص، مكروكريستالين سللوز (إي ٤٦٠ (أي))، لكتوز أحادي الإمאה، كيووفيدون، كروسكربولوز صوديوم، السيليكيا الغروانية اللامائية (إي ٥٥١)، مغنيزيوم ستيارات (إي ٤٧٠ بي).
- الفيلم المغلف للقرص، كحول البولي فنيل (إي ١٢٠٣)، ثاني أكسيد التيتانيوم (إي ١٧١)، بولي إيثيلين غليكول ٢٣٥٠. تالك (إي ٥٥٣ بي)، أصفر أكسيد الحديد (إي ١٧٢)، أحمر أكسيد الحديد (إي ١٧٢) وأسود أكسيد الحديد (إي ١٧٢).

**أقراص إكسفيرا**
•يحتوي كل قرص على ٢٥٠ ملغم من داسابوفير (على شكل صوديوم أحادي الإمאה).
•المكونات الأخرى هي:

- داخل القرص، مكروكريستالين سللوز (إي ٤٦٠ (أي))، لكتوز أحادي الإمאה، كيووفيدون، كروسكربولوز صوديوم، السيليكيا الغروانية اللامائية (إي ٥٥١)، مغنيزيوم ستيارات (إي ٤٧٠ بي).
- الفيلم المغلف للقرص، كحول البولي فنيل (إي ١٢٠٣)، ثاني أكسيد التيتانيوم (إي ١٧١)، بولي إيثيلين غليكول ٢٣٥٠. تالك (إي ٥٥٣ بي)، أصفر أكسيد الحديد (إي ١٧٢)، أحمر أكسيد الحديد (إي ١٧٢) وأسود أكسيد الحديد (إي ١٧٢).

**أقراص إكسفيرا**
•يحتوي كل قرص على ٢٥٠ ملغم من داسابوفير (على شكل صوديوم أحادي الإمאה).
•المكونات الأخرى هي:

- داخل القرص، مكروكريستالين سللوز (إي ٤٦٠ (أي))، لكتوز أحادي الإمאה، كيووفيدون، كروسكربولوز صوديوم، السيليكيا الغروانية اللامائية (إي ٥٥١)، مغنيزيوم ستيارات (إي ٤٧٠ بي).
- الفيلم المغلف للقرص، كحول البولي فنيل (إي ١٢٠٣)، ثاني أكسيد التيتانيوم (إي ١٧١)، بولي إيثيلين غليكول ٢٣٥٠. تالك (إي ٥٥٣ بي)، أصفر أكسيد الحديد (إي ١٧٢)، أحمر أكسيد الحديد (إي ١٧٢) وأسود أكسيد الحديد (إي ١٧٢).

**أقراص إكسفيرا**
•يحتوي كل قرص على ٢٥٠ ملغم من داسابوفير (على شكل صوديوم أحادي الإمאה).
•المكونات الأخرى هي:

- داخل القرص، مكروكريستالين سللوز (إي ٤٦٠ (أي))، لكتوز أحادي الإمאה، كيووفيدون، كروسكربولوز صوديوم، السيليكيا الغروانية اللامائية (إي ٥٥١)، مغنيزيوم ستيارات (إي ٤٧٠ بي).
- الفيلم المغلف للقرص، كحول البولي فنيل (إي ١٢٠٣)، ثاني أكسيد التيتانيوم (إي ١٧١)، بولي إيثيلين غليكول ٢٣٥٠. تالك (إي ٥٥٣ بي)، أصفر أكسيد الحديد (إي ١٧٢)، أحمر أكسيد الحديد (إي ١٧٢) وأسود أكسيد الحديد (إي ١٧٢).

**أقراص إكسفيرا**
•يحتوي كل قرص على ٢٥٠ ملغم من داسابوفير (على شكل صوديوم أحادي الإمאה).
•المكونات الأخرى هي:

- داخل القرص، مكروكريستالين سللوز (إي ٤٦٠ (أي))، لكتوز أحادي الإمאה، كيووفيدون، كروسكربولوز صوديوم، السيليكيا الغروانية اللامائية (إي ٥٥١)، مغنيزيوم ستيارات (إي ٤٧٠ بي).
- الفيلم المغلف للقرص، كحول البولي فنيل (إي ١٢٠٣)، ثاني أكسيد التيتانيوم (إي ١٧١)، بولي إيثيلين غليكول ٢٣٥٠. تالك (إي ٥٥٣ بي)، أصفر أكسيد الحديد (إي ١٧٢)، أحمر أكسيد الحديد (إي ١٧٢) وأسود أكسيد الحديد (إي ١٧٢).

**أقراص إكسفيرا**
•يحتوي كل قرص على ٢٥٠ ملغم من داسابوفير (على شكل صوديوم أحادي الإمאה).
•المكونات الأخرى هي:

- داخل القرص، مكروكريستالين سللوز (إي ٤٦٠ (أي))، لكتوز أحادي الإمאה، كيووفيدون، كروسكربولوز صوديوم، السيليكيا الغروانية اللامائية (إي ٥٥١)، مغنيزيوم ستيارات (إي ٤٧٠ بي).
- الفيلم المغلف للقرص، كحول البولي فنيل (إي ١٢٠٣)، ثاني أكسيد التيتانيوم (إي ١٧١)، بولي إيثيلين غليكول ٢٣٥٠. تالك (إي ٥٥٣ بي)، أصفر أكسيد الحديد (إي ١٧٢)، أحمر أكسيد الحديد (إي ١٧٢) وأسود أكسيد الحديد (إي ١٧٢).

**أقراص إكسفيرا**
•يحتوي كل قرص على ٢٥٠ ملغم من داسابوفير (على شكل صوديوم أحادي الإمאה).
•المكونات الأخرى هي:

- داخل القرص، مكروكريستالين سللوز (إي ٤٦٠ (أي))، لكتوز أحادي الإمאה، كيووفيدون