

لوتريدرم* كريم LOTRIDERM* Cream

مشتق من الكلوتريمازول وديروبيونات البيتاميثازون للإستعمال الجلدي فقط

الوصف: يحتوي كل ١ جرام من لوتريدرم كريم على ١٠ مجم (١٪) كلوتريمازول و ٠,٦٤ مجم ديروبيونات البيتاميثازون تعادل ٠,٥ مجم (٠,٠٥٪) بيتاميثازون في قاعدة كريم يحتوي على زيت معدني ، بنزولام أبيض ، ستوستيناريل الكحول ، بولي إيثيلين الجليكول ، بنزيل الكحول ، فوسفات الصوديوم ، حمض فوسفوريك ، بروبالين الجليكول وماء منقى .

التأثير الهوائي: يجمع لوتريدرم كريم بين تأثير الكلوتريمازول المضاد للفطريات الواسع الطيف وبين الفعل الطويل المدى المضاد للإنتهاب والمضاد للحكة والتأثير المضيق للأوعية لديروبيونات البيتاميثازون . الكلوتريمازول يبدو أنه يؤثر على المشاء الخلوي للفطور مؤدياً إلى انسكاب مكونات الخلية .

الإستطبابات وواعى الإستعمال: يستخدم لوتريدرم كريم في المعالجة الموضعية للحالات الجلدية التالية : فطور القدم ، فطور الناحية المغنبية ، وفطور الجمد بسبب الفطور الشعري من مصدر انساني ، الفطور الشعري من مصدر داني ، الفطور البشرية دقيقة البذور من مصدر حيواني ، داء المبيضات بسبب المبيضات البيض .

الجرعات وكيفية الإستعمال: ادعك بلطف كمية كافية من لوتريدرم كريم في المنطقة المصابة والجلد المحيط بها ، مرتين يومياً صباحاً ومساءً لمدة اسبوعين في حالة فطور الناحية المغنبية ، فطور الجمد ، وداء المبيضات . ولمدة ٤ اسابيع في حالة فطور القدم .

مدة المعالجة: يحدث عادة التحسن السريري مع غياب الحماسي والحكة خلال ٣ - ٥ أيام الأولى من المعالجة . إذا لم يحدث تحسن سريري بعد مرور اسبوع من معالجة فطور الناحية المغنبية ، وفطور الجمد بـ لوتريدرم كريم ، يجب عندها إعادة التشخيص . بينما يجب الانتظار اسبوعين في معالجة فطور القدم قبل اتخاذ قرار مماثل . إذا إستمرت الحالة بعد مرور اسبوعين من العلاج في حالات فطور الناحية المغنبية وفطور الجمد وبعد أربعة أسابيع في حالات فطور القدم يجب إيقاف العلاج بـ لوتريدرم كريم . حينئذ يمكن إدخال علاج بديل مع عامل مناسب مضاد للفطور فقط ، بوصى بعدم إستخدام لوتريدرم كريم لمدة أطول من أربعة أسابيع .

التأثيرات الجانبية: سجلت الحالات التالية بشكل قليل التكرار نتيجة استخدام لوتريدرم كريم : نشوش الحس ، طفح بقعي حطاطي ، الوذمة ، انتانات ثانوية . سجلت التأثيرات الجانبية الموضعية التالية نتيجة استعمال السنيروبيونات الفشرية : حرقان ، حكاك ، نهيج الجلد ، نجف الجلد ، التهاب الاجرية الشعري ، الاندفاعات العدية ، نقص التصبغ ، التهاب حواف الم ، التهاب الجلد بالتماس التحمسي ، تطمن الجلد ، انتانات ثانوية ، ضمور الجلد ، الالام الجلدية والأداء التخنية المرعية . تتضمن التأثيرات الجانبية للكلوتريمازول : الحماسي ، لسع موضعي ، التاط ، نشر الجلد ، الوذمة ، الحكة ، الشرى ، نهيج جلدي عام . تثبيط محور الغند تحت المهادية . التخامية . الكظرية . تاندر كوشنج وإرتفاع الضغط داخل الجمجمة قد سجلت في الأطفال الذين يستعملون السنيروبيونات الفشرية الموضعية . تتضمن طواهر تثبيط الغدة الكظرية تأخر النمو الطولي ز تأخر زيادة الوزن ، انخفاض مستوى الكورتيزول في البلازما وغياب رد الفعل للتح بهرمون محرض فشر الكظر (كورتيكوتروبين) . تتضمن طواهر إزدياد الضغط داخل الجمجمة نوه البافوخ ، الصداع ووذمة الحلجمة في الجانبين .

موانع الإستعمال: يمنع إستعمال لوتريدرم كريم لدى المرضى نوى تاريخ تحمسي ضد أى من مكوناته أو ضد سنيروبيونات فشرية أخرى أو ضد مجموعة الإيميدازول .

الإحتياطات: يجب عدم استعمال المضادات المتعلقة مع لوتريدرم كريم . يجب إيقاف استخدام لوتريدرم كريم إذا طهر نهيج أو تحسس نحوه واستبداله بالمعالجة المناسبة . عند وجود انتانات جرثومية يجب استخدام مضادات الجرثام المناسبة في نفس الوقت . إذا لم يظهر تحسن سريع للحالة يجب إيقاف المعالجة بـ لوتريدرم كريم حتى يتم معالجة الانتان تماماً . في حالات عدم الإستجابة للوتريدرم كريم يجب إعادة إجراء الدراسات الميكروبيولوجية المناسبة لتوكيد التشخيص ولإستثناء مسببات الأمراض الأخرى قبل بدء نظام مختلف من العلاج المضاد للفطور . أى من التأثيرات الجانبية المسجلة نتيجة إستعمال السنيروبيونات الفشرية جهازياً متضمنة تثبيط الكظر ، طواهر تاندر كوشنج ، إرتفاع السكر في الدم والبلية السكرية يمكن أن تحدث أيضاً عند إستعمال السنيروبيونات الفشرية موضعياً خاصة في الرضع والأطفال . يزداد الإمتصاص الجهازى للسنيروبيونات الفشرية لدى إستعمال سنيروبيونات فشرية أقوى مفعولاً ، لمدة أطول أو إذا إستعملت لعلاج مساحات كبيرة من الجلد . لذا يلزم التقييم النورى للمرضى الذين يستعملون جرعات كبيرة من السنيروبيونات الفشرية القوية المفعول على نطاق واسع لإكتشاف أى آثار لتثبيط محور الغند تحت المهادية . التخامية . الكظرية . إذا حدث مثل هذا التثبيط يجب محاولة إيقاف الدواء أو تقليل معدل إستعماله أو إستبداله بسنيروبيد فشرى أقل مفعولاً . إسترجاع نشاط محور الغند تحت المهادية . التخامية . الكظرية يكون عامة سريع ومكتمل بعد إيقاف الدواء . نادراً ما تظهر دلائل وأعراض سحب السنيروبيونات الفشرية مما يتطلب إضافة السنيروبيونات الفشرية جهازياً .

لا يستخدم كريم لوتريدرم في العينين .

الإستعمال لدى الأطفال: المرضى من الأطفال قد يبدون تأثراً أكبر للكبت الوطني . التخامي . المعورى الذى يسببه استعمال الأسنيروبيونات الفشرية الموضعية وكذلك الأسنيروبيونات الفشرية الخارجية المصدر عنه في المرضى البالغين وذلك لتقابلتهم الأكبر للإمتصاص نظراً لكر مساحة الجلد بالنسبة لوزن الجسم . ان مجموعة الأعراض التى تم تسجيلها للأطفال الذين عولجوا بالإسنيروبيونات الفشرية الموضعية تشمل : الكبت الوطني . التخامى . المعورى ، تاندر كوشينج ، تأخر النمو الطولى ، تأخر اكتساب الوزن ، وارتفاع الضغط داخل الجمجمة . مظاهر كبت الغدة الكظرية لدى الأطفال تشمل انخفاض مستوى الكورتيزول في البلازما وغياب الإستجابة لتحفيز الهرمون الكظري . المدى الفشرى . مظاهر ارتفاع الضغط داخل الجمجمة يشمل انتاخ البافوخ ، صداع ، ووذمة الحلجمة البصرية . لا ينصح بإستعمال لوتريدرم كريم في علاج طفح الحفط .

الإستعمال لدى الحوامل والمريضات: بما أنه لم يثبت أمان استعمال الأسنيروبيونات للسيدات الحوامل ، يجب استعمال هذا النوع من العلاج فقط اذا كانت الفائدة العلاجية منه تيزر المخاطرة بحياة الجنين .

لا يجب الإستعمال المفرط وكميات كبيرة لهذه النوعية من الأدوية ولمدد طويلة للحوامل .

حيث أنه من غير المعلم اذا كان استعمال الأسنيروبيونات الفشرية الموضعية ينتج عنه امتصاص بدنى بسبب افراز هذه المادة في لبن الأم ، يجب اتخاذ القرار في إيقاف الرضاعة أو إيقاف استعمال المستحضر مع الأخذ في الاعتبار مدى أهمية المستحضر للأم .

زيادة الجرعة: الأعراض : الإستعمال المكثف أو لممد طويلة للإسنيروبيونات الفشرية الموضعية قد يؤدي إلى كبت وطبقة الغدة الكظرية . الكلوية والذى يؤدي بدوره إلى فسور كظري ثانوى ومظاهر زيادة الكورتيزون بما فيها مرض كوشينج .

العلاج: يتبع علاج عرضي مناسب . الأعراض الحادة لزيادة افراز الكورتيزون عادة ما تعود لحالتها الطبيعية . بمالح اختلال التوازن الكهرلى . اذا لزم الأمر . في حالة السمية المزمنة ، ينصح بالسحب البطيء للإسنيروبيونات الفشرية .

التحذير: لوتريدرم كريم : أنبوبات حجم ١٥ جرام ، ٣٠ جرام ، يحفظ في درجة حرارة بين ٢م° و ٣٠م° .

إن هذاً دواء
- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر .
- إتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الإستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلانى الذى صرفها لك .
- فالطبيب والصيدلانى هما الخبيران بالدواء وينفعه وضروره .
- لا تفتح مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك .
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية .
- لا تترك الأدوية في متناول ايدى الأطفال .
مجلس وزارة الصحة العرب وإتحاد الصيانة العرب

* علامة تجارية

صنع بواسطة شيرنج بلاو لابو ، هايمست أوب - دن - برج - بلجيكا ،
فرع من شيرنج بلاو كوربوريشن ، الولايات المتحدة الأمريكية .
شيرنج بلاو كورپويشن - الولايات المتحدة الأمريكية .