



دوكسيوم® ٥٠٠

منظم وظائف الأوعية الشعرية

التركيب

العنصر الفعال: دوبيسيلات الكالسيوم مونوهيدرات ٥٠٠ ملغ
المسواغ: مادة ملونة (E 132) وسواغات للكبسولة.

الخصائص والتأثيرات

يعمل دوبيسيلات الكالسيوم على تحسين مرونة الكريات الحمر وعلى تثبيت قرط تكس الصفحات. وفي حال اعتلال الشبكة السكري فإنه يعمل على خفض قرط اللزوجة البلازمية والدموية محسناً بذلك الخصائص الانسيابية للدم وسقي الأنسجة. تسمح هذه التأثيرات بتصحيح الاضطرابات الوظيفية للأوعية الشعرية التي يكون مصدرها إما وظيفياً أو سببها اضطرابات بنوية أو أيضاً مكتسبة كما يساهم دوبيسيلات الكالسيوم في الحد من الوذمات.

الحرائك الدوائية

بعد تناول ٥٠٠ ملغ من دوبيسيلات الكالسيوم عن طريق الفم، تبلغ نسبته في الدم أكثر من ١ مكروغرام/مل في المدة ما بين ثالث وعاشر ساعة من تناوله مع تركيز أقصاه (Cmax) ٨ مكروغرام/مل وهو المعدل بعد ١ ساعات (tmax). و ٣ مكروغرام/مل بعد ٢٤ ساعة، يتراوح معدل الارتباط البروتيني يتراوح بين ٢٠ و ٢٥٪. لا يعثر دوبيسيلات الكالسيوم الحازر الدموي الدماغ أو الحازر السخدي عن الحيوان ولكن لا يعرف إذا كان الحال هو نفسه عند الإنسان. يتسرب دوبيسيلات الكالسيوم بمقادير ضئيلة جداً في حليب الأم (٠.٤ مكروغرام/مل بعد تناول ١٥٠٠ مع كما لوحظ في دراسة واحدة). لا يدخل دوبيسيلات الكالسيوم الدورة المعوية-الكبدية ويتم طرحه أساساً دون تغيير فقط ١٠٪ تطرح على شكل مستقيبات. تقريباً نصف الجرعة المعطاة قمويًا يتم طرحها في البول خلال الأربع وعشرين ساعة الأولى والنصف الآخر في البراز. نصف عمر البلازما هو حوالي ٥ ساعات.

الحرائك الدوائية في حالات خاصة

لا يعرف إلى أي مدى تؤثر الاضطرابات الوظيفية للكللى على الحرائك الدوائية لدوبيسيلات الكالسيوم (راجع "الاحتياطات").

التعليمات ودواعي الاستعمال

حالات اعتلال الأوعية الشعرية الدقيقة واعتلال الشبكة السخري على وجه الخصوص. الأعراض السريرية للفصوص الوريدية للرمز في الأطراف السفلى (الآلم، القصر، تشوش الحس، الوذمة، الركود الوريدي). كعلاج مساعد في التهاب الوريد الخثري السطحي، المتلازمة الباسورية واضطرابات الدورة الدموية الدقيقة من منشأ شرياني وريدي.

الجرعة

اعتبارياً ٥٠٠ إلى ١٠٠٠ ملغ أي كبسولة واحدة أو كبسولتان في اليوم، تؤخذ مع الوجبات الرئيسية. تعتمد مدة العلاج على الحالة المراد علاجها وتطورها، وهي عادة ما بين بضعة أسابيع وعدة أشهر. يلزم تكيف المقدار بطريقة فردية وفقاً لشدة الحالة.

موانع الاستعمال

قرط الحساسية لدوبيسيلات الكالسيوم.

الاحتياطات

يجب خفض المقدار في حال القصور الكلوي الشديد المطلوب للديلزة. في حالات نادرة جداً (٠.٢٢ من مليون مريض)، نسبة تم تقييمها استناداً إلى تقارير عفوية، فإن تناول دوبيسيلات الكالسيوم قد يسبب ندرة الحبيبات التي تكون على الأرجح ناتجة عن رد فعل حساسي. تتظاهر هذه الحالة بأعراض مثل الحمى العالية وأحماض الجوف القموي (التهاب اللوزتين) والتهاب الحلق والالتهاب الشرجي التناسلي مع أعراض ثانوية وهي أعراض تدل غالباً على وجود خمج. يجب أن يبلغ المرضى على ضرورة إعلام طبيهم فوراً في حال ظهور أي علامة خمج. في هذه الحال فإنه من الضروري القيام بحدون تأخير بإجراء فحص الصيغة الدموية وعد الكريات البيض ووقف المعالجة.

الحمل والإرضاع

الحمل من فئة ج (C): الدراسات عند النساء الحوامل أو على الحيوان غير متوفرة ولا يعرف ما إذا كان دوبيسيلات الكالسيوم يعبر الحاجز السخدي عند الإنسان. لذا يجب إعطاء الدواء أثناء الحمل فقط إذا قدر أن الفائدة العلاجية المتوقعة تفوق الخطر المحتمل على الجنين.

يطرح دوبيسيلات الكالسيوم بواسطة حليب الأم بكميات ضئيلة جداً (٠.٤ مكروغرام/مل بعد تناول ثلاثة أقراص ٥٠٠ ملغ). فمن باب الحيطة يجب الاحتياار إما وقف العلاج أو الإرضاع.

الإثار غير المرغوبة

مثلث مثل سائر الأدوية دوكسيوم® ٥٠٠ يمكن أن يتسبب بأثار سلبية غير مرغوب بها، وهي لا تكون بشكل حتمي عند كافة الأشخاص. الإثار غير المرغوبة الملاحظة مدرجة فيما يلي وفقاً لتواترها (متكررة: ١-١٠٪، متكررة قليلاً: ٠.١-١٪، نادرة: ٠.٠١-٠.١٪، نادرة جداً: أقل من ٠.٠١٪ بما فيها الحالات المنفردة).

اضطرابات معدية معوية

نادرة: الغثيان والإسهال، القيء
اضطرابات الجلد وتسبب خت الأدمة
نادرة: الحكمة والهرش.
اضطرابات عامة
نادرة: الحمى، الارتعاش.
اضطرابات في الجهاز العضلات وفي الجهاز العصبي
نادرة: آلام المفاصل.

الدورة الدموية والجهاز اللمفاوي

في حالات نادرة جداً أبلغ عن ندرة الحبيبات عند الأشخاص المستين بتناولهم علاجات أخرى. عموماً تزول هذه التأثيرات تلقائياً بعد وقف تناول الدواء. وفي حال حدوث اضطرابات معدية معوية يجب خفض المقدار أو وقف المعالجة مؤقتاً. وفي حال ظهور ارتكاسات جلدية، حمى، آلام المفاصل أو حدوث تغيير في الصيغة الدموية يجب وقف المعالجة وإعلام الطبيب المعالج، فقد تكون هذه الظواهر رد فعل الحساسية.

في حال الإحساس بواحد من هذه الاضطرابات المذكورة على درجة من الخطورة أو في حال ظهور ارتكاسات باضطرابات أخرى غير مذكورة في هذه النشرة فيجب إخطار الطبيب المعالج أو الصيدلاني.

التداخل الدوائي

لا تعرف أية تداخلات حتى الآن.

قرط الجرعة

الظواهر السريرية لقرط جرعة محتمل ليست معروفة.

ملاحظات خاصة

لا توافق
لا يعرف أية حالات لا توافق حتى الآن.
معلومة هامة

يمكن لدوبيسيلات الكالسيوم عند تناوله بجرعات علاجية، أن يتداخل مع قياس الكرياتينين (قيم ضئيلة جداً).
شروط خاصة للحفاظ

يجب حفظه في حرارة لا تتجاوز ٣٠ درجة مئوية.
يجب عدم استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكورة على العبوة مقابل عبارة "EXP".

العبوة

عبوة من ٢٠ و ١٠٠ كبسولة.

ان هذا دواء

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- فالطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وبنفعه وضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.
- لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال.

الموزع:

أو أم فارما، ميون - جنيف، سويسرا.



تاريخ مراجعة النشرة: ٢٠٠٨/٥.