

ننشر العبوة: معلومات للمريض كريم فيوسيدين® 2%

حمض الفيوجن

- اقرأ هذه النشرة بالكامل بعناية قبل البدء في استخدام هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة بالنسبة إليك.
- احفظ بهذه النشرة. قد تحتاج إلى قرأتها مرة أخرى.
- إذا كانت لديك أي أسلطة إضافية، ف fasail طبكي أو الصيدلي.
- تم استخدام هذا الدواء لك أنت فقط. لا تقدمه إلى آخرين. فقد يضرهم، حتى لو بدت لك علامات مرضهم مماثلة لمرضك.
- إذا ظهرت عليك أي آثار جانبية، فتحذف مع طبكي أو الصيدلي. يتضمن ذلك أي آثار جانبية ممتلحة غير مدرحة في هذه النشرة.

آثار جانبية غير شائعة (قد تظهر لدى عدد يصل إلى 1 من كل 100 شخص):

- الإكزيما
 - الطفح الجلدي
 - الحكة
 - احمرار الجلد
 - الألم في مكان و
 - التهيج في مكان

أثار جانبية نادرة (قد تظهر لدى عدد يصل إلى 1 من كل 1,000 شخص):

- فرط الحساسية
 - التهاب العين مع احمرار العينين والدمع.
 - الطفح الجلدي (الشري) والترور: قد يكونان شديدين. تحدث إلى طبيبك. إذا كان هناك تورم في الوجه والشفتين واللسان، فقد يكون ذلك مهدداً للحياة. اتصل بالرقم .
 - الشري
 - البثور

التبلیغ عن الآثار الجانبيّة
إذا ظهرت عليك أيّ آثار جانبيّة، فتحدث إلى طبّيتك أو مرضيتك أو الصيدلي. يتضمّن ذلك
أيّ آثار جانبيّة ممثّلة بغير مردّجة في هذه النشرة.
من خلال إبلاغ عن الآثار الجانبيّة، يمكنك المساعدة في توفير مزيد من المعلومات حول
عوائق هذه الدواء.

5. كيفية تخزين فيوسيديين®

فترة التخزين: 3 سنوات.
أسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد مطلوبة. حفاظاً على البيئة، لا
تلق بقايا الدواء في البيالوغة أو المرحاض أو سلة القمامات.

6. محتويات العبوة ومعلومات أخرى

يحتوي فيوسيدين على:
المادة الفعالة: حمض الفوسفیديك
المحولات الأخرى هي: بوتيل هيدروكسي أثينزول E320، كحول سيتيل، جلسرين
8/، سوربات البوتاسيوم E0، زيت بارافين، بولي سوربات 60، ماء نقي، حمض
الهيدروكلوريك، بارافين أيض ناعم، الـα-توکوفیرول الراسمی بالکامل.

الظاهر وأحجام العبوات
كريم فيوسيدين هو كريم أبيض، من دون أي رائحة خاصة.

أحجام العبوات: جم و 0 جم للإبلاغ عن أي أثر (آثار) جانبي

- الملكية العربية السعودية:
- المركز الوطني للتنقية الدوائية (NPC):
- مركز اتصال الهيئة السعودية لغذاء والدواء: 19999
- البريد الإلكتروني: npc.drug@sfda.gov.sa
- الموسم الإلكتروني: <https://ade.sFDA.gov.sa>

دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى: بيرج، التواصل مع الهيئة المختصة ذات الصلة.

الجهة الحاصلة على ترخيص التسويق:
LEO Pharma A/S, Industriparken 55, 2750 Ballerup

جهة التصنيع
،LEO Laboratories Ltd.، 285 Cashel Road
أيرلندا، Dublin 12
تم احراء آخر تعديل على هذه النشرة في يونيو 2018.

- هذا دواء
- الدواء منتج، لكن ليس مثل غيره من المنتجات.
- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك وتتناوله بما يخالف التعليمات يشكل خطورة عليك.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال وتعليمات الصيدلي الذي ا开具 لك الدواء. الطبيب والصيدلي خبراء في الآюрودوسة وقوائدها ومخاوفها.
- لا انقطع فترة العلاج الموصوفة لك من تلقاء نفسك.
- لا تذكر الدواء نفسه ولا ترفع الجرعات من دون استشارة طبيب.
- لا تترك الدواء فجأة، فمتناهياً للأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب
اتحاد الصيادلة العرب

LEO

— — —

إذا استخدمت فيوسيدين أكثر مما ينبغي
اتصل بطبيك أو قسم الطوارئ أو الصيدلاني إذا كنت قد استخدمت فيوسيدين أكثر مما
هو منكك، في هذه الحالات، أكمل ما قد مصنه طبيك (تشعر ببعض).

Introduzione alla storia della filosofia della lingua

إذا نسبت استخدام فيوسيدين
إذا نسبت استخدام فيوسيدين

لا تستخدم جرعة مضاعفة لتعويض

4. الآثار الجانبية المحتلبة
مثل جماع الأدوية، يمكن أن يسبب هذا الدواء آثاراً جانبية، على الرغم من عدم حدوثها للجميع.