



solution buvable en ampoules

Aspartate d'arginine

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que PARGINE 5 g, solution buvable en ampoules et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre PARGINE 5 g, solution buvable en ampoules ?
3. Comment prendre PARGINE 5 g, solution buvable en ampoules ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver PARGINE 5 g, solution buvable en ampoules ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE PARGINE 5 g, solution buvable en ampoules ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Acide Aminé (A : voie digestive et métabolisme).

Ce médicament est indiqué dans les retards staturaux de l'enfant avec vitesse de croissance insuffisante, ne relevant pas d'un traitement par l'hormone de croissance.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PARGINE 5 g, solution buvable en ampoules ?

Ne prenez jamais PARGINE 5 g, solution buvable en ampoules :

- si vous êtes allergique (hypersensible) à l'un des composants contenus dans Pargine 5 g, solution buvable en ampoules notamment les parahydroxybenzoates de méthyle et de propyle.

Prise d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Informations importantes concernant certains composants de PARGINE 5 g, solution buvable en ampoules

Ce médicament contient des parahydroxybenzoates de méthyle et de propyle et du glycérol.

3. COMMENT PRENDRE PARGINE 5 g, solution buvable en ampoules ?

Posologie

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Administration par voie orale à la dose de 700 mg/kg en une prise quotidienne unique le soir 2 heures après le repas, durant 3 mois ; la dose maximale quotidienne est de 15 g d'aspartate d'arginine, soit de 1 à 3 ampoules par jour selon le poids de l'enfant.

Mode d'administration

Voie orale.

Ne pas injecter.

Fréquence d'administration

Les ampoules diluées dans un verre d'eau doivent être administrées 2 heures minimum après le repas du soir.

Ne pas hésiter si cela est nécessaire à avancer l'heure du dîner afin de respecter cette recommandation.

Durée du traitement

La durée du traitement est fixée à 3 mois.

Se conformer à la prescription du médecin.

Si vous avez pris plus de PARGINE 5 g, solution buvable en ampoules que vous n'auriez dû :
En cas de surdosage accidentel, consultez un médecin.

Si vous oubliez de prendre PARGINE 5 g, solution buvable en ampoules:

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, Pargine 5 g, solution buvable en ampoules est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Si vous remarquez des effets indésirables, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER PARGINE 5 g, solution buvable en ampoules?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser Pargine 5 g, solution buvable en ampoules après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient PARGINE 5 g, solution buvable en ampoules ?

La substance active est :

L-aspartate de L-arginine..... 5 g
Pour une ampoule de 10 ml.

Les autres composants sont :

Glycérol, parahydroxybenzoate de méthyle (E218), parahydroxybenzoate de propyle (E216), glycyrrhizinate mono-ammoniacal, saccharine sodique, arôme caramel (solution aqueuse concentrée de produits obtenus par chauffage de saccharose ou de glucose), arôme abricot (vanilline, aldéhydes C_{18} et C_{16} , acétate d'amyle, caproate d'allyle, ionone, radisol, essences de coriandre, citron, camomille), eau potable

Qu'est ce que PARGINE 5 g, solution buvable en ampoules et contenu de l'emballage extérieur ?

Solution buvable en ampoules.

Ampoule autocassable de 10 ml. Boîte de 20.

Titulaire

MEDA PHARMA

75016 PARIS

Exploitant

MEDA PHARMA

25, boulevard de l'Amiral Bruix

75016 – PARIS – FRANCE

01 56 64 10 70

Fabricant

MEDA MANUFACTURING

Avenue J.F. Kennedy

33700 – MERIGNAC – FRANCE

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est Janvier 2007.