

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

daflon® 500 mg

comprimé pelliculé
Fraction flavonoïque purifiée micronisée

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que DAFLON 500 mg comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament est un veinotonique (il augmente le tonus des veines) et un vasoconstricteur (il augmente la résistance des petits vaisseaux sanguins). Il est utilisé dans le traitement des :

- troubles de la circulation veineuse (jambes lourdes, douleurs, impatiences dans les jambes (besoin impérieux de bouger les jambes survenant notamment en position allongée),
- crises hémorroïdaires.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé ?

Ne prenez jamais DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé :
si vous êtes allergique (hypersensible) aux fractions flavonoïques purifiées, micronisées notamment à la diosmine (ou à l'hespéridine) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

Faites attention avec DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé :

- si vous prenez ce médicament pour des crises hémorroïdaires et que vos troubles persistent au-delà de 15 jours, il est indispensable de consulter votre médecin
- si vous prenez ce médicament pour des troubles de la circulation veineuse (notamment sensation de jambes lourdes) vous devez également veiller :
 - à avoir une bonne hygiène de vie,
 - à éviter l'exposition au soleil, à la chaleur,
 - à ne pas rester debout trop longtemps,
 - à ne pas être en excès de poids.

La marche à pied et éventuellement le port de bas ou chaussettes adaptées favorisent la circulation sanguine.

Prise ou Utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Grossesse

Si vous tombez enceinte pendant votre traitement, ou si vous êtes enceinte et envisagez de prendre ce médicament, demandez l'avis de votre médecin.

Allaitement

L'allaitement est déconseillé pendant la durée du traitement, du fait de l'absence de données sur le passage du médicament dans le lait maternel. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

3. COMMENT PRENDRE DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé ?

Posologie

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

La dose habituelle est de 2 comprimés par jour : 1 comprimé à midi et 1 comprimé le soir, au moment des repas.

Si vous prenez ce médicament pour une crise hémorroïdaire, la dose habituelle est de 6 comprimés par jour pendant 4 jours puis 4 comprimés par jour pendant les 3 jours suivants.

Mode d'administration

Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau.

Fréquence d'administration

Midi et soir au moment des repas.

Durée du traitement

Si vous prenez ce médicament pour des crises hémorroïdaires et que vos troubles persistent au-delà de 15 jours, il est indispensable de consulter votre médecin.

Si vous oubliez de prendre DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

La fréquence des effets indésirables possibles listés ci-dessous est définie en utilisant le système suivant :

- très fréquent (affecte plus de 1 utilisateur sur 10)
- fréquent (affecte 1 à 10 utilisateurs sur 100)
- peu fréquent (affecte 1 à 10 utilisateurs sur 1 000)
- rare (affecte 1 à 10 utilisateurs sur 10 000)
- très rare (affecte moins de 1 utilisateur sur 10 000)
- fréquence inconnue (les données disponibles ne permettent pas d'estimer la fréquence)

Ils peuvent inclure

Fréquent : diarrhée, dyspepsie, nausée, vomissement.

Peu fréquent : colite.

Rare : sensations vertigineuses, céphalées, malaise, rash, prurit, urticaire.

Fréquence inconnue : douleur abdominale, œdème isolé du visage, des paupières, des lèvres. Exceptionnellement, œdème de Quincke.

Déclaration des effets secondaires

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Ceci, s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantages d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé après la date de péremption mentionnée sur la boîte. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

À conserver en dessous de 30°C.

À conserver dans l'emballage extérieur d'origine

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Que contient DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé ?

Les substances actives sont :

Fraction flavonoïque purifiée micronisée	500 mg
quantité correspondant à : Diosmine	450 mg
Flavonoïdes exprimés en hespéridine	50 mg
par comprimé	

Les autres composants sont

Carboxyméthylamidon sodique, cellulose microcristalline, gélatine, stéarate de magnésium, talc, glycérol, hypromellose, macrogol 6000, laurylsulfate de sodium, oxyde de fer jaune(E 172), oxyde de fer rouge (E 172), dioxyde de titane (E 171).

Qu'est ce que DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé et contenu de l'emballage extérieur ?

10, 30 ou 60 comprimés pelliculés sous plaquettes thermoformées (PVC-Aluminium).

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.



Les Laboratoires Servier - France

Fabricant

Les Laboratoires Servier Industrie

905, route de Saran

45520 GIY, FRANCE

Date de révision de la notice : Juillet 2016