

نشرة معلومات المريض

فيوسيناليميك فيوسيناليميك قطرة عين لزجة، 10 مجم/جم
حضر فيوسيناليميك

اقرأ هذه النشرة كاملة بعناية قبل البدء في استخدام هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات تهمك.

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج إلى قرائتها مرة أخرى.
- إذا كانت لديك أي أسئلة إضافية، استشر الطبيب أو الصيدلي أو الممرض الخاص بك.

- تم وصف هذا الدواء لك فقط. تجنب تمريره إلى الآخرين. فقد يتسبب في الحال الأذى بهم حتى وإن كانت أعراض المرض لديهم مماثلة لتلك التي تعاني منها.

- إذا كنت تعاني من أي آثار جانبية، تحدث إلى الطبيب أو الصيدلي أو الممرض الخاص بك. يشمل ذلك أي آثار جانبية محتملة غير واردة في هذه النشرة. انظر القسم 4.

في هذه النشرة

1. ما هي قطرة فيوسيناليميك فيوسيناليميك وما هي استخداماتها.
2. ما الذي ينبغي عليك معرفته قبل استخدام قطرة فيوسيناليميك

فيوسيناليميك

3. كيف ينبغي استخدام قطرة فيوسيناليميك فيوسيناليميك

4. الآثار الجانبية المحتملة.

5. كيف ينبغي تخزين قطرة فيوسيناليميك فيوسيناليميك

6. معلومات إضافية

1. ما هي قطرة فيوسيناليميك فيوسيناليميك، وما هي استخداماتها
قطرة فيوسيناليميك فيوسيناليميك علاج ضد أنواع الكثير مثل المكوررة

العنقودية، والعقدية، والنترسية، والمستمية، والموراكسيلة، والوتدية.

تضمن تركيبة فيوسيناليميك معدلة التحرر تلامس طولياً مع غشاء الملتحمة. ومن ثم يوفر وضعاً مرتين يومياً ترتكزات كافية في جميع أنحاء العين ذات الصلة. كما تختفي فيوسيناليميك فيوسيناليميك الخاطل المائي على نحو جيد.

تؤدي هذه القطرة أيضاً في حالات التهابات العين البكتيرية الناجمة عن العضيات الحساسة: مثل التهاب الملتحمة، والتهاب الجفن، وشحاذ (دمد)، العين، والتهاب القرنية، والتهاب الكيس الدمعي، وتلك المرتبطة بإذالة الأجياس الغربية أيضاً.

2. ما الذي ينبغي عليك معرفته قبل استخدام قطرة فيوسيناليميك

فيوسيناليميك

تجنب استخدام قطرة فيوسيناليميك فيوسيناليميك إذا كنت تعاني من حساسية تجاه حمض الفيوسيناليميك أو أي من مكونات هذا الدواء الآخر (المذكورة في القسم 6).

3. التحذيرات والاحتياطات

تجنب استخدام قطرة فيوسيناليميك فيوسيناليميك فيوسيناليميك بعد الإلقاء قبل الكثيريا بالمضادات الحيوية.

4. ينبع عدم ارتداء العدسات اللاصقة عند استخدام قطرة فيوسيناليميك فيوسيناليميك

استشر الطبيب أو الصيدلي الخاص بك قبل استخدام قطرة فيوسيناليميك فيوسيناليميك.

الأدوية الأخرى وقطرة فيوسيناليميك فيوسيناليميك

أيضاً ينبع من الصيدلي الخاص بك إذا كنت تستخدم أو استخدمت مؤخراً أو قد تستخدم أي دواء آخر.

الحمل والرضاعة

إذا كنت حاملاً أو ترضعين رضاعة طبيعية، أو تعتقدين بأنك حامل، أو تخطلين للإنجاب، يرجى استشارة الطبيب أو الصيدلي الخاص بك قبل تناول هذا الدواء.

القيادة واستخدام الآلات

بعد وضع الدواء، قد يحدث تشوش في الرؤية لفترة قصيرة. تجنب القيادة

أو استخدام الآلات حتى تعود الرؤية لديك لوضوحها المعتاد.

قطرة فيوسيناليميك فيوسيناليميك تحتوي على كلوريد البنزوكينيوم

- قد يتم امتصاص كلوريد البنزوكينيوم بواسطة العدسات اللاصقة الثالثة، وقد يتسبب في تغير لون العدسات اللاصقة، لذا ينبع علىك إزاله العدسات اللاصقة قبل استخدام هذا الدواء، ومن ثم إعادة ارتدائها بعد مرور 15 دقيقة.

- قد يتسبب كلوريد البنزوكينيوم في تهيج العين، لاسيما إذا كنت تعاني من جفاف العين أو اضطرابات في القرنية (الطبقة الصافية في مقدمة العين). إذا شعرت بإحساس غير طبيعي أو سعة أو ألم في العين بعد استخدام هذا الدواء، تحدث إلى الطبيب الخاص بك.

3. كيف ينبغي استخدام قطرة فيوسيناليميك فيوسيناليميك

احرص دائمًا على استخدام هذا الدواء تباعاً كما أخبرك الطبيب أو الصيدلي الخاص بك. وفي حالة عدم التأكد من كيفية الاستخدام، احرص على استشارة الطبيب أو الصيدلي الخاص بك.

الجرعة الموصى بها:

يتم وضع قطرة واحدة في العين مرتين يومياً، وينبغي أن يستمر العلاج لمدة يومين على الأقل بعد أن تبدو العين طبيعية.

إذا كانت لديك أي سؤال إضافية حول كيفية استخدام هذا الدواء، اسأل الطبيب أو الصيدلي الخاص بك.

4. الآثار الجانبية المحتملة

كما هو الحال مع جميع الأدوية، يمكن أن يتسبب هذا الدواء أثراً جانبياً بالرغم من أنها قد لا تتصيب الجميع.

علياً بآن فيوسيناليميك فيوسيناليميك لديها قابلية منخفضة للغاية لإثارة

الحساسية.

وقد تم الإبلاغ عن الآثار الجانبية المذكورة أدناه وفقاً للوتيرة التالية:

آثار شائعة: قد ت慈悲 شخصاً واحداً من كل 10 أشخاص

• حرقان العين

• لسعه العين

• تشوش الرؤيه

آثار غير شائعة: قد ت慈悲 شخصاً واحداً من كل 100 شخص

• تورم جفن العين

• رد الغفل التحسسي

آثار غير معروفة: يتعذر تقدير و Tingrها من البيانات المتاحة

• الكحة

• ظهور تورم أو انتفاخ حول منطقة العين

• المفعح الجلدي

• القشعريرة

• ظهور تورم تحت الجلد

- في حالة تفاقم أي من هذه الأعراض الجانبية، أو ملاحظة أي آثار جانبية غير الواردة في هذه النشرة، يرجى استشارة الطبيب أو مقدم الرعاية الصحية أو الصيدلي الخاص بك.

5. كيف ينبغي تخزين قطرة فيوسيناليميك فيوسيناليميك
يُحفظ هذا الدواء لك فقط. تجنب تمريره إلى الآخرين.

تجنب تخزين الدواء في درجة حرارة فوق 30 درجة مئوية. واحرص علىبقاء الطعام مغلقاً بإحكام.

تخصل من الدواء بعد مرور 28 يوماً من فتحه.

تجنب الخلص من أي أدوية في مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. وسائل الصيدلي الخاص بك حول كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد بحاجة إليها. تساعد هذه التدابير في حماية البيئة.

6. معلومات إضافية

أ. ما الذي تحتوي عليه قطرة فيوسيناليميك فيوسيناليميك

- قطرة فيوسيناليميك فيوسيناليميك هي عبارة عن محلول لزج بلون أبيض إلى بنسبة 1% من حمض الفيوسيناليميك.

- قطرة فيوسيناليميك فيوسيناليميك تحتوي على 10 مجم من حمض الفيوسيناليميك في كل جرام.

- مكوناتها الأخرى هي كلوريد بنزوكينيوم، وإيدريوكسيد صوديوم، ومانيتول، وكاريوبير، وهيدروكسيد صوديوم، وماماء حفن معقم.

ب. كيف تبدو قطرة فيوسيناليميك فيوسيناليميك، وما هي محتويات العبوة

قطرة فيوسيناليميك فيوسيناليميك هي عبارة عن محلول لزج بلون أبيض إلى أبيض مصفر. وهي عبارة عن قطرة عين من حمض الفيوسيناليميك، وتتأتي في أكياس من 5 مل و 3 جم.

ج. حامل رخصة التسويق والشركة المصنعة

Hamidipharm Limited

أيرلندا
Temple Chambers, 3 Burlington Road, 4 Dublin, Ireland,

الشركة المصنعة:

LEO Laboratories Ltd.

285 Cashel Road, Crumlin, Dublin 12, Ireland,

د. تمت مراجعة هذه النشرة آخر مرة في يونيو 2019

Amdipharm هي حاملة رخصة استخدام العلامة التجارية المسجلة فيوسيناليميك

هـ. للإبلاغ عن أي آثار جانبية

• المملكة العربية السعودية:

المركز الوطني للتقويم والسلامة الدوائية (NPC):

فأكسن: 7662-205-11-966+.

يمكنك الاتصال بمركز NPC عبر هاتف رقم

19999-2356-2317-2038222-11-966+.

مركز اتصالات الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA):
بريد إلكتروني: npc.drug@sfda.gov.sa
موقع الويب: https://ade.sFDA.gov.sa/

دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى

- يرجى الاتصال بالهيئة المختصة

و. مجلس وزراء الصحة العرب

ينبغي طباعة البيان التالي الصادر عن مجلس وزراء الصحة العربي في نشرة معلومات المريض.

هـ. الدواء منتج هو دواء

- الدواء منتج، لكنه لا يعامل معاملة المنتجات الأخرى.

- الدواء منتج ي يؤثر على الصحة، واستهلاكه خالفاً للتعليمات يشكل خطراً على صحتك.

- احرص على اتباع وصفة الطبيب وطريقة الاستخدام وتعليمات الصيدلي الذي ي开具 الدواء بمحابيرها.

- الطبيب والصيدلي هما الخبراء بالأدوية وفوائدها ومخاطرها.

- تجنب قطع قترة العلاج الموصوفة لك من تقاء نفسك.

- تجنب تكرار نفس الدواء أو زيادة جرعتك دون استشارة الطبيب.

جـ. مجلس وزراء الصحة العرب
اتحاد الصيادة العربي