



يجب قاعدة هذه النشرة باللامبورغ قبل بدء الدواعي على هيل ومات مدة لدك.

يجب الاحتفاظ بهذه النشرة، فقد تحتاج إلى قرايتها مرة أخرى.

إذا كان هناك المزيد من الاستفسارات، فيجب سؤال الطبيب أو الصيدلاني.

قد يؤديه إلى اعطاء غيره للأخر. قد يؤديه حتى لو كانت لديه نفس الأعراض والعلامات المرضية الموجودة لديك.

يجب استشارة الطبيب أو الصيدلاني إذا تعرضت لأية آثار جانبية محتملة غير واردة في هذه النشرة. انظر القسم 4.

يجب قراءة هذه النشرة.

1. معلومات عن سيريلاتيك ديسكس.

2. معلومات يجب معرفتها قبل استخدام سيريلاتيك.

3. كيفية استخدام سيريلاتيك.

4. الآثار الجانبية المحتملة.

5. كيفية تخزين سيريلاتيك.

6. مخobiات العبوة ومعلومات أخرى.

يجب قراءة هذه النشرة قبل بدء الدواعي.

يحتوي سيريلاتيك على دوالين، وهو سالميتيرونول وفلوتوكاربون بروبيونات.

سالميتيرونول عبارة عن مسحوق الشعب الهوائية طول المغقول، تساعد مسحوق الشعب الهوائية في بقاء المسالك الهوائية في الرئة مفتوحة، وهذا يجعل استنشاق

الهواء والزفير أسهل، وتذوب التأثيرات لمدة 2 ساعة على الأقل.

فلوتكاربون بروبيونات عبارة عن سيريلاتيك بقليل الترم وتفريح في الرئتين.

وصف الطبيب هذا الدواء المساعدة في منع حدوث مشكل في التنفس مثل:

• الربو.

• مرض الشعب الهوائية المزمن (COPD). سيريلاتيك، بجرعة 50، ميكروجرام، يقلل حد تأثيرات المرض لأعراض مرض الشعب الهوائية المزمن.

ويجب استخدام سيريلاتيك كل يوم وارشادات الطبيب. وهذا يسمح أن يعلم الدواء كل انتفاف. قد يؤديه إلى اعطاء غيره للأخر.

جب عدم استخدام سيريلاتيك، وفجراً، وفي حالات عدم سيريلاتيك، فجراً، وفي حالات عدم سيريلاتيك.

يجب استخدام سيريلاتيك من وجود السكر في الدم.

• الرئتين (T) أو في الساقين أو وجود حالات عدم أخرى في الرئة.

• اصل بطيء إذا كنت تعاني من عدم وضوح الرؤية أو اضطرابات بصرية أخرى.

وسوسيرياتايد.

إذا كنت تعاني من حساسية سالميتيرونول أو فلوتكاربون بروبيونات أو من المكون الآخر لاكتوز أحادي الإماهة.

تجدر انتباهك إلى:

• وجود مرض في القلب، مثل اضطراب ضربات القلب أو سرعة ضربات القلب.

• فرط نشاط الغدة الدرقية.

• ارتفاع ضغط الدم.

• داء السكري (قد يؤدي سيريلاتيك من وجود السكر في الدم).

• التسلل (TB) أو في الساقين أو وجود حالات عدم أخرى في الرئة.

اصل بطيء إذا كنت تعاني من عدم وضوح الرؤية أو اضطرابات بصرية أخرى.

أبلغ الطبيب أو المفزعول، مثل الباراسيتامول، ويجب دائم تتحمل بـ قاد" سريع المفزعول معك.

موانع استخدام سيريلاتيك:

إذا كنت تعاني من تناول أي دوائية أخرى، أو تناولها مؤخراً، أو قد لا يكون من الممكن الآخر لاكتوز أحادي الإماهة.

يجب استشارة الطبيب قبل تناول سيريلاتيك في الحالات التالية:

• القلق الشديد.

• وجود مرض في القلب، مثل اضطراب ضربات القلب أو سرعة ضربات القلب.

• فرط نشاط الغدة الدرقية.

• ارتفاع ضغط الدم.

• داء السكري (قد يؤدي سيريلاتيك من وجود السكر في الدم).

• التسلل (TB) أو في الساقين أو وجود حالات عدم أخرى في الرئة.

اصل بطيء إذا كنت تعاني من عدم وضوح الرؤية أو اضطرابات بصرية أخرى.

أبلغ الطبيب أو المفزعول، مثل الباراسيتامول، ويجب دائم تتحمل بـ قاد" سريع المفزعول معك.

علىها بون وفحة، وهذا ظاهر لأنها قد لا تكون من الممكن تناول سيريلاتيك مع بعض الأدوية الأخرى.

أبلغ الطبيب إذا كنت تتناول أي دوائية أخرى، أو تناولها مؤخراً، أو قد لا يكون من الممكن الآخر لاكتوز أحادي الإماهة.

تجدر انتباهك إلى:

• مصادرات بيتا في معظم الأحيان ارتفاع ضغط الدم أو حالات القلب الأخرى.

• الأدوية المستخدمة لعلاج حالات العصوى (مثل كيوكارنول وارينوكارنول وارينوكارنول) بما في ذلك بعض الأدوية لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية (HIV).

(مثل رينوفار، المنتجات المحتوية على كوربيسيتينات). يمكن أن يؤدي بعض هذه الأدوية مقدار فلوتكاربون بروبيونات أو سالميتيرونول في الترم، وقد يؤدي هذا من

خطورة المعاذه من آثار جانبية مع سيريلاتيك، بما في ذلك اضطراب ضربات القلب، أو قد يجعل الالار جانبية أسوأ. قد يرعب طبيب برميتك بعذبة إذا كنت تتناول هذه الأدوية.

• التسلل (TB) أو في الساقين أو وجود حالات عدم أخرى في الرئة.

تجدر انتباهك إلى:

• تستخدم مدرات البول، المعروفة أيضاً باسم "اقرب البول" لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

• مساعات الشعب الهوائية الأخرى (مثل سالوتامول).

• أدوية الرئتين. تجدر انتباهك إلى:

• الرحمل والبرضاعة الطبيعية.

إذا كنت حملأ أو ترضعين رضاعة طبيعية أو تعتقدين أنك حامل أو تخططن لإنجاب، فيجب استشارة الطبيب أو الصيدلاني قبل تناول هذا الدواء.

ليس من المرح أن يؤثر سيريلاتيك على قدرت على القيادة أو استخدام أي آلات.

يحتوي سيريلاتيك على ما يصل إلى 12،5 ملجراماً من الالكتوز أحادي الإماهة في كل جرعة. لا تسبب كمية الالكتوز في هذا الدواء أي مشكل عادة للأشخاص

الذين لا يتناولون الالكتوز. يحتوي الالكتوز أحادي الإماهة سواع على كيميات صغيرة من بروبيونات الطبيب، والتي قد تسبب تفاعلات حساسية.

3. سيريلاتيك ديسكس

يجب استخدام سيريلاتيك كل يوم، حتى يوصي بها الطبيب أو الصيدلاني بالضبط. يجب استشارة الطبيب أو الصيدلاني قبل تناول هذا الصبح.

يجب استخدام سيريلاتيك في حالة الشك بشأن كيفية استعماله على الوجه الصحيح.

يجب استخدام سيريلاتيك أو الصيدلاني في حالة الشك بشأن كيفية استعماله على الوجه الصحيح.

يجب عدم التوقف عن تناول سيريلاتيك أو تقليل الجرعة بدون الشاور مع الطبيب أو

ينبع انتباهك إلى:

• مثل جميع الأدوية، يمكن أن يتسبب هذا الدواء في حدوث أعراض جانبية، لكن ليس بالضرورة أن يصاب بها جميع الأشخاص. لتقليل فرص حدوث الآثار الجانبية،

سوف يصف الطبيب أقل جرعة من السيريلاتيك للتحكم في الربو أو مرض الشعب الهوائية المزمن (COPD) لديك.

حسوا بـ سيريلاتيك المزمن على الوجه أو الشفاف على الوجه المصبوغ.

أيضاً وجود حكة (شرى) وتورم (عدة في الوجه أو الشفاف أو النسا أو الحقن)، أو قد تشعر بشكل مفاجئ أن قلبك ينبعش بشكل سريع جداً أو قد تشعر بالإغماء ودوار

في الرأس (والذي يؤدي أيضًا إلى السقوط أو فقد الوعي). وأنك تتعانى من أي من اشتخدام سيريلاتيك ديسكس.

اباد الردود والآثار الجانبية المزعجة في مرض الشعب الهوائية المزمن (الزفير العذب). أشجار طبيبك إذا حدث لك أي من الآثار الجانبية التالية أثناء تناول سيريلاتيك ديسكس.

• الحمى أو الرعشة.

• زيادة إفراز المخاطر أو تغير لونه.

• زيادة السعال أو زيادة مشكل التنفس.

تم سرد الآثار الجانبية الأخرى أدناه:

شائعة جدًا، أكثر من 5% من بيون كل 100 أشخاص:

• صداع - يصبر هذا أفضل مع استمرار العلاج.

• تم تغير جوود عدد مرات الرياح بين البرد وبين المرضي الذين يعانون من مرض الشعب الهوائية المزمن (COPD).

تكون هناك حاجة لاستخدام المزيد من الدواء "المسكن" سيريلاتيك ديسكس.

كما لو تحطط الآثار الجانبية التالية في المرضي المصابين بمرض الشعب الهوائية المزمن (COPD):

• الكمات والكسور.

• تورم الجيوب الأنفية (العنق) أو التهاب في الأنف والخدود وخلف العينين، وفي بعض الأحيان مع صداع دائم.

• انخفاض مقدار البوتاسيوم في الدم (يتم تعانى أيضًا من اضطراب في ضربات القلب وضعف في العضلات وتشنج).

غوشانج تجاهي، أقل من 5% من بيون كل 100 شخص:

• زيادة في حجم العضلات العلوية لجهاز التنفس (الجيوكروز) في الدم (فقط جيوكروز المرضي). إذا كنت تعانى من السكري، قد تكون هناك حاجة لمتابعة السكري في الدم بشكل أكبر وربما تعديل

العلاج العادي من السكري.

• إنعام عضلة العين (عضة غالنة في العين).

ضربات القلب سريعة (النفخة).

الشعور بالصداع.

الشعور بالآلام في المعدة.

الشعور بالآلام في المعدة (يحدث في المعدة).

زادت ازديادًا، أقل من 1% من بيون كل 1000 شخص:

سويفوك الشعب الهوائية (الزفير العذب) وضربات القلب السريعة وغير المتنظم (الخفاف). عادة ما تكون هذه الأعراض غير ضارة ونقل مع تواصل العلاج.

سيريلاتيك ديسكس يزوي نفسك بـ 5 ميكروجرام/جرعة بـ 50 ملجراماً من سالميتيرونول (في شكل سالميتيرونول زابنافوت) و 100 أو 200 ميكروجرام من فلوتكاربون بروبيونات.

• المكون الآخر هو لاكتوز أحادي الإماهة (الذرة) الذي يحتوي على بروبيونات.

• لا تجدر انتباهك إلى:

• عدم وضوح الرؤية.

4. تجذير سيريلاتيك ديسكس

متوافق مع سيريلاتيك ديسكس.

كل جرعة معدة مبنية على جرعة سيريلاتيك ديسكس.

يحتوي سيريلاتيك ديسكس ومحبيتات العبوة.

شكل يحتوي على شريط من ورق الألومنيوم. يجعل هذا الشريط من سيريلاتيك ديسكس.

كل جرعة معدة مسبقاً.

الأجهزة معدة في:

عرو وحدة 28 × 28 جرعة استنشاق ديسكس.

أو 1 أو 2 أو 4 أو 8 جرعة ديسكس.

قد لا تتوفر جميع أحجام العرو في بعض الأسواق.

الشرائط المصنوعة:

Glaxo Wellcome Production, Evreux, France.

* عصو موجعة شركات GSK.

العلامات التجارية المملوكة أو مزحة لجموعة شركات GSK

② 2019 حقوق الطبع محفوظة لمجموعة شركات GSK أو الجهات المرتبطة باستخدام منتجات GSK، يرجى التواصل معنا عبر: gulf.safety@gsk.com

تمت آخر مراجعة لهذه النشرة في نوفمبر 2019.

إن هذا دواء متاح في جميع الأدوية، يمكن أن يتسبب هذا الدواء في حدوث أعراض جانبية، وقد تعانى من أي من الآثار الجانبية المدرجة أدناه.

يجب استشارة الطبيب أو الصيدلاني إذا تعرضت لأية آثار جانبية، ولمنع حدوث هذه الأعراض، قد يصف الطبيب تناول المزيد من السيريلاتيك ديسكس في صورة

أشجار طبيبك أقل جرعة من سيريلاتيك ديسكس.

إذا كانت لديك أي آثار جانبية أخرى حول استخدام هذا الدواء، يجب سؤال الطبيب أو المرضية أو الصيدلاني.

للدربو

باللهب والمرادون في سن 12 عـ باللهب

مـ سيريلاتيك ديسكس.

100/0، 200/0، 500/0 - جرعة استنشاق واحدة مرتين يومياً

م