

الاستخدام غير الألق

استخدام الإندروجين بصورة خاطئة لتعزيز القدرة في الألعاب الرياضية يحمل مخاطر صحية شديدة و لا يُنصح به.

استخدام أدوية أخرى

قد تؤثر الأدوية الأخرى على مفعول سوستانون ٢٥٠، أو قد يؤثر سوستانون ٢٥٠ على الأدوية الأخرى. يجب أن تخبر طبيبك الخاص أو الصيدلي إن كنت تستخدم (أو تتوى استخدام) أدوية مضادة لمرض السكر أو مضادة للتجلط.

كيفية استخدام سوستانون ٢٥٠

يُعطى هذا الدواء بواسطة طبيب أو ممرضة فقط.

تُعطى الحقن بعمق في العضل (على سبيل المثال في الأرداف، أعلى الساق أو أعلى الذراع). عادة ما تكون الجرعة حقنة واحدة ١ مللى كل ثلاثة أسابيع.

إن كان لديك انطباع أن مفعول سوستانون ٢٥٠ قوي جداً أو ضعيف جداً، تحدث مع طبيبك فوراً.

وإن استخدمت سوستانون ٢٥٠ أكثر مما ينبغي:

لا ينطبق.

إذا نسيت أخذ سوستانون ٢٥٠:

لا ينطبق.

الأثار عند وقف العلاج بسوستانون ٢٥٠:

أثار سوستانون لا تتوقف مباشرةً عند وقف العلاج، لكنها تتراجع تدريجياً.

الأثار الجانبية المحتملة

شأنه شأن جميع الأدوية، يمكن أن يتسبب سوستانون ٢٥٠ في آثار جانبية.

الأثار الجانبية التي تم الإبلاغ عنها مع العلاج بالسوستانيون بصفة عامة هي:

• حكة؛

• حب الشباب؛

• غثيان؛

• تغير في اختيارات وظائف الكبد؛

• تغير في مستويات الكوليستيرول (تغير في ابيض الدهون) ؛

• اكتئاب، عصبية، اضطرابات مزاجية؛

• ألم بالعضلات (ألم عضلي) ؛

• احتجاز السوائل بالأنسجة، تمييز عادة بتورم الكاحل أو الأقدام؛

• ارتفاع ضغط الدم؛

• زيادة في عدد خلايا الدم الحمراء (الخلايا التي تحمل الاكسجين في دمك)

• تغير في الرغبة الجنسية؛

• انتصاب ممتد غير طبيعي و مؤلم للفضيب ؛

• اضطراب في تكوين الحيوانات المنوية؛

• ظهور صفات أنثوية (تضخم في الثدي) ؛

• نمو البروستاتا لحجم ممتلئ للمجموعة العمرية المعنية؛

• زيادة في مستويات دالة معينة في الدم مصاحبة لسرطان البروستاتا (ارتفاع PSA)؛

• زيادة في نمو ورم سرطاني صغير بالبروستاتا لم يتم بعد اكتشافه (تطور لورم سرطاني دون-كليتيكي بالبروستاتا).

نظراً لطبيعة سوستانون ٢٥٠، لا تتمكس الأثار الجانبية بسرعة عند وقف الدواء. الأدوية المحقونة بصفة عامة قد تتسبب في تفاعل موضعي في مكان الحقن. إذا لاحظت أي آثار جانبية لم يرد ذكرها في هذه النشرة، يُرجى إبلاغ طبيبك الخاص أو الصيدلي.

تخزين سوستانون ٢٥٠

يُخزن في درجة حرارة بين ٨°م إلى ٣٠°م بعيداً عن الضوء.

لا تستخدم سوستانون ٢٥٠ بعد انتهاء تاريخ الصلاحية المذكور على العبوة الخارجية أو البطاقة المملصة.

يُحفظ سوستانون ٢٥٠ بعيداً عن متناول و مرأى الاطفال.

إذا كان لديك مزيد من الأسئلة أو تتطلب المعلومات التوصيفية الكاملة الخاصة بسوستانون ٢٥٠، برجاء استشارة طبيبك الخاص أو الصيدلي.

ان. ق. أ. أورجانون،

٦ كلوسترشترات،

٥٣٤٩ اي بي أوس، هولندا

آخر مراجعة لهذه النشرة في يونيو ٢٠٠٦

إن هذا الدواء

- الدواء مستحضر يورث علي صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك، فالعليب والصيدلاني هما الخياران بالدواء وينبغه وضره
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من لقاء نسك
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبيب
- لا تترك الدواء في متناول أيدي الاطفال

مجلس وزراء العرب
 واتحاد الصيادلة العرب

برجاء قراءة كل هذه النشرة بعناية قبل أن تبدأ بأخذ هذا الدواء.

- احتفظ بهذه النشرة. قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كانت لديك مزيد من الأسئلة، برجاء سؤال طبيبك الخاص أو الصيدلي.
- لقد تم وصف هذا الدواء لك شخصياً و لا ينبغي أن تعطيه لآخرين. قد يسبب ضرر لهم، حتى لو كانوا يعانون من نفس الأعراض التي تعاني منها.

في هذه النشرة:

١- ما هو سوستانون ٢٥٠ و قيم يُستخدم

٢- قبل استخدام سوستانون ٢٥٠

٣- كيفية استخدام سوستانون ٢٥٠

٤- الأثار الجانبية المحتملة

٥- تخزين سوستانون ٢٥٠

سوستانون ٢٥٠، محلول للحقن.

• **المادة الفعالة هي:** إستريرات التستوستيرون

كل مليلتر من المحلول الزيتي يحتوي على:

- بروبيونات التستوستيرون ٣٠ مجم (مليجرامات)

- فينيل بروبيونات التستوستيرون ٦٠ مجم

- ايزو كابرورات التستوستيرون ٦٠ مجم

- ديكانوات التستوستيرون ١٠٠ مجم

• **المكونات الأخرى هي:**

محلول الحقن يحتوي على زيت الأراكس والكحول البنزيلي.

١- ما هو سوستانون ٢٥٠ و قيم يُستخدم

تتحول المواد الفعالة للسوستانون إلى تستوستيرون في جسمك. تستوستيرون هو الهرمون الذكري الطبيعي الذي يفرض بواسطة الخصيتين، و هو ضروري للنمو الطبيعي، التطور ووظيفة الأعضاء الجنسية الذكرية و الخصائص الثانوية الذكرية الجنسية. إنه ضروري لنمو شعر الجسم، تطور العظام و العضلات، و هو يحفز إنتاج خلايا الدم الحمراء. إنه يعمل أيضاً على تغليظ صوت الرجال. تستخدم المستحضرات التي تحتوي على تستوستيرون في تعويض التستوستيرون عند الأشخاص الذين يعانون من عدم وجود تستوستيرون طبيعي أو قليل (وهي حالة تُعرف بالقصور التناسلي).

سوستانون ٢٥٠ محلول للحقن. محلول شفاف، لونه أصفر باهت.

٢- قبل استخدام سوستانون ٢٥٠

لا تستخدم سوستانون ٢٥٠ إذا:

• كان لديك الآن أو في أي وقت مضى ورم بالبروستاتا أو الثدي

• تعاني من حساسية تجاه واحد أو أكثر من مكونات المنتج

• تبلغ أقل من ٣ سنوات

تعامل بعناية خاصة مع سوستانون ٢٥٠

المتابعة الفائقة من جانب الطبيب ضرورية لعلاج الصبية الصغار بما أن استخدام التستوستيرون يمكن أن يتسبب في تطور جنسي مبكر و اضطراب في النمو. المتابعة الفائقة من جانب الطبيب ضرورية أيضاً في المرضى المسنين، بما أن الهرمونات الذكرية يمكن أن تزيد من حجم غدة البروستاتا. بالإضافة لذلك، سيتم عمل اختبارات دم، على فترات منتظمة، للتأكد من مستوى المادة الحاملة للاكسجين في خلايا دمك الحمراء (الهيموجلوبين). في حالات نادرة جداً، يزيد عدد خلايا الدم الحمراء بصورة مفرطة مما يؤدي إلى مضاعفات. قد تكون الحوصات الطبية ضرورية أيضاً في بعض الحالات الأخرى. لذلك، ابغ طبيبك إن كان لديك الآن أو في أي وقت مضى:

• مرض بالقلب؛

• مرض كلوي؛

• مرض كبدي؛

• ارتفاع في ضغط الدم؛

• شكوى في البروستاتا، على سبيل المثال مشاكل في ادرار البول.

إذا كنت تعاني من انقطاع النفس أثناء النوم (انقطاع مؤقت بالتنفس أثناء النوم)، قد يزداد هذا الأمر سوءاً بسبب استخدامك للمنتجات التي تحتوي على التستوستيرون. أخبر طبيبك إن كنت قلق بهذا الشأن.

استخدام سوستانون ٢٥٠ مع الطعام و الشراب

لا ينطبق.

الحمل

استشر طبيبك الخاص أو الصيدلي قبل أخذ أي دواء.

إذا كنت حاملاً، أو تخطئين إنك ربما حامل: لا تستخدم سوستانون ٢٥٠.

الرضاعة

استشر طبيبك الخاص أو الصيدلي قبل أخذ أي دواء.

إذا كنت ترضعين: لا تستخدم سوستانون ٢٥٠.

القيادة واستخدام الآلات

على قدر ما هو معروف، سوستانون ليس له آثار مؤنفة على الانتباه أو التركيز.

معلومات مهمة بخصوص بعض مكونات سوستانون ٢٥٠

يحتوي سوستانون على الكحول البنزيلي لذلك لا يجب اعطائه للأطفال الذين يبلغون أقل من ٣ سنوات.