

MAGNÉ B6® 48 mg/5 mg

ماغني ب 6® 48 ملغ / 5 ملغ أقراص مغلفة

مغنيزيوم - فيتامين ب ٦

الرجاء قراءة هذه النشرة بالكامل لأنها تحتوي على معلومات مهمة لك.

- احتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج إلى قراءتها مجدداً.
- إسلأل الصيدلاني إذا كنت تحتاج إلى المزيد من المعلومات أو النصائح.
- يجب عليك استشارة الطبيب في حال ساءت عوارضك أو لم تتحسن.
- في حال تفاقم أحد التأثيرات الجانبية أو في حال لاحظت أي تأثيرات جانبية غير مذكورة في هذه النشرة، الرجاء أن تعلم الطبيب أو الصيدلاني.

في هذه النشرة:

1. ما هي أقراص ماغني ب 6 المغلفة 48 ملغ/5 ملغ وما هي دواعي استعمالها
2. قبل أن تأخذ أقراص ماغني ب 6 المغلفة 48 ملغ/5 ملغ
3. طريقة أخذ أقراص ماغني ب 6 المغلفة 48 ملغ/5 ملغ
4. التأثيرات الجانبية المحتملة
5. طريقة حفظ أقراص ماغني ب 6 المغلفة 48 ملغ/5 ملغ
6. معلومات إضافية

1. ما هي أقراص ماغني ب 6 المغلفة 48 ملغ/5 ملغ وما هي دواعي استعمالها

الغنة الدوائية العلاجية

مكملات مغنيزية

داعي الاستعمال العلاجي

يوصف هذا الدواء لعلاج النقص في المغنيزيوم الذي يؤثر على

2. قبل أن تأخذ أقراص ماغني ب 6 المغلفة 48 ملغ/5 ملغ
- إذا قال لك طبيبك أنك لا تتحمل بعض أنواع السكر استشره قبل أخذ هذا الدواء.

الاستعمال

لا تأخذ أقراص ماغني ب 6 المغلفة 48 ملغ/5 ملغ،

- إذا كنت تعاني من حساسية ضد أي مركب من مركبات الدواء (راجع فقرة «ما تحتوي أقراص ماغني ب 6 المغلفة 48 ملغ/5 ملغ»).
- إذا كنت تعاني من قصور كلوي حاد (مثل كلوي).

في حال الشك من الضروري استشارة الطبيب أو الصيدلاني.

محاذير مناسبة للاستعمال - تحذيرات خاصة

اعتمد عناية خاصة مع أقراص ماغني ب 6 المغلفة 48 ملغ/5 ملغ،

تحذيرات

في حال كنت تعاني من نقص حاد في المغنيزيوم، يجب البدء بالعلاج في الوريد. ينطبق هذا كذلك على المرضى الذين يعانون من سوء الامتصاص.

في حال كنت تعاني أيضاً من نقص في الكالسيوم، ينبغي في معظم الحالات تصحيح نقص المغنيزيوم أولاً قبل تناول الكالسيوم.

بما أن هذا الدواء يحتوي على السكر، يمنع تناوله إذا كنت تعاني من عدم تحمل الفركتوز أو من تآثر سوء امتصاص الفركتوز والغالاكتوز أو من نقص مائز السكر-إيزومالتاز (أمراض وراثية نادرة).

يمكن أن يسبب أخذ جرعات عالية من البوريدوكسين (فيتامين ب 6) لمدة طويلة من الزمن (عدة أشهر أو حتى سنوات) إحساساً بالوخز والاضطرابات في التوازن وعاشاً في اليدين والقدمين وصعوبة في تنسيق الحركات. تخففي هذه التأثيرات عادة عند إيقاف العلاج.

محاذير الاستعمال

هذا الدواء مخصص للاستعمال لدى البالغين ولدى الأطفال فوق السادسة من العمر.

تتوافر أدوية مناسبة للأطفال ما دون السادسة من العمر.

في حال كنت تعاني من قصور كلوي معتدل، يجب اعتماد الحذر لتفادي خطر زيادة مستويات المغنيزيوم في الدم.

في حال الشك لا تتردد باستشارة الطبيب أو الصيدلاني.

استعمال أدوية أخرى

ينبغي تفادي التفاعلات المحتملة بين عدة أدوية، وخاصة الفوسفات أو أملاح الكالسيوم، يجب عليك أن تعلم طبيبك أو الصيدلاني دائماً يأتي أدوية أخرى تتناولها.

الحمل والإرضاع

الحمل

يمكن استعمال هذا الدواء في أي مرحلة من مراحل الحمل عند الحاجة. إذا اكتشفت أنك حامل في خلال فترة العلاج، استشري طبيبك الذي سيفرز مواصلة العلاج أو لا.

استشري الطبيب أو الصيدلاني قبل استعمال أي دواء.

الإرضاع

لا يجدر بالنساء المرضعات أخذ أكثر من 20 ملغ/5 ملغ من الفيتامين ب 6.

استشري الطبيب أو الصيدلاني قبل استعمال أي دواء.

المواو ذو المفعول الخاص

السكرين

3. طريقة أخذ أقراص ماغني ب 6 المغلفة 48 ملغ/5 ملغ

مقدار الجرعة

هذا الدواء مخصص للاستعمال لدى البالغين ولدى الأطفال فوق السادسة من العمر.

البالغين: 6 إلى 8 أقراص في اليوم، مقسمة على جرعتين إلى 3 جرعات مع الطعام.

الأطفال فوق السادسة من العمر (20 كلغ تقريباً): 4 إلى 6 أقراص في اليوم، مقسمة على جرعتين إلى 3 جرعات مع الطعام.

طريقة الاستعمال

عن طريق الفم

يجب بلع الأقراص كاملة مع كوب كبير من الماء.

مدة العلاج

يجب إيقاف العلاج حالما تعود مستويات المغنيزيوم في الدم إلى طبيعتها.

إذا أخذت جرعة مغرطة من أقراص ماغني ب 6 المغلفة 48 ملغ/5 ملغ

بمجرد عامة. لا تسبب جرعة مغرطة من المغنيزيوم أخطر عبر الفم أي زلات فعل سامة لدى المرضى الذين تكون الوظيفة الكلوية لديهم عادية. ولكن يمكن أن يظهر التسمم بالمغنيزيوم لدى المرضى المصابين بقصور كلوي.

إذا نسبت أخذ أقراص ماغني ب 6 المغلفة 48 ملغ/5 ملغ

لا تأخذ جرعة مضاعفة للتعويض عن جرعة نسيتها.

إذا كان لديك أسئلة أخرى حول استعمال هذا الدواء، اطرحها على الطبيب أو الصيدلاني.

4. التأثيرات الجانبية المحتملة

مثل الأدوية كلها، يمكن أن تسبب أقراص ماغني ب 6 المغلفة 48 ملغ/5 ملغ تأثيرات جانبية لا تصيب المرضى كلهم.

- إسهال.
- ألم في البطن.
- ارتكاسات جلدية.
- حساسية.

لا تتردد باستشارة الطبيب أو الصيدلاني.

في حال تفاقم أحد التأثيرات الجانبية أو في حال لاحظت أي تأثيرات جانبية غير مذكورة في هذه النشرة، الرجاء أن تعلم الطبيب أو الصيدلاني.

5. طريقة حفظ أقراص ماغني ب 6 المغلفة 48 ملغ/5 ملغ

احفظ الدواء بعيداً عن متناول الأطفال ونظّره.

لا تستعمل أقراص ماغني ب 6 المغلفة 48 ملغ/5 ملغ بعد انقضاء تاريخ الصلاحية المدوّن على علبة الكرتون. يتغير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من الشهر المذكور.

لا تحفظ الدواء في حرارة تتخطى 25 درجة مئوية.

لا ينبغي التخلص من الأدوية عبر المياه الممتلئة أو مع النفايات المنزلية. أسأل الصيدلاني عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد بحاجة إليها، فمن شأن هذه الإجراءات حماية البيئة.

6. معلومات إضافية

ماذا تحتوي أقراص ماغني ب 6 المغلفة 48 ملغ/5 ملغ

المادتان الفاعلتان هما،

لاكاتات المغنيزيوم نو جزيئي ماء.....470 ملغ

هيدروكلوريد البوريدوكسين (فيتامين ب 6).....5 ملغ

في القصر المغلف الواحد.

يبلغ المحتوى الكاسل من المغنيزيوم 48 ملغ (1.97 ملمول) في القصر.

المركبات الأخرى هي:

سكرين، كارابين ثقليل، أكاسيد، كاربوكسيبوليميليلين، ملّق، ستيراتات المغنيزيوم، ثنائي أكسيد التيتانيوم (E 171)، مسحوق شمع الكرتون.

ما هو شكل أقراص ماغني ب 6 المغلفة 48 ملغ/5 ملغ ومحتويات العلبة

يتألف هذا الدواء على شكل أقراص مغلفة (علبة من 50 قرصاً).

الشركة حاملة رخصة التسويق والتفعل

sanofi-aventis

1-13, boulevard Romain Rolland

75014 Paris - France

الشركة المصنّعة

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

1, rue de la Vierge, Ambarès & Lagrave,

F-33565 Carbon Blanc Cedex, France

تاريخ الموافقة الأخيرة على هذه النشرة: تشرين الأول/أكتوبر 2010.

THIS MEDICAMENT

Is a product, which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.

Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament.

- The doctor and the pharmacist are the experts in medicines, their benefits and risks.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
- Keep all medicaments out of reach of children.

Council of Arab Health Ministers,
Union of Arab Pharmacists.

ان هذا الدواء

مستحضر يورثر على صحته واستهلاكه خلافا لتعليمات
يعرضك للطهر.

اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال الممنوع
عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.

- الطبيب و الصيدلي هما الخبراء في الدواء و في نفعه و ضرره
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك
- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب
- لا تترك الأدوية في متناول الأطفال

مجلس وزراء الصحة العرب
و اتحاد الصيدائة العرب.