

# antibiophilus®

## GELULES

### COMPOSITION

Culture lyophilisée de Lactobacillus casei variété rhamnosus titrant au minimum 8.10<sup>9</sup> germes par gramme ..... 250 mg pour une gélule N°2 de 250 mg.

Composition de l'enveloppe de la gélule : gélatine, bisulfite de sodium, dioxyde de titane (E 171).

### PRÉSENTATION

Flacon (verre) de 20 gélules.

### INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Ce médicament est préconisé comme traitement symptomatique de certaines diarrhées. Les modalités de la réhydratation seront déterminées par votre médecin.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

NE JAMAIS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.

#### *Chez l'adulte :*

Adjoindre à ce traitement des boissons sucrées, des bouillons salés pour compenser les pertes en liquide dues à la diarrhée.

Si la diarrhée persiste au-delà de 2 jours, CONSULTER VOTRE MEDECIN.

En cas de diarrhée abondante, de présence de sang ou de glaires dans les selles, comme en cas de fièvre ou de vomissements ou d'autres signes digestifs associés, CONSULTER VOTRE MEDECIN.

#### *Chez l'enfant :*

Chez le nourrisson (moins de 2 ans) : il convient de consulter votre médecin. En attendant la consultation, arrêter l'alimentation lactée : administrer des boissons sucrées (jus de fruits) salées (bouillons salés). La quantité doit être suffisante pour compenser les pertes en liquides dues à la diarrhée.

Surveiller le poids toutes les 6 heures.

L'enfant doit rester vif et tonique, l'inverse signifierait une déshydratation et une hospitalisation d'urgence serait indispensable.

Enfant de plus de 2 ans : ce traitement ne dispense pas de la réhydratation : boissons sucrées, bouillons salés, arrêt du lait et laitage le premier jour.

Si la diarrhée persiste au-delà de 2 jours, CONSULTER VOTRE MEDECIN.

En cas de diarrhée abondante, de présence de sang ou de glaires dans les selles, comme en cas de fièvre ou de vomissements ou d'autres signes digestifs associés, CONSULTER VOTRE MEDECIN.

### AUTRES EFFETS POSSIBLES DU MÉDICAMENT

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS ; NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### POSÉOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

2 à 8 gélules par jour.

Avaler la gélule avec un peu de liquide, de préférence en dehors des repas.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

### CONDITIONS DE DELIVRANCE

CE MÉDICAMENT VOUS A ÉTÉ PERSONNELLEMENT PRÉSCRIT DANS UNE SITUATION PRÉCISE :

- IL PEUT NE PAS ÊTRE ADAPTE A UN AUTRE CAS
- NE PAS LE REUTILISER SANS AVIS MEDICAL
- NE PAS LE CONSEILLER A UNE AUTRE PERSONNE.

### DUREE DE STABILITE

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION INDIQUEE EN CLAIR SUR L'EMBALLAGE.

### Laboratoires LYOCENTRE

24, avenue Georges Pompidou  
15000 AURILLAC - FRANCE  
Tél. (33) (0)4.71.46.80.00

01055030 A  
03/97