

POTENCIATOR® 5g Aspartate d'Arginine

FORME PHARMACEUTIQUE: Solution orale en ampoules buvables.

COMPOSITION: Chaque ampoule buvable contient: Aspartate d'Arginine,5 g
Excipients: Solution de sorbitol à 70% (2 g), saccharose (1,3 g), acide citrique monohydrate saccharine sodique (13 mg), essence à la framboise, sorbate de potassium, eau déionisée, nipagin M (E218), nipasol M (E216), q.s.

ACTION PHARMACOLOGIQUE: Les composants de POTENCIATOR sont deux acides aminés, qui interviennent dans le rétablissement des réserves protéiques.

INDICATIONS: Prévention des carences en acides aminés et insuffisance d'apport protéinique causés par des déficits alimentaires, manque d'appétit ou convalescence.

INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MÉDICAMENTS ET ALIMENTS: On n'en connaît aucune.

CONTRE-INDICATIONS: Hypersensibilité ou allergie aux composants du produit. Insuffisance rénale ou hépatique grave.

PRÉCAUTIONS: A employer sous contrôle médical chez les patients souffrant de rétention urinaire. Ne pas employer de façon continue.
En cas d'aggravation ou de persistance des symptômes, consulter un médecin.

INCOMPATIBILITÉS: On n'en connaît aucune.

RÉACTIONS ADVERSEES: Des réactions allergiques ont été observées chez certains patients.
En cas d'effet indésirable non décrit, consulter un médecin ou un pharmacien.

MISES EN GARDE: Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Chez la femme enceinte, ou susceptible de l'être, prendre l'avis d'un médecin avant d'utiliser ce médicament. La consommation de médicaments pendant la grossesse peut être dangereuse pour l'embryon ou le fœtus et doit être contrôlée par un médecin.

Les femmes en période d'allaitement doivent demander l'avis d'un médecin avant de prendre ce médicament.

Mises en garde au sujet des excipients

Ce médicament contient du saccharose (1,3 g par ampoule buvable). Les diabétiques doivent prendre les précautions habituelles. Pas de modification de la vigilance. Ce médicament contient 1,4 g de sorbitol par ampoule buvable. Il peut causer des troubles gastriques et de la diarrhée. Il ne doit pas être administré à des patients à intolérance génétique au fructose.

Le fait de contenir du sorbate de potassium comme excipient le rend nuisible pour les patients à régimes pauvres en potassium. L'excès de potassium peut produire, après l'administration orale, des dérangements d'estomac et de la diarrhée.

DOSE ET VOIE D'ADMINISTRATION: Voie orale.

Enfants moins de 2 ans: il est déconseillé d'utiliser ce médicament. **Enfants de 2 à 6 ans:** uniquement sous prescription médicale. **Enfants de 6 à 12 ans:** 1 ampoule par jour ou la dose conseillée par le médecin. **Plus de 12 ans et Adultes:** 1 ampoule 2 fois par jour.

Les ampoules doivent être prises en dilution dans un peu d'eau ou de jus de fruits à la fin des repas principaux.

INSTRUCTIONS D'EMPLOI:



1. Séparer l'ampoule choisie des autres.



2. Déchirer la languette de la partie supérieure en faisant un mouvement giratoire.



3. Mettre l'ampoule en sens inverse, presser et verser son contenu dans un verre.

TRAITEMENT EN CAS D'INTOXICATION OU DE SURDOSE: La prise continue ou accidentelle de doses élevées peut provoquer des réactions gastro-intestinales (diarrhées, nausées, vomissements). Arrêter le traitement et consulter un médecin.

En cas de surdosage ou d'ingestion accidentelle, veuillez consulter un médecin.

PRÉSENTATION: Boîte de 20 ampoules.

Sans ordonnance médicale. A conserver à une température ne dépassant pas 30°C. Garder les médicaments hors de portée des enfants.