

ديبروزون 0.5 ملجم/جم كريم ديبروزون 0.5 ملجم/جم مرهم

بيتاميثازون ديبروبيونات

- اقرأ كامل هذه النشرة بعناية قبل أن تبدأ باستخدام هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات هامة بالنسبة إليك.
- احتفظ بهذه النشرة، لربما احتجت إلى الإطلاع عليها مجدداً.
 - استشر طبيبك أو الصيدلي إن كانت لديك أية أستهلاك إضافية.
 - وُصف هذا الدواء لك بشكل خاص. حذر من إعطائه لأي شخص آخر لأنه قد يضره حتى لو كانت أعراضه المرضية شبيهة بأعراضك.
 - في حال بدت عليك أية آثار جانبية، استشر طبيبك أو الصيدلي. بما فيها أية آثار جانبية محتملة غير مدرجة في هذه النشرة. انظر الفقرة 4.

مضمن هذه النشرة

- التعريف ب الكريم ديبروزون ودوعي استعماله
- المعلومات التي ينبغي معرفتها قبل استعمال ديبروزون
- كيفية استخدام ديبروزون
- التأثيرات الجانبية المحتملة
- كيفية حفظ ديبروزون
- معلومات العلبة ومعلومات أخرى

1. التعريف ب الكريم ديبروزون ودوعي استعماله

يحتوي ديبروزون على مادة ستيروبودي هي البيتاميثازون ديبروبيونات.

يستعمل ديبروزون لعلاج الالتهابات الجلدية.

2. المعلومات التي ينبغي معرفتها قبل استعمال ديبروزون

لا تستخدم ديبروزون:

- إذا كانت لديك حساسية من مادة البيتاميثازون ديبروبيونات أو أي مكون آخر من مكونات هذا الدواء (المدرجة في الفقرة 6)
- إذا كنت مصاباً بقرحات جلدية
- على الجروح
- على الجلد المصاب بعدي
- على الجلد المصاب بحب الشباب
- قرب العينين

التحذيرات والاحتياطات

- تحذير مع طبيبك أو الصيدلي قبل استخدام ديبروزون:
- إذا كانت تستعمل هذا الدواء لفترة طويلة أو على مساحة كبيرة من الجسم
 - إذا كانت بشرتك رقيقة أو متضررة
 - إذا كانت تستعمل هذا الدواء تحت ضماد إيطابي
 - إذا كنت طفلاً.
 - تعاني من تشوش الرؤية أو غير ذلك من اضطرابات البصر

قبل استعمال ديبروزون، الرجاء استشارة الطبيب في حال انتبعت عليك أيٍ من الحالات المذكورة أعلاه حالياً أو في أي وقت مضى.

الأطفال

إن القرحة على امتصاص ستيروبودات القشرية أكبر لدى الأطفال (بسبب ارتفاع نسبة مساحة الجسم إلى وزن الجسم). وبالتالي هم أكثر عرضة للإصابة

بآثار مجموعية (انظر الفقرة 4 بعنوان الآثار الجانبية المحتملة). يمكن للستيروبودات القشرية أن تؤثر على إفراز هرمون النمو لدى الأطفال، مما

يستوجب مرقبة تطور الوزن والطول لديهم.

يمكن لأي من التأثيرات الجانبية الواردة نتيجة الاستعمال المجموعي للستيروبودات القشرية، بما في ذلك قصور الغدة الكظرية، أن تظهر أيضاً عند

استعمال الستيروبودات القشرية الموضعية، خاصة لدى الرضع والأطفال.

أدوية أخرى و ديبروزون

أياً طبيبك أو الصيدلي في حال كنت تستعمل أو استعملت مؤخراً أو يحتمن أن تستعمل أية أدوية أخرى.

الحمل والرضاعة الطبيعية

في حال كنت حاملاً أو مرضعاً، أو تعتقدين أنك حامل، أو تتويني الإنجاب، استشر طبيبك أو الصيدلي قبل استعمال هذا الدواء. خاصة إن كنت

تحتجين لاستعمال ديبروزون لفترة طويلة أو على مساحة كبيرة من الجسم. عليك استشارة الطبيب لأن وحده الطبيب قادر على اتخاذ قرار بشأن

إمكانية إعطائك ديبروزون خلال فترة الحمل أو الرضاعة.

يحتوي ديبروزون على الكلوروكريزول و الكحول السينيستيرولي

• يحتوي كريم ديبروزون على الكلوروكريزول وهي مادة تتسبب أحياناً بحساسية.

• يحتوي كريم ديبروزون على الكحول السينيستيرولي، الذي قد يتسبب أحياناً بارتكاسات جلدية (مثل التهاب الجلد التماسي).

3. كيفية استخدام ديبروزون

تقيد دواماً بتعليمات الطبيب أو الصيدلي عند استخدام هذا الدواء. تتحقق من الأمر مع طبيبك أو الصيدلي إن كنت غير متأكد.

الجرعة الموصى بها

- استخدم ديبروزون مرة إلى مرتين في اليوم في الصباح وأو المساء.
- ادهن طبقة رقيقة من ديبروزون مع المرص على تغطية كامل المنطقة التي تحتاج إلى علاج.
- قم بتدليك البشرة برفق حتى يتغلل الدواء داخل الجلد ويعطي مفعوله.
- اغسل يديك بعد الانتهاء من استخدام ديبروزون.
- ديبروزون مخصوص فقط للاستعمال الموضعي على الجلد.

ما هي فرقة العلاج ب الكريم ديبروزون؟

طبيبك هو من سيقرر فرقة علاجك ديبروزون، علماً أن تلك الفرقة ستعتمد على نتائج العلاج. وسيتم وقف العلاج فور تعافي البشرة المتضررة.

الاستعمال لدى الأطفال

يمكن للستيروبودات القشرية أن تؤثر على إفراز هرمون النمو لدى الأطفال، ما يستوجب مرقبة تطور الوزن والطول لديهم.

في حال استعملت كمية زائدة من ديبروزون أو قمت بابتلاع الدواء عن طريق الخطأ (توخي الحذر مع الأطفال)، ينبغي الاتصال بالطبيب أو الصيدلي على الفور.

إن أعراض الجرعة الزائدة شبيهة بالأعراض التي تظهر عند الاستعمال المكرر لديبروزون أو عند استعماله لفترة طويلة (راجع الفقرة 4 بعنوان

"التأثيرات الجانبية المحتملة"). وهذه الأعراض تتزول مع الوقت. عند الاقضاء، سيضر طبيبك في حال بدت عليك تلك الأعراض الجلدية، بما في ذلك تحسين القدرة على توازن السوائل في الجسم.

في حال نسيت استخدام ديبروزون

لا تستعمل جرعة مضاعفة للتعويض عن جرعة مناسبة.

في حال توقف عن استخدام ديبروزون

من المحتمل أن تعاودك المشاكل الجلدية عند وقف العلاج.

استشر طبيبك أو الصيدلي إذا كانت لديك أية استفسارات إضافية حول هذا الدواء.

4. التأثيرات الجانبية المحتملة

مثل سائر الأدوية، يمكن لهذا الدواء أن يتسبب ببعض التأثيرات الجانبية، مع العلم أنها لا تصيب الجميع.

الحساسية

إذا بدت عليك أية حساسية، توقف عن استخدام ديبروزون واتصل بطبيبك على الفور.

بصفة عامة، يتسم ديبروزون بقابلية تحمل جيدة، ولكن من المحتمل أن يتسبب لك بالمشاكل الجلدية التالية:

- حب الشباب
- علامات تندد الجلد
- عدوى جلدية
- مشاكل جلدية حول الفم
- زوال لون البشرة أو ترققها
- التهاب جذور الشعر ونمو الشعر الزائد
- الشعور بحرقة، حكة، تهيج البشرة، جفاف أو حمرار البشرة ("التهاب الجلد التماسي"). في حال الإصابة بتهيج جلدي، توقف عن استخدام ديبروزون.

كما هي الحال مع سائر المواد ستيروبودات القشرية، عند استخدام ديبروزون على مناطق واسعة من الجسم أو بكميات كبيرة أو لفترة طويلة أو تحت ضماد

إيطابي، يمكن للستيروبودات المكرر داخل الجلد، ما يتسبب أحياناً بأعراض جانبية مماثلة مثل تورم الوجه والعنق والجذع أو زيادة الوزن، أو تشوش الرؤية. وقد يوثر ذلك على النمو لدى الأطفال. استشر طبيبك في حال بدت عليك تلك الأعراض الجانبية.

إن الأطفال والمرضى ممن يشرّهم رقيقة أو متصرّرة والمصابين بداء حاد في الكبد أكثر عرضة من غيرهم للتأثيرات الجانبية.

التنبؤ عن الآثار الجانبية

تحذير مع طبيبك أو الصيدلي في حال بدت عليك أيٍ من الآثار الجانبية، بما يشمل أية آثار جانبية ممكنة لم ترد في هذه النشرة. فالتالي عن الآثار

الجانبية يساعد في تكوين معلومات إضافية حول سلامه هذا الدواء.

5. كيفية حفظ ديبروزون

يحفظ هذا الدواء بعيداً عن نظر وتناول الأطفال.

يحفظ في حرارة لا تتجاوز 30 درجة مئوية.

لا يستخدم هذا الدواء بعد انقضاء تاريخ الصلاحية المطبوع على العلبة بعد عبارة EXP، مع العلم أن الصلاحية تنتهي في آخر يوم من الشهر المذكور.

لا يجب التخلص من الأدوية في مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد بحاجة إليها، فهذه

الذى يساعد في حماية البيئة.

6. معلومات العلبة ومعلومات أخرى

مكونات ديبروزون

- المادة الفعالة هي بيتاميثازون ديبروبيونات بتركيز 0.64 ملجم/جم (ما يساوي 0.5 ملجم/جم من البيتاميثازون).
- تشمل المكونات الأخرى: كلوروكريزول، صوديوم فوسفات ثانوي البيرودجين ثانوي البيرودين، حمض الفوسفوريك، برافين لين أبيض، برافين سائل، سيتوماكروجول 1000، كحول سينيستيريلي، هيدروكسيد الصوديوم، ماء نقي.

مهم ديبروزون:

- المادة الفعالة هي بيتاميثازون ديبروبيونات بتركيز 0.64 ملجم/جم (ما يساوي 0.5 ملجم/جم من البيتاميثازون).
- تشمل المكونات الأخرى: برافين سائل وبرافين لين أبيض.

الشكل الصيدلاني لديبروزون ومحظوظ العلبة

كريز ديبروزون متواافق في أنياب من الألمنيوم سعتها 5، 10، 15، 20، 30، 50، 100 و 500 جرام.

من المهم أن لا تواافق جميع الأحجام في الأسواق.

مالك حقوق التسويق والمصنع

الشركة المالكة لحقوق التسويق:

أور جانون، باجيك

روبروكوربليس، باجيك

بي-1000 بروكسل، باجيك

الشركة المصنعة ومصادر التسويق:

أور جانون، باجيك

الستيريل، باجيك

مسنحضر ذريبي لا يصرف إلا بوصفة طبية

تمت آخر مراجعة لهذه النشرة في ديسمبر 2022

(هذا ملخص دوائي)

- الدواء ملخص دوائي على صحتك وأسهلاكه حلاً للتعليمات بعرضك للخطر
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقه الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك
- لا تطيل العلاج المحدد لك من الأدواء وبنفعه وضرره
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من الأدواء بنفسك
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية
- لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال

تحذير الصيادلة العرب

ORGANON

XXXXXX

2/2