

ديبروزون 0.5 ملجم/جم كريم

ديبروزون 0.5 ملجم/جم مرهم

بيتاميثازون ديبروبيونات

اقرأ كامل هذه النشرة بعناية قبل أن تبدأ باستخدام هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات هامة بالنسبة إليك.

- احتفظ بهذه النشرة، لربما احتجت إلى الاطلاع عليها مجدداً.
- استشر طبيبك أو الصيدلي إن كانت لديك أية أسئلة إضافية.
- وُصف هذا الدواء لك بشكل خاص. حذار من إعطائه لأي شخص آخر لأنه قد يضره حتى لو كانت أعراضه المرضية شبيهة بأعراضك.
- في حال بدت عليك أية آثار جانبية، استشر طبيبك أو الصيدلي. بما فيها أية آثار جانبية محتملة غير مدرجة في هذه النشرة. أنظر الفقرة 4.

مضمون هذه النشرة

- التعريف بكريم ديبروزون ودواعي استعماله
- المعلومات التي ينبغي معرفتها قبل استعمال ديبروزون
- كيفية استخدام ديبروزون
- التأثيرات الجانبية المحتملة
- كيفية حفظ ديبروزون
- محتويات العلبة ومعلومات أخرى

1. التعريف بكريم ديبروزون ودواعي استعماله

يحتوي ديبروزون على مادة ستيرويدية هي البيتاميثازون ديبروبيونات. يستعمل ديبروزون لعلاج الالتهابات الجلدية.

2. المعلومات التي ينبغي معرفتها قبل استعمال ديبروزون

لا تستخدم ديبروزون:

- إذا كانت لديك حساسية من مادة البيتاميثازون ديبروبيونات أو أي مكون آخر من مكونات هذا الدواء (المدرجة في الفقرة 6)
- إذا كنت مصاباً بقرّحات جلدية
- على الجروح
- على الجلد المصاب بعدوى
- على الجلد المصاب بحب الشباب
- قرب العينين

التحذيرات والاحتياطات

تحذّر مع طبيبك أو الصيدلي قبل استخدام ديبروزون:

- إذا كنت ستستعمل هذا الدواء لفترة طويلة أو على مساحة كبيرة من الجسم
- إذا كانت بشرتك رقيقة أو متضررة
- إذا كنت تستعمل هذا الدواء تحت ضمادٍ طبّاقيّ
- إذا كنت طفلاً.
- تعاني من تشوش الرؤية أو غير ذلك من اضطرابات البصر

قبل استعمال ديبروزون، الرجاء استشارة الطبيب في حال انطبقت عليك أيّ من الحالات المذكورة أعلاه حالياً أو في أي وقت مضى.

الأطفال

إن القدرة على امتصاص الستيرويدات القشرية أكبر لدى الأطفال (بسبب ارتفاع نسبة مساحة الجسم إلى وزن الجسم). بالتالي هم أكثر عرضة للإصابة بآثار مجموعية (أنظر الفقرة 4 بعنوان الآثار الجانبية المحتملة). يمكن للستيرويدات القشرية أن تؤثر على إفراز هرمون النمو لدى الأطفال، ما يستوجب مراقبة تطور الوزن والطول لديهم.

يمكن لأي من التأثيرات الجانبية الواردة نتيجة الاستعمال المجموعي للستيرويدات القشرية، بما في ذلك قصور الغدة الكظرية، أن تظهر أيضاً عند استعمال الستيرويدات القشرية الموضعية، خاصة لدى الرضع والأطفال.

أدوية أخرى و ديبروزون

أخبر طبيبك أو الصيدلي في حال كنت تستعمل أو استعملت مؤخراً أو يحتمل أن تستعمل أية أدوية أخرى.

الحمل والرضاعة الطبيعية

في حال كنتِ حاملاً أو مرضعاً، أو تعتقدين أنك حامل، أو تتوين الإنجاب، استشيري طبيبك أو الصيدلي قبل استعمال هذا الدواء. خاصة إن كنت تحتاجين لاستعمال ديبروزون لفترة طويلة أو على مساحة كبيرة من الجسم. عليك استشارة الطبيب لأن وحده الطبيب قادر على اتخاذ قرار بشأن إمكانية إعطائك ديبروزون خلال فترة الحمل أو الرضاعة.

يحتوي ديبروزون على الكلوروكريزول و الكحول السيتوستيريلي

- يحتوي كريم ديبروزون على الكلوروكريزول وهي مادة تتسبب أحياناً بحساسية.
- يحتوي كريم ديبروزون على الكحول السيتوستيريلي، الذي قد يتسبب أحياناً بارتكاسات جلدية (مثل التهاب الجلد التماسي).

3. كيفية استخدام ديبروزون

تقدّم دوماً بتعليمات الطبيب أو الصيدلي عند استخدام هذا الدواء. تحقّق من الأمر مع طبيبك أو الصيدلي إن كنت غير متأكد.

الجرعة الموصى بها

- استخدم ديبروزون مرة إلى مرتين في اليوم في الصباح و/أو المساء.
- ادهن طبقة رقيقة من ديبروزون مع الحرص على تغطية كامل المنطقة التي تحتاج إلى علاج.
- قم بتدليك البشرة برفق حتى يتغلغل الدواء داخل الجلد ويعطي مفعوله.
- اغسل يديك بعد الانتهاء من استخدام ديبروزون.
- ديبروزون مخصص فقط للاستعمال الموضعي على الجلد.

ما هي فترة العلاج بكريم ديبروزون؟

طبيبك هو من سيفرّز فترة علاجك بديبروزون، علماً أن تلك الفترة ستعتمد على نتائج العلاج. وسيتم وقف العلاج فور تعافي البشرة المتضررة.

- الرجاء استشارة الطبيب في حال لم تلاحظ أي تحسن.
- لا تستعمل ديبروزون لأكثر من أسبوعين إلا بتعليمات من طبيبك.

ينبغي التقيد بتعليمات الطبيب على الدوام.

الاستعمال لدى الأطفال

يمكن للستيرويدات القشرية أن تؤثر على إفراز هرمون النمو لدى الأطفال، ما يستوجب مراقبة تطور الوزن والطول لديهم.

في حال استعمال جرعة زائدة من ديبروزون

في حال استعمال كمّية زائدة من ديبروزون أو قمتَ بابتلاع الدواء عن طريق الخطأ (توخي الحذر مع الأطفال)، ينبغي الاتصال بالطبيب أو الصيدلي على الفور.

إن أعراض الجرعة الزائدة شبيهة بالأعراض التي تظهر عند الاستعمال المتكرر لديبروزون أو عند استعماله لفترة طويلة (راجع الفقرة 4 بعنوان "التأثيرات الجانبية المحتملة"). وهذه الأعراض تزول مع الوقت. عند الاقتضاء، سيضطر طبيبك إلى تصحيح الخلل فيما يُعرف بـ "الكهارل" في الجسم للسيطرة على توازن السوائل في الجسم.

في حال نسيت استخدام ديبروزون

لا تستعمل جرعة مضاعفة للتعويض عن جرعة منسية.

في حال توقفت عن استخدام ديبروزون

من المحتمل أن تعاودك المشاكل الجلدية عند وقف العلاج.

استشر طبيبك أو الصيدلي إذا كانت لديك أية استفسارات إضافية حول هذا الدواء.

4. التأثيرات الجانبية المحتملة

مثل سائر الأدوية، يمكن لهذا الدواء أن يتسبّب ببعض التأثيرات الجانبية، مع العلم أنها لا تصيب الجميع.

الحساسية

إذا بدت عليك أية حساسية، توقف عن استعمال ديبروزون واتّصل بطبيبك على الفور.

بصفة عامة، يتّسم ديبروزون بقابلية تحمّل جيدة. ولكن من المحتمل أن يتسبّب لك بالمشاكل الجلدية التالية:

- حب الشباب
- علامات تمدّد الجلد
- عدوى جلدية
- مشاكل جلدية حول الفم
- زوال لون البشرة أو ترققها
- التهاب جذور الشعر ونمو الشعر الزائد
- الشعور بحرقّة، حكة، تهيج البشرة، جفاف أو احمرار البشرة ("التهاب الجلد التماسي"). في حال الإصابة بتهيج جلدي، توقف عن استعمال ديبروزون.

كما هي الحال مع سائر المواد الستيرويدية، عند استخدام ديبروزون على مناطق واسعة من الجسم أو بكميات كبيرة أو لفترة طويلة أو تحت ضمادٍ طبّاقيّ، يمكن للستيرويدات أن تتسبب بكميات أكبر داخل الجلد، ما يتسبب أحياناً بأعراض جانبية معمّمة مثل تورم الوجه والعنق والجذع أو زيادة الوزن، أو تشوش الرؤية. وقد يؤثر ذلك على النمو لدى الأطفال. استشر طبيبك في حال بدت عليك تلك الأعراض الجانبية.

إن الأطفال والمرضى ممّن بشرتهم رقيقة أو متضررة والمرضى المصابين بداء حاد في الكبد أكثر عرضة من غيرهم للتأثيرات الجانبية.

التبليغ عن الآثار الجانبية

تحذّر مع طبيبك أو الصيدلي في حال بدت عليك أي من الآثار الجانبية، بما يشمل أية آثار جانبية ممكنة لم ترد في هذه النشرة. فالتبليغ عن الآثار الجانبية يساعد في تكوين معلومات إضافية حول سلامة هذا الدواء.

5. كيفية حفظ ديبروزون

يحفظ هذا الدواء بعيداً عن نظر ومتناول الأطفال.

يحفظ في حرارة لا تتجاوز 30 درجة مئوية.

لا تستخدم هذا الدواء بعد انقضاء تاريخ الصلاحية المطبوع على العلبة بعد عبارة EXP، مع العلم أن الصلاحية تنتهي في آخر يوم من الشهر المذكور.

لا يجب التخلص من الأدوية في مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد بحاجة إليها، فهذه التدابير تساعد في حماية البيئة.

6. محتويات العلبة ومعلومات أخرى

مكونات ديبروزون

كريم ديبروزون:

- المادة الفعالة هي بيتاميثازون ديبروبيونات بتركيز 0.64 ملجم/جم (ما يساوي 0.5 ملجم/جم من البيتاميثازون).
- تشمل المكونات الأخرى: كلوروكريزول، صوديوم فوسفات ثنائي الهيدروجين ثنائي الهيدرات، حمض الفوسفوريك، برفاين لين أبيض، برفاين سائل، سبتوماكروجول 1000، كحول سيتوستيريلي، هيدروكسيد الصوديوم، ماء نقي.

مرهم ديبروزون:

- المادة الفعالة هي بيتاميثازون ديبروبيونات بتركيز 0.64 ملجم/جم (ما يساوي 0.5 ملجم/جم من البيتاميثازون).
- تشمل المكونات الأخرى: برفاين سائل وبرافين لين أبيض.

الشكل الصيدلاني لديبروزون ومحتوى العلبة

كريم ديبروزون متوافر في أنابيب من الألمنيوم سعتها 5، 10، 15، 20، 30، 50، 100 و 500 جرام.

مرهم ديبروزون متوافر في أنابيب من الألمنيوم سعتها 10، 15، 20، 30، 50، 100 و 500 جرام.

من المحتمل ألا تتوافر جميع الأحجام في الأسواق.

مالك حقوق التسويق والمصنّع

الشركة المالكة لحقوق التسويق:

اورجانون بلجيكا

رو دو كوميرس 31

بي-1000 بروكسل، بلجيكا

الشركة المصنّعة ومصدرة التشغيل:

اورجانون هايبست بي في .، اندستريبارك 30، 2220هايبست-أوب-دن-بيرغ، بلجيكا

مستحضر دوائي لا يصرف إلا بوصفة طبية.

تمت آخر مراجعة لهذه النشرة في في ديسمبر 2022

(هذا مستحضر دوائي)

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك
- الطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وينفعه ضرره
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية
- لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال

مجلس وزراء الصحة العرب

اتحاد الصيدالة العرب

ORGANON

XXXXXXXXXX